

القائم بالتدريس

د. اسماء سيد

سلسلة محاضرات ميكانيكا الكم ١
د. محمد علوش - قسم الفيزياء - جامعة جنوب
الوادي

الفرقة الثالثة - قسم الطبيعة

2022-2023

(ان من لم تصدمه نظرية الكم
لا بد أنه لم يفهمها)

نيلز بوهر

تمهيد:

ميكانيكا الكم هي أحد فروع علم الفيزياء، تهتم بدراسة الجسيمات الذرية ودون الذرية subatomic، كما تشمل تفسير عدة ظواهر وتؤول في دراستها إلى نتائج قد تبدو غامضة وغريبة عن عالمنا المادي. كان عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ماكس بورن هو أول من صاغ مصطلح "ميكانيكا الكم" عام ١٩٢٤.

لماذا تبدو ميكانيكا الكم غريبة


تعتبر ميكانيكا الكم جوهر الفهم المعاصر لتفسير الظواهر الكونية المتعلقة بحركة الأجسام الضخمة مثل النجوم، المجرات، والأحداث الكونية مثل الانفجار العظيم. كما أنها حجر الأساس للعديد من المجالات العلمية مثل النانوتكنولوجي، كيمياء الكم، البيولوجيا البنيوية، وفيزياء الجسيمات، والإلكترونيات.

ميكانيكا الكم أغرب ما يعرف في الكون بأسره حاليًا، أو ومن منطلقها، كوننا الذي نعرفه نحن. إنها من الغرابة حتى أن نيلز بور ذاته قال عنها: "إن لم تفاجئك ميكانيكا الكم بعمق، فأنت لم تفهمها بعد". واليوم وبعد مضي قرن كامل شغلت به النظرية الكمومية كل مختبرات الفيزياء على وجه البسيطة يمكننا على الأقل أن نحصر أغرب ما يكتنفها. أو أن نضع لافتات تأخذ بيدنا في متاهة هذا العلم.

لن نتناول في معرض ذلك قطة شرودينغر الشهيرة- التي لا تضاهيها شهرة سوى شهرة القط توم- ولسان حالها القائل "أنا عايش ومش عايش" فقد أراد بها شردينغر أن يضرب مثالاً على احتمالية ميكانيكا الكم وتأثير القياس على حالة الجملة. ولا نريد الادعاء بأننا نحصر غرائبه وما ينبغي أن نعرفه عنه؛ إذ لن تكفينا مئات المقالات في ذلك ولن نخرج راضين أو مشبعين كموميًا.

في البداية، ما معنى "الفيزياء الكمومية"، إن كلمة "كوانتم" Quantum أو "تكميم Quantify" تعني أصغر وحدة ممكنة، وهذا هو السبب الذي يجعل لهذه الكلمة أصولاً مشتركة مع كلمتي "كمية" Quantity أو كل تلك المفردات التي تتعامل مع وحدات

مميزة منفصلة. حسنًا، لسنا بصدد درس في اللغويات، إننا نريد تخفيف الأمر قليلًا لا زيادة تهويله، يمكننا استبدال عبارة "جسيم كمومي" بـ "شيء حقيقي صغير جدًا"، ومن هنا نقول إن فيزياء الكم هي فيزياء أصغر الأشياء في الكون.



لماذا ميكانيكا الكم؟

عندما يتعلق الأمر بمستوى الذرة والإلكترونات فإن العديد من القوانين في الميكانيكا الكلاسيكية - التي تزخر بقوانين نيوتن وتصف آلية تحرك الأجسام بسرعات وأحجام نشهدنا في حياتنا اليومية - لا تبقى صالحة، كما أن قوانين النسبية العامة محدودة، في الوقت الذي تكون فيه ميكانيكا الكم صالحة لدراسة الأنظمة على المستوى الذري ودون الذري، وفي وجود كميات عالية أو منخفضة من الطاقة وعند درجات الحرارة المنخفضة.

تخلّ عن منطقتك!

إن كنت تريد أن تفهم الفيزياء الكمية؛ فإنه يتوجب عليك إلقاء منطقتك من النافذة ثم دع المجال لخياالك ليفسر ما تقرأه؛ حيث أن الفيزياء الكمية لا تحظى بنفس الحس المادي الذي يطغى على الميكانيكا الكلاسيكية عند دراستها للأشياء المرئية المحيطة بنا، والتي توجد في مكانٍ وزمانٍ محددين؛ عكس ميكانيكا الكم التي تعتبر الأجسام -صغيرة الحجم- محاطة بسحابة من الاحتمالات؛ إذ لديها فرصة مؤكدة للتواجد عند النقطة

(أ) وفرصة أخرى للتواجد عند النقطة (ب)، أي أنها تعتمد على الاحتمالية وتنفي الحتمية في دراسة ظواهرها.

ثلاثة مبادئ ثورية في ميكانيكا الكم!

على مدار عقود عديدة نشأت وتطورت ميكانيكا الكم QM بدايةً من مجموعة تفسيرات رياضية مثيرة للجدل وصولاً إلى مجموعة من التجارب التي فشلت الميكانيكا الكلاسيكية في تفسيرها.

بدأت بحلول القرن العشرين وفي نفس الوقت تقريباً الذي نشر فيه ألبرت أينشتاين نظرية النسبية، والتي كانت بمثابة ثورة علمية مغايرة في علم الفيزياء قامت بتفسير حركة الأشياء عند سرعات عالية، وإن أرجعنا نظرية النسبية في نشأتها إلى أينشتاين فإنه لا يجوز إسناد الميكانيكا الكمية بما فيها من نظريات وقوانين إلى عالم واحد فقط، ولكنها نتاجٌ من العمل والبحث المتواصل على مدار سنين عديدة ساهم فيها زمرة متميزة من العلماء حتى أسسوا لنا ثلاثة مبادئ جوهرية أحدثت ثورة علمية ضخمة، ثم لاقت الاستحسان التدريجي والتأكيد التجريبي ما بين الفترة ١٩٠٠-١٩٣٠ وهي:

• مبدأ الخصائص المكممة Quantized Properties

هي مجموعة محددة من الخصائص مثل الموضع والسرعة واللون، يفترض أحياناً أن تتوافر هذه الخصائص بمقدار محدد فقط، الأمر يشبه إلى حد كبير عقارب الساعة التي تتحرك من رقم لآخر أي أن هذا المبدأ يعتبر الموضع، السرعة، اللون مقادير كمية يمثل كل مقدار دقة جديدة من العقرب، وقد تحدى هذا المبدأ افتراض جوهري في الميكانيكا الكلاسيكية ينص على أن تلك الخصائص لا بد وأن تتوافر في صورة طيف مستمر (الأمر هنا خاص بنظرة الكلاسيكية للضوء) ولوصف تلك الفكرة الثورية الجديدة أسس العلماء مصطلح "كمي Quantized" أي له مقدار ثابت.

في عام ١٩٠٠ سعى الفيزيائي الألماني ماكس بلانك لتفسير توزيع الألوان المنبعثة من الطيف الخاص بمواد حمراء وبيضاء ساخنة مثل فتيل مصباح ضوئي، وعندما حاول أن يفسر -على نحو فيزيائي- المعادلة التي اشتقها لوصف توزيع ألوان الطيف أدرك أنه

يتكون من مزيج من ألوان محددة (ولو عدد كبير من الألوان)، خاصة تلك الألوان التي مثلت مضاعفات عدد صحيح لقيمة أساسية طبقاً لمعادلته..

وبطريقة ما كانت الألوان ذات مقدار كمي ثابت ولم يكن هذا الأمر متوقعًا، حيث كان العلماء ينظرون إلى الضوء على أنه موجة وما هو إلا طيف متصل وليس جسيم له كمية معين، وما الذي يعيق الذرات عن إصدار ألوان إضافية بين تلك التي تمتلك مضاعفات عدد صحيح؟

بدا هذا الأمر غريبًا مما دفع بلانك لأن يعتبر مفهوم التكميم مجرد خدعة رياضية، وطبقًا لتصريحات هيلج كراخ عام ٢٠٠٠ في Physics World Magazine فإنه اعتبر رفض ماكس بلانك تلك الفكرة الثوريّة الجديدة شيئًا طبيعيًا وقتها قائلًا: "إن حدثت ثورة في علم الفيزياء في ديسمبر عام ١٩٠٠ فلن يلاحظها أحد، فلم يكن بلانك استثناءً.."

تضمنت معادلة بلانك عددًا ثابتًا والذي أصبح فيما بعد ذا أهمية كبيرة في تطوير مستقبل ميكانيكا الكم والذي يعرف اليوم "بثابت بلانك". ساعد مبدأ التكميم في تفسير العديد من الظواهر الفيزيائية الغامضة، وفي عام ١٩٠٧ استخدم أينشتاين هذا المبدأ لتفسير سبب تغير درجة حرارة مادة صلبة بكميات مختلفة إذا وضعت نفس كمية الحرارة على المادة مع تغيير درجة الحرارة المبتدأ بها..

منذ أوائل عام ١٨٠٠ أوضح منظار الطيف أن العناصر المختلفة تصدر وتمتص ألوانًا معينة من الضوء سميت بالخطوط الطيفية، وعلى الرغم من أن منظار الطيف قد حظي بدرجة عالية من الثقة لمعرفة العناصر المكونة للمواد كالنجوم مثلًا، إلا أنه حير العلماء في تفسير سبب ظهور تلك الألوان دون غيرها في خطوط الطيف..

في عام ١٨٨٨ توصل العالم يوهانس رايدبيرغ إلى معادلة تصف خطوط الطيف المنبعثة من ذرة الهيدروجين، لكن أحدًا لم يفهم لماذا صُلحت هذه المعادلة. وفي عام ١٩١٣ قام العالم نيلز بور بتطبيق مبدأ بلانك "التكميم" على نموذج رذرفورد للذرة الذي سُمي بالنموذج الكوكبي، حيث يتصور أن الإلكترونات تدور حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس.

افتراض بور أن الإلكترونات محدودة في حركتها داخل مدارات حول نواة الذرة، ويمكن لتلك الإلكترونات أن تقفز بين مدارات معينة وينتج عن هذه القفزات قدر من الطاقة يؤدي إلى ظهور ألوان معينة من الضوء تبدو كخطوط طيفية. وعلى الرغم من أن هذه الخصائص الكمية تم اكتشافها بالصدفة من قبل ماكس بلانك، إلا أنه تم الاعتماد عليها في تفسير العديد من الظواهر حتى أصبح مبدأ التكميم من المبادئ الأساسية في ميكانيكا الكم.

• مبدأ ازدواجية الموجة والجسيم

جسيمات الضوء

يمكن أن يسلك الضوء أحياناً سلوك جزيء مادي، وقد لاقى هذه الفكرة في بدايتها نقداً لاذعاً، حيث أنها ناقضت ٢٠٠ عام من التجارب التي توضح أن الضوء يسلك سلوك الموجات كتلك التي تتولد على سطح بحيرة ساكنة إذا قُذفت كرة صغيرة على سطحها. في عام ١٩٠٥ نشر أينشتاين بحثاً يشرح فيه رؤيته لظاهرتين فيزيائيتين هما انبعاث وتحويل الضوء متصوراً شعاع الضوء على أنه كمّات من الطاقة وليس موجة، مضيفاً أن تلك الكمّات يتم امتصاصها أو توليدها كاملة وخصوصاً عندما تنتقل الإلكترونات بين مدارات الطاقة..

وبناءً على هذا التصور فإن كمّات الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون من مدار لآخر تساوي فرق الطاقة بين المدارين، وعند تفسير هذا الفرق في الطاقة بواسطة ثابت بلانك فإنه يحدد لون الضوء المحمول بواسطة هذه الكمّات.. وطبقاً لهذا التصور الجديد عن الضوء قدم أينشتاين تفسيرات عن سلوك تسع ظواهر مختلفة بالرجوع إلى ألوان الضوء التي حصل عليها بلانك والتي انبعثت من فتيل مصباح ضوئي..

وفسر أيضاً كيف يمكن لألوان معينة من الضوء أن تُحرر الإلكترونات من سطح المعدن، وتعرف هذه الظاهرة بـ "التأثير الكهروضوئي"، وبعد عامين تقريباً من نشر بحث أينشتاين تم تعميم مصطلح "فوتون" ليعبر عن مصطلح "كمّات الطاقة"، وذلك بفضل جهود العالم آرثر كومبتون عام ١٩٢٣ حيث أوضح أن الضوء يتشتت بفعل شعاع إلكتروني

مختلف في اللون، وقد أظهر ذلك أن جزيئات الضوء "الفوتونات" كانت قد اصطدمت بالفعل مع جزيئات المادة "الإلكترونات" الأمر الذي كان بمثابة دعم قوي لافتراض أينشتاين..

ومنذ ذلك الحين أصبح من الواضح لدى الجميع أن الضوء يسلك سلوك موجة وجزئي في آن واحد؛ لينضم مبدأ ازدواجية الموجة والجسيم إلى أساسيات نظرية الكم. موجات المادة

يمكن أن تسلك المادة أيضًا سلوك موجة، وهذا يخالف ٣٠ عامًا تقريبًا من التجارب التي توضح أن المادة -مثل الإلكترونات- توجد كجسيمات.. منذ اكتشاف الإلكترونات في عام ١٨٩٦ كان السائد حينها أن كل المواد توجد على هيئة جسيمات وليس موجات، ومع اكتشاف خاصية ازدواجية الموجة والجسيم في الضوء؛ أصبح العلماء يتساءلون إذا ما كانت المادة محدودة فقط في الصورة الجسيمية وهل من المحتمل أن تصبح هذه الصفة- ازدواجية الموجة والجسيم- للمواد كما حدث في الضوء؟

يعد الفيزيائي الفرنسي لويس دي برولي هو أول من مهد الطريق لهذا التقدم الجوهري بتفكيره في هذا الأمر.. ففي عام ١٩٢٤ استخدم دي براولي معادلات أينشتاين في النسبية الخاصة لتوضيح أن الجسيمات يمكن أن تظهر خصائص موجية، وهذه الموجات أيضا تظهر صفات جسيمية..

وفي عام ١٩٢٥ اجتهد عالمان على هذا المبدأ وعملوا باستقلالية حيث استخدم كل منهما طرقًا رياضية مختلفة مطبقين أفكار دي براولي لشرح كيفية حركة الإلكترون حول الذرة، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة لم تتمكن معادلات الميكانيكا الكلاسيكية من تفسيرها. وفي ألمانيا تمكن العالم الفيزيائي فيرنر هايزنبرج من تفسير هذه الظاهرة بالتعاون مع كل من ماكس بورن وباسكوال جوردرات وذلك باستخدام ميكانيكا المصفوفة، وطور الفيزيائي النمساوي إرفين شرودنجر نظرية مشابهة تسمى بالميكانيكا الموجية، وفي عام ١٩٢٦ أوضح شرودنجر أن هاتين النظريتين (ميكانيكا المصفوفة، الميكانيكا الموجية) متوافقتان إلى حد كبير.

وحل نموذج هايزنبرج وشروندجر -الذي يسلك فيه الإلكترون سلوك الموجات- محل نموذج الذرة عند رذرفورد وبور. الشرط الوحيد في هذا النموذج الجديد هو وجوب تقابل نهايات الموجة المكونة للإلكترون.

في نموذج (هايزنبرج- شروندجر) عن الذرة، تخضع الإلكترونات لوظائف الموجة وتملأ مدارات ذرية عوضاً عن مدارات رذرفورد. وفي عام ١٩٢٧ طوّر كل من العالمين فولتير هتler وفرتز لندن من الميكانيكا الموجية لتفسير كيفية اتحاد المدارات الذرية لتكوين المدارات الجزيئية والتي تفسر بكفاءة ارتباط الذرات ببعضها لتكوين الجزيئات. وكان ذلك بمثابة حل لإحدى المشاكل التي لم تتمكن الميكانيكا الكلاسيكية من التوصل إليه.

• مبدأ الشك

في عام ١٩٢٧ قدم هايزنبرج مساهمة عظيمة في فيزياء الكم فقال بناءً على اتخاذ المواد سلوك الموجات إن بعض الخصائص مثل موضع الإلكترون وسرعته تعتبر أمور تكاملية "نسبية"، قاصداً وجود حد متعلق بثابت بلانك لمعرفة دقة كل خاصية مصرحاً بعدم وجود دقة وتأکید حتمي يحدد موقع الإلكترون وسرعته تحت عنوان "مبدأ عدم التأكد".

وكما زادت الدقة التي تحدد موضع الإلكترون كلما قلت الدقة اللازمة لمعرفة سرعته والعكس صحيح.

وتم تطبيق هذا المبدأ على الأشياء التي لديها أحجام طبيعية كتلك التي نراها في حياتنا اليومية، ولكن نقص الدقة فيها صغير جداً أي تزداد الدقة لتحديد موقعها وسرعتها. إلى الأمام نحو المزيد من نجاحات ميكانيكا الكم

لقد أكدت تلك المبادئ الثورية الثلاث (التكميم، ازدواجية الموجة والجسيم، عدم التأكد) على انطلاق عصر جديد في ميكانيكا الكم.. وفي عام ١٩٢٧. قدم بول ديراك مفهوم كمي جديد عن المجال الكهربائي والمغناطيسي ومهد الطريق أمام دراسة نظرية المجال الكمي QFT والتي تعالج الجزيئات مثل الفوتونات والإلكترونات كحالات مُثارة لمجال فيزيائي..

لقد استمر العمل على نظرية المجال الكمي QFT لعقد كامل حتى واجه العلماء عائقًا كبيرًا عندما فشلت معادلات النظرية بأن تعطي معنىً ماديًا ملموسًا علاوةً على نتائجها اللانهائية غير المحددة.. وفي عام ١٩٤٧ وبعد عقدٍ من الركود أحدث العالم هانز بيث تقدمًا هائلًا مستخدمًا تقنية جديدة تعرف بـ إعادة التشكيل أو الاستنظام Renormalization، وأرجع بيث هذه النتائج اللانهائية إلى طاقة الإلكترون الذاتية واستقطاب الفراغ، وبذلك يمكن استخدام القيم المرصودة عن كتلة الإلكترون وشحنته للتخلص من هذه النتائج اللانهائية..

منذ هذا التقدم الهائل؛ أصبحت نظرية المجال الكمي أساسًا لتطوير نظريات الكم لأربعة قوى جوهريّة في الطبيعة وهي:

١. المغناطيسية الكهربائية (القوة الكهرومغناطيسية).

٢. القوة النووية الضعيفة.

٣. القوة النووية الشديدة.

٤. الجاذبية.

الفكرة الأولى التي دعمتها نظرية الحقل الكمي QFT كانت إعطاء الوصف الكمي للمغناطيسية الكهربائية من خلال مجال ديناميكا الكم الكهربائية QED، والذي خطى خطوات واسعة نحو التقدم في أواخر الأربعينيات وحتى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

ثانيًا الوصف الكمي للقوى النووية الضعيفة والتي تم دمجها مع الكهرومغناطيسية لصوغ النظرية الكهروضعيفة EWT في ستينيات القرن الماضي.. وأخيرًا المعالجة الكميّة للقوى النووية الشديدة باستخدام الكروموديناميك الكمي QCD في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

تشكل نظريات QED و QCD الأساس لنظرية النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، وهو نموذج رياضي يُستخدم لدراسة سلوك وخصائص وتفاعلات الجزيئات الذرية ودون الذرية، ويفترض هذا النموذج وجود مجموعتين كبيرتين من الجسيمات الأولية وهما

الكواركات Quarks واللبتونات leptons ، ويفترض أيضًا وجود القوة الأولية المحمولة على البوزونات القياسية وبوزون هيگز Higgs Boson ، وهو جسيم أولي يظن أنه مسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها.

هكذا تربط نظرية النموذج القياسي للجسيمات بين ثنائي المادة والطاقة.. لسوء الحظ لم تستطع نظرية المجال الكمومي QFT حتى الآن أن تصدر نظرية كمية تشرح الجاذبية، وهذا التحقيق لا يزال قائمًا في الدراسات التي تجرى على نظرية الأوتار وجاذبية الكم الحلقية.

تطبيقات ميكانيكا الكم

لم تكتفِ ميكانيكا الكم بدخول العالم المجهرى، لكنها انتقلت إلى تطبيقاتٍ في حياتنا اليومية ما كانت لتوجد دونها، كالتصوير بالرنين المغناطيسي والموصلات الفائقة والترانزستورات التي لولاها لبلغ حجم حواسيبنا التي تعالج أمورًا هندسية أبنيةً بأكملها. كذلك التشفير الكمومي (المعتمد على التشابك) والذي يحمي الشبكات المصرفية وغيرها من الشبكات عالية الحساسية، والبشرية على موعدٍ ليس بالبعيد مع الحواسيب الكمومية التي ستحقق قفزةً في عالم المعلوماتية.

ولعل أهم الدروس المستفادة من ميكانيكا الكم هي قدرتها على إثبات قصور حواسنا كبشر، ومحدودية المنطلق الذي ننظر به إلى ما حولنا. كما لفتت أنظارنا إلى أمرٍ غايةٍ في الأهمية وهو أنّ ما نستخدمه من أجهزةٍ للقياس هي أجهزةٍ كلاسيكية قامت أصلًا على نتائج فيزياء كلاسيكية لذا لا يمكن الوثوق بما تخبرنا به أبدًا حين الحديث على مستوياتٍ كمومية، وحتى على المستوى الكوني ما نراه هو ما تخبرنا به أجهزة القياس، لكنه ليس رواية الكون عن نفسه

المحتويات

- الفصل الاول : مقدمة
- الفصل الثاني:
- الخصائص الجسيمية للأشعة الكهرومغناطيسية
- نظرية الكم الأولى: "ماكس بلانك" وإشعاع الجسم الأسود
- الفوتونات: كمية الضوء
- التأثير الكهروضوئي
- تأثير كومبتون
- الوصف الكمي للمادة: نموذج " بوهر" للذرة
- ازدواجية الموجة-الجسيم
- تطبيق لنموذج بور
- الفصل الثالث:
- الخصائص الموجية للجسيمات
- فرضية دي براولي
- تطور ميكانيكا الكم الحديثة
- تأويل كوبنهاغن
- مبدأ عدم اليقين
- التطبيق على ذرة الهيدروجين
- المعنى الفيزيائي للدالة الموجية
- معادلة شرودنجر
- بعض التطبيقات لميكانيكا الكم
- ظاهرة النفق الكمي
- بوزون هيغز

الفصل الاول

مقدمة:

ميكانيكا الكم هي مجموعة من المبادئ العلمية التي تفسر سلوك المادة وتفاعلاتها مع الطاقة على مقياس الذرات والجسيمات دون الذرية. توضح الفيزياء التقليدية دراسة المادة والطاقة بالعين المجردة المستوى على نطاق مألوف لتجربة إنسانية بما في ذلك سلوك الأجسام الفلكية. لكنها تبقى المفتاح الأساسي لقياس الكثير من العلوم والتكنولوجيا الحديثة؛ ومع ذلك في نهاية القرن ١٩ اكتشف العلماء ظواهر في العوالم الماكروية (الكبيرة) والمايكروية (متناهية الصغر) لم تتمكن الفيزياء التقليدية من تفسيرها.

فسّر توماس صامويل كون في تحليله لفلسفة العلم، أن "بنية الثورات العلمية" التي تُذكر في إطار هذه الحدود قادت إلى ثورتين عظيمين في الفيزياء، ما خلق تحولاً في النموذج العلمي الأصلي: وهما نظرية النسبية وتطور ميكانيكا الكم توضّح هذه المقالة كيف اكتشف الفيزيائيون قيود الفيزياء التقليدية وكيف طوروا مفاهيم نظرية الكم التي حلّت محلها في العقود الأولى من القرن العشرين. وصفت هذه المفاهيم الترتيب الذي اكتشفت فيه. قد تبدو بعض جوانب ميكانيكا الكم متناقضة أو غير منطقية وذلك لأنها تصف سلوكاً مختلفاً للغاية وفي حين تعد الفيزياء الكلاسيكية مقارنة ممتازة للواقع ويعتبر ريتشارد فيمان أن ميكانيكا الكم تتعامل مع "الطبيعة وكأنها عبثية". تتصرف أنواع عديدة من الطاقة مثل الفوتونات (وحدات ضوئية منفصلة) كالجسيمات من ناحية وكالأمواج من ناحية أخرى. مشعات الفوتونات (كضوء النيون) لها طيف انبعاث منفصل فقط في حالة وجود ترددات معينة من الضوء، تتنبأ الميكانيكا الكمية بالطاقات والألوان والكثافة الطيفية لجميع أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي يعني بذلك مبدأ الشك للميكانيكا الكمية وبه يمكن تحديد أقرب خاصية للقياس (كموقع الجسيم) ويجب أن يكون أقل دقة لقياس خاصية أخرى تتعلق بالجسيم نفسه (كزخم حركته). وما هو أكثر إثارة للقلق؟ هو أنه يمكن خلق أزواج من الجسيمات "كتوأم متشابك"، كما هو موصوف

مفصلاً في مقال التشابك الكمي تظهر الجسيمات المتشابكة ما أسماه انستين "فعل عصبي على بعد مسافة" فالتشابه بين الحالتين أن الفيزياء الكلاسيكية تصر على أن يكون عشوائياً حتى لو أن المسافة وسرعة الضوء تؤكدان على أن عدم اعتبار أي علاقة سببية فيزيائية لهذه العلاقات المتبادلة.

لِمَ احتجنا نظرية ميكانيكا الكم؟

مع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر ظنّ الناس أنّ الفيزياء قد انتهت، وأنها لا تحتاج إلى المزيد من التطور لتفسير الواقع من حولنا. فقد وصفت النظريات القوية في ذلك الوقت جميع الظواهر الطبيعية التي لاحظها وعاشها الناس، واحتاجت بعض التفاصيل الفرعية الترتيب والتفسير أكثر، فقط لا غير. لكن خلال العقود الزمنية التي تلتها، بدأت النظرية تضعف. أثبتت الملاحظات أنّه وعندما يتم العمل على مقياس صغير جداً، لا تعمل الطبيعة كما ظنّ الناس أنه يجب عليها. فتم تطوير ميكانيكا الكم لشرح هذه الصورة المستجدة. حتى نُعطيك فكرة عمّا كان يحدث، سننظر بشكل قصير إلى اثنتين من الاكتشافات المحرّجة بعض الشيء في ذلك الوقت.

الضوء الشيزوفرني Schizophrenic light

وهذا أحد الاكتشافات، وركّز على طبيعة الضوء. منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، كان الفيزيائيون متأكدين أنّ الضوء ينتقل على شكل أمواج، وبالتحديد أمواج الكهرومغناطيسية وهي فكرة ربما كانت مألوفة بالنسبة لك. الأمواج ذات الترددات المختلفة تنسجم مع الضوء بألوان مختلفة، وعندما تمتزج العديد من الأمواج ذات ترددات مختلفة، نرى اللون الأبيض كنتيجة لهذا المزيج. هذا التفسير للضوء أمواج كهرومغناطيسية كان ولا يزال يُحترم كأحد التحسينات العظيمة في الفيزياء، لكن كان هناك مشاكل.

إحدى هذه المشاكل هي عندما تُوجه شعاعاً من الضوء على المعدن. كما هو متوقع، سيقوم الضوء بقذف الإلكترونات إلى خارج المعدن، لكنها فعلت ذلك بطريقة لا يمكن للأمواج فعلها. هذه الظاهرة تُسمى بالتأثير الكهروضوئي. **Photoelectric effect.** وحيرت الناس لوقت من الزمن.

كتشف ألبرت آينشتاين في عام ١٩٠٥ حلاً لهذه المشكلة. اقترح أن نُفكر بالضوء كحزم صغيرة من الطاقة (أو كميات صغيرة من الطاقة). (Quanta) شرحت هذه الطريقة الحديثة في النظر للأشياء التأثير الكهروضوئي بطريقة ممتازة ومتكاملة، لكنها لم تستبدل الصورة الموجية للضوء.

وحتى تُفسر جميع الظواهر التي تتضمن وجود الضوء، يجب أن تتمسك بالصورة الموجية للضوء كذلك. حيث يشبه الضوء الأمواج في بعض الأشياء، ويشبه حُزم الجسيمات الصغيرة في أشياء أخرى. أي كما يمكن أن يُقال أنه لا يمكن تحديد ماهيته.

الذرات المُنهارة من مدار لآخر

وهذه إحدى الملاحظات الأخرى التي تضمّت الحديث عن بُنية الذرات. مع نهاية القرن التاسع عشر أيضاً ظنّ الفيزيائيون أنّ الذرات تشبه كعكة البرقوق كما أسموها: حيث أنّها تتكون من إلكترونات مشحونة بشحنة سالبة (وشبهوها بالبرقوق)، ومُحاطة بشحنة موجبة موزعة بشكلٍ متساوٍ (وشبهوها ببُنية الكعكة المُحيطة بالبرقوق). بالرغم من ذلك، وفي عام ١٩١١، اكتشف العالم إيرنست رذفورد Ernest Rutherford وزملاؤه اكتشافاً مُثيراً للاهتمام عندما قاموا بإطلاق جسيمات مشحونة بشحنة موجبة تُسمى بـ"جسيمات ألفا" **Alpha Particles** - على غشاء رقيق من الذهب. بالاعتماد على نموذج كعكة البرقوق، من المفترض أن تمرّ من خلال الغشاء. ولكن لحسن حظهم، لاحظ الباحثون أنّ بعض هذه الجسيمات ارتدت عن الغشاء الذهبي. وكما عبّر عنه رذفورد قائلاً:

“هذا الأمر مُثير للفضول كإطلاق قذيفة مدفعية على قطعة ورق، وترتد القذيفة.”

كان تفسير راذرفورد اللاحق بسيطاً بقدر ما يحتوي من ذكاء. إذا افترضنا أنّ الشحنة الموجبة بدلاً من أن تكون موزّعة بشكل متساوي في صفيحة الذهب كانت مركّزة في مركزها، سيكون المركز قوياً بما يكفي لمنع جسيمات ألفا العرضية والتي صدف أن تصطدم بالمركز. قادت الفكرة رذرفورد إلى تشبيه الذرة بالنظام الشمسي، حيث توجد الشحنة الموجبة في المركز وتتوزع الشحنات السالبة في مدارات تدور حول هذه المركز، والذي هو النواة .

على الرغم من تفسير رذرفورد الذي، إلا أنّ المشكلة في هذا التفسير أنّ الإلكترونات التي تدور حول نواة يتحتم عليها -بالاعتماد على النظرية- أن تُشعّ بعضاً من طاقتها مع مرور الزمن. وسيقود فقدان الطاقة للإلكترونات للدوران بشكل حلزوني نحو النواة، مما يسبب بالتالي انهيار الذرة في ذاتها. زد على ذلك، أنّ نمط اشعاع الطاقة سيكون متواصلاً، ولا يمكن أن يكون مشابهاً لأي شيء قد شهده العالم في الواقع، وهذا ما عُرف بطيف طاقة ذرة الهيدروجين، والذي لوحظ لأول مرة في عام ١٨٨٥.

قدّم العالم نيلز بور Niels Bohr - هذا الحل للمعضلة عام ١٩١٣، حيث اقترح أنّه لا يمكن للإلكترونات أن تدور حول نواة الذرة بأي مسافة تختارها، بل فقط بمسافات محددة لها. عندما يخسر أحد الإلكترونات مقداراً من الطاقة، لا ينتقل مباشرة إلى النواة، بل ينتقل بشكل قفزة -قفزة كميّة- إلى المسافة المسموحة للطاقة التي يمتلكها. بمعنى آخر، بعد الإلكترونات عن النواة مُقترن بكمية الطاقة التي يمتلكها الإلكترون، ويستطيع الإلكترون الدوران حول النواة ضمن مدارات محددة بحيث كل مدار ينتقل له الإلكترون بسبب كمية الطاقة الموجودة لديه. وعندما يصل الإلكترون إلى مرحلة المسافة الأقل المسموحة له بالاقتراب من النواة، يبقى في مكانه، وفي هذه الحالة يمكننا أن نقول أنّ الذرة ستبقى مستقرّة.

احتوى نموذج بور على مِيزة أُخرى، وهي: أنه استطاع فصل طيف الهيدروجين المذكور سابقاً، والذي حيرّ الناس حتى الآن.

أثبتت هذه الظاهرة الجديدة وتفسيراتها شيئاً كان ناقصاً في النظريات الكلاسيكية. لم نُفكر أنّ الطبيعة بإمكانها تحديد عملية قفز، أو احتوائها على تصرفات انفصامية مثل الضوء. كان من الواضح أنّ الفيزياء احتاجت نظرية جديدة، نظرية تستطيع تفسير هذه التصرفات الغريبة ولا تحتاج إلى تضميد الفجوات الناقصة فيها. وهذه النظرية كانت نظرية ميكانيكا الكم.

نظرية ميكانيكا الكم

(أو فيزياء الكم) أو ما يُشار إليه عادةً بميكانيكا الكم هي جزء من الفيزياء، وتحديدًا الفيزياء الحديثة، وهي النظرية التي تهتم بدراسة سلوك المادة والضوء في المستوى الذري والدون ذري (أي بأبعاد تُقاس بالنانومتر على الأكثر، حيث إن النانومتر الواحد يساوي 1×10^{-9} متر). تحاول ميكانيكا الكم تفسير سلوك الذرة ومكوناتها الأساسية (مثل البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات) ومكونات مكوناتها الأساسية) مثل الكواركات) بالإنجليزية ((Quarks : مجتمعة أو كلٌّ على حدة. [١][٢] الفيزياء الكلاسيكية تهتم بدراسة العديد من الأمور منها الميكانيكا، وفي الميكانيكا تهتم الفيزياء في تحديد موقع الجسم بدقة، بالإضافة إلى تحديد زخمه، والزخم هو تعبير عن مقدار الحركة، وهو خاصية خاصة بالأجسام فقط (أي إنه لا يمكن للموجات أن تمتلك زخمًا) وهذا الأمر ممكنٌ في الفيزياء الكلاسيكية، وهو يزودنا بمعلومات عن الأنظمة الفيزيائية في الحاضر والمستقبل وحتى في الماضي (مثل معرفتنا لموعد اقتراب مذنب هالي من كوكب الأرض). هذا الأمر غير ممكن في ميكانيكا الكم لأنه ليس من الممكن تحديد موقع الجسيمات الذرية ودون الذرية بدقة عالية مع زخمها بالوقت نفسه؛ الأمر الذي سوف يمنع التنبؤ بسلوك الجسم. عدم القدرة على تحديد خصائص النظام الكمي بدقة هو ليس إلا بسبب طبيعة السلوك الغريب الموجود في العالم الكمي.

مولد ميكانيكا الكم

الفيزياء علم قائم على التجربة بشكلٍ أساسي، وحتى يتم الاعتراف وقبول النظريات الفيزيائية فلا بد لها من أن تتوافق مع التجارب. وبما أن الفيزياء علمٌ تجريبي فقد أظهرت بعض التجارب بعد نصف القرن التاسع عشر نتائج غريبة، هذه التجارب كانت متعلقة بدراسة سلوك الذرات والجزيئات وكانت النتائج غير موافقة للتفسير الكلاسيكي لهذه الظواهر، ومن هنا ظهرت الحاجة لإعادة التفكير في بعض مبادئ الفيزياء الأساسية وبرزت الحاجة لتفسير الظواهر الطبيعية بطريقة جديدة ومختلفة عن السابق، عُرفت فيما بعد بميكانيكا الكم. [٤] الحاجة إلى نظرية الكم برزت من عجز الفيزياء الكلاسيكية عن تفسير بعض الظواهر، وكان من أبرز هذه الظواهر إشعاع الجسم الأسود، والظاهرة الكهروضوئية، وتأثير كومبتون، بالإضافة إلى خطوط الانبعاث لذرة الهيدروجين. الحاجة لتفسير هذه الظواهر وغيرها ولدت ميكانيكا الكم، وميكانيكا الكم بدورها ولدت تفسيراً للعديد من الظواهر الأخرى الأكثر تعقيداً والتي لربما لم نكن لنتمكن من ملاحظتها لولا ظهور ميكانيكا الكم في الأساس

بعض الأفكار الأساسية في ميكانيكا الكم

يوجد العديد من الأفكار المهمة والأساسية جداً في ميكانيكا الكم، والتي يقوم عليها هذا العلم، وفي هذا المقال سوف نذكر بعض هذه الأفكار: [٧] الطاقة تأتي على شكل حزم منفصلة تُعرف بالكمّات ولا يمكن أن تأتي على شكل حزمة متصلة. هذا الأمر هو الذي توصل إليه العالم ماكس بلانك عندما قام بحل مشكلة الكارثة فوق البنفسجية المتعلقة بتفسير منحني الطيف الكهرومغناطيسي المنبعث من الجسم الأسود، حيث كان حل هذه المشكلة في فكرة ماكس بلانك في تكميم الطاقة. [٨] في المستوى الذري ودون الذري لا يمكن تطبيق الفيزياء الكلاسيكية على الظواهر الطبيعية (مثل قوانين نيوتن) فهي ستفشل في تفسير الظاهرة.

(مبدأ عدم التحديد) (The Uncertainty Principle) :

وهو المبدأ الذي يخبرنا بعدم قدرتنا على تحديد موقع الجسيم وزخمه بدقة عالية بشكلٍ متزامن (أيضاً يمكن تطبيقه على الطاقة وعلى الزمن، إذ إنه لا يمكن تحديد طاقة النظام بدقة

وكم من الوقت سوف يبقى محتفظاً بهذه الطاقة). لا يمكن معاملة النظام الفيزيائي (الضوء، أو الجسيمات المقاسة بعدها بالنانومتر) كجسيمات أو موجات إلا بعد إجراء تجربة، وهذا هو ما يُعرف بالخاصية الجسيمية-الموجية للأنظمة الدون ذرية. [٨] إنه لمن المهم التعليق على النقطتين ٣ و ٤ وربطهما ببعضهما البعض، حيث إنه وكما ذكرنا في النقطة الرابعة فإن الأنظمة دون الذرية لا تكون موجة ولا جسيم قبل إجراء التجربة، وإنما الذي يحدد طبيعة سلوكهما سواء كان موجياً أو جسيمياً هو طبيعة التجربة التي يقوم بها الراصد؛ إذ إن الراصد لو أجرى تجربة على الإلكترونات تُظهر الإلكترونات كموجات (مثل تجربة شقي يونغ) فإن الإلكترونات سوف تسلك سلوكاً موجياً بينما لو قمنا بإجراء التجربة ذاتها وتلاعبنا قليلاً بأدوات الرصد فإن الإلكترونات سوف تسلك سلوكاً جسيمياً، إذاً التجربة هي من يحدد سلوك النظام الفيزيائي. الأمر المهم الآخر هو أن هذا التغير في سلوك النظام الفيزيائي المدروس بين موجةٍ وجسيمٍ ناتج من الطبيعة نفسها، وليس الأمر أن الأجهزة التي لدينا ليست دقيقة كفاية، كل ما في الأمر أن الطبيعة جاءت بهذا الشكل. [٨] أخيراً عند الحديث عن طبيعة سلوك النظام الفيزيائي وبمبدأ عدم التحديد لهايزنبرغ فإنه -وعلى سبيل المثال- لو قمنا بدراسة ذرة الهيدروجين فإن الإلكترون الذي يدور حول النواة يمكن أن يُرصد كأنه جسيم أو كأنه موجة، وهذا تبعاً للتجربة، لكن من الجدير بالذكر أنه لو تم رصد الإلكترون حول النواة كموجة فإنه يمكن تحديد زخمه (سرعته) بسهولة ودقة عالية لكن وبالمقابل، لن يكون بالإمكان تحديد موقعه بدقة. أيضاً لو حدد موقع الجسيم فإنه في هذه الحالة سوف يكون قد سلك سلوكاً جسيمياً، إلا أنه في هذه المرة لن يمكننا تحديد زخمه بدقة. هذا الأمر وهذه النتائج لم تُعجب آينشتاين، وكان له رأيه الرافض لبعض الأفكار في ميكانيكا الكم، وهذه واحدة منها، ولربما يمكن أن يُعذر لأن هذه الظواهر غريبة وشاذة جداً عما عهدناه في حياتنا اليومية، لكننا لا يمكننا أن نرفض ميكانيكا الكم لأنها تعمل بكفاءة عالية.

الحاجة إلى ميكانيكا الكم وحدود الميكانيكا الكلاسيكية

بالتأكيد الفيزياء علم قائم على التجربة بشكلٍ أساسي، ويجب على أي نظرية أن توافق التجارب تماماً قبل الاعتراف بصحة هذه النظرية لتكون نظرية فيزيائية. بعد نصف القرن التاسع عشر أظهرت نتائج بعض التجارب المتعلقة بدراسة سلوك الذرات والجزيئات نتائج غير موافقة (غير موافقة تماماً، أو غير موافقة بشكلٍ كامل) للتفسير الكلاسيكي لهذه الظواهر، ومن هنا ظهرت الحاجة لإعادة التفكير في بعض مبادئ الفيزياء الأساسية وظهرت ميكانيكا الكم. [٤] الحاجة إلى نظرية الكم برزت من عجز الفيزياء الكلاسيكية تفسير بعض الظواهر، وكان من أبرز هذه الظواهر إشعاع الجسم الأسود، والظاهرة الكهروضوئية، وتأثير كومبتون، بالإضافة إلى خطوط الانبعاث لذرة الهيدروجين. الحاجة لتفسير هذه الظواهر وغيرها ولدت ميكانيكا الكم، وميكانيكا الكم بدورها ولدت تفسيراً للعديد من الظواهر الأخرى الأكثر تعقيداً، والتي لربما لم نكن لنتمكن من ملاحظتها لولا ظهور ميكانيكا الكم في الأساس. [٥][٦]

إشعاع الجسم الأسود

أي جسم موجود في الطبيعة يقوم بإشعاع أمواج كهرومغناطيسية بأطوال موجية مختلفة، والجسم الذي يُعيد إشعاع جميع الأشعة الساقطة عليه بشكلٍ كاملٍ يُسمى (بالجسم الأسود). ويظهر منحني إشعاع الجسم الأسود (بالإنجليزية Black Body Radiation: أن بعض الأطوال الموجية التي يُشعّها هذا الجسم سوف تمتلك طاقة أعلى من غيرها (بشكلٍ عام فإنه سوف يمتلك كل طول موجي من الطيف الكهرومغناطيسي مقداراً خاصاً به من الطاقة). منحني الجسم الأسود (أو الطيف الذي سوف يشعّه الجسم الأسود) يعتمد فقط على درجة حرارة الجسم الأسود. [٧] تقوم الفيزياء الكلاسيكية بتفسير هذه الظاهرة عبر القول بأن الطيف الكهرومغناطيسي يتولد من اهتزاز الشحنات الكهربائية؛ أي تغييرها لحالتها الحركية، وهذا يتضمن تغير هذه الشحنة لسرعتها أو اتجاهها). كما أنه من المعروف أن الجسم الأسود سوف يقوم بالإشعاع إذا تم تسخينه، أي إنه عند تسخين الجسم الأسود فإن الإلكترونات الموجودة فيه سوف تهتز، وبما أن الإلكترونات هي أجسام مشحونة فإن الجسم

الأسود سوف يشع طيفاً كهرومغناطيسياً نتيجة هذا التسخين، وكلما زادت درجة حرارة هذا الجسم فإنه سوف يسطع أكثر. بالرغم من أن هذا التفسير لعملية الإشعاع جيد جداً، إلا أن الفيزياء الكلاسيكية لم تنجح في تفسير شكل منحنى الجسم الأسود. بعد عدة محاولات كلاسيكية فاشلة لتفسير شكل المنحنى جاء العالم ماكس بلانك (بالإنجليزية Max Planck) وفسّر شكل المنحنى عن طريق افتراض أن الطاقة تأتي على شكل حزمٍ متقطعة تتناسب مع تردد هذه الاهتزازات (أي إن الطاقة تتناسب مع عدد الاهتزازات في وحدة الزمن)، وسمّى بلاك هذه الحزم المتقطعة بالكمّات (بالإنجليزية). [V: Quanta]

الظاهرة الكهروضوئية

وباختصار فإنها تعني انبعاث الكترونات من سطح معدن عند سقوط الضوء عليه

الظاهرة الكهروضوئية :

اولا :الفيزياء الكلاسيكية وفشلها :

تقول إننا لو سلطنا ضوء له شدة عالية ، أوحتي سلطنا الضوء شدته منخفضة لفترة زمنية طويلة سوف تنبعث الالكترونات من المعدن .. و لكن النتائج العملية جاءت مخيبة لأمالهم

ثانيا :الفيزياء الحديثة ونجاحها :

لا تنبعث الالكترونات الا اذا كانت طاقه الفوتونات اكبر من قيمة معينه فمثلا فوتون واحد قادر علي تحرير الكترون واحد من المعدن و المهم أن تكون طاقة هذا الفوتون اكبر من طاقة معينه ، فلو اعتبرت ان عدد كبير من الفوتونات - لهم طاقة اقل من القيمة المعينة - فلن يستطيعوا تحرير هذا الالكترون إذن سبب فشل الفيزياء الكلاسيكية هو اعتبارها أن الضوء عباره عن موجات فقط وسبب نجاح الفيزياء الحديثة هو اعتبارها ان الضوء عبارة عن جسيمات تسمى فوتونات


تأثير كومبتون

تأثير كومبتون (بالإنجليزية (Compton Effect): يؤكد لنا بأن الضوء يمكن معاملته كجسيم يُعرف بالفوتون (بالإنجليزية (Photon):، وهذا عن طريق تجربة معينة. بالتأكيد هذه الظاهرة غير متوافقة مع الفيزياء الكلاسيكية التي تُعامل الضوء وكأنه موجة فقط، وتجزم باستحالة معاملته كجسيم، حيث إنه لا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بالاستعانة بخاصية هي فقط مقتصرة على الأجسام وهي الزخم. [٣][٥] لو كان لدينا إلكترون ساكن، وأطلقنا عليه شعاعاً ضوئياً فإن الضوء سوف يتشتت عن هذا الإلكترون، ولكن الإلكترون في الوقت نفسه سوف يكتسب زخماً ويتحرك. وحسب قانون حفظ الزخم الخطي - والذي يُعتبر واحداً من أهم القوانين في الطبيعة- فإنه يجب أن يكون الزخم قبل التصادم مساوياً للزخم بعد التصادم، ومن الجدير بالذكر أنه بقولنا (تصادم) فهذا يعني أننا نتحدث عن جسيمات لأن الأمواج لا تتصادم، والدليل القاطع على أن الذي حدث هو تصادم هو أن الإلكترون اكتسب زخماً خطياً عند سقوط الفوتون عليه. الآن بما أن الزخم قبل التصادم كان صفراً وبعد التصادم أصبح له قيمة غير الصفر فإنه بذلك يمكن الجزم بأن الضوء يمكن معاملته كجسيم.

الفصل الثاني

The particle aspects of electromagnetic radiation

الخصائص الجسيمية للأشعة الكهرومغناطيسية



قبل الشروع في دراسة موضوع الخصائص الجسيمية للأشعة الكهرومغناطيسية يجب أن نعرف ما هي الأشعة الكهرومغناطيسية وما هي خصائصها وكيف تتولد وما هو مصدرها ولهذا يرجى العودة إلى موضوع المنشور تحت باب التفسيرات الفيزيائية والإطلاع على موضوع ما هي الأشعة الكهرومغناطيسية؟

إن للأشعة الكهرومغناطيسية خاصية مزدوجة فهي لها خصائص موجية عندما نتحدث عن ظواهر فيزيائية مثل الحيود والتداخل وهذه الظواهر لا يمكن تفسيرها إلا إذا تعاملنا مع الأشعة الكهرومغناطيسية على أساس إنها تتصرف بخاصيتها الموجية.. ولكن ظواهر أخرى مثل انعكاس الأشعة الكهرومغناطيسية على أسطح المرايا أو انكسارها عند مرورها في وسط منفذ له معامل انكسار مختلف عن الوسط الذي سقطت منه مثل العدسات والمنشور الزجاجي فإن الأشعة الكهرومغناطيسية تتصرف بخاصيتها الجسيمية ولا يمكن هنا التعامل مع الأشعة الكهرومغناطيسية إلا على إنها جسيمات مادية.. وهذا ما جعل العلماء ينقسموا إلى قسمين الأول مؤيد للخاصية الموجية والآخر مؤيد للخاصية الجسيمية..

ولكن مع التقدم العلمي في مطلع القرن العشرين تم اكتشاف ظواهر أخرى غير التي سبق ذكرها مثل إشعاع الجسم الأسود أو الظاهرة الكهروضوئية أو ظاهرة كمبتون وغيرها وهذه الظواهر لا يمكن التعامل معها أو تفسيرها إلا إذا اعتمدنا الخاصية الجسيمية للأشعة الكهرومغناطيسية واستعنا بمفهوم فيزياء الكم Quantum Physics.

مفهوم فيزياء الكم

تعتبر النظرية النسبية ونظرية الكم من أعظم إنجازات القرن العشرين العلمية, حيث قدمت النظرية النسبية مفهوما جديدا للمكان والزمان والذي كان له بالغ الأثر في علوم الميكانيكا والكهرومغناطيسية, أما نظرية الكم فقدمت طريقة جديدة للتفكير في سلوك الجسيمات الدقيقة كالذرات والانوية والالكترونات. استخدام نظرية الكم ليس علم جديدا بل إن له تطبيقات في الفيزياء الكلاسيكية أيضا .. وتقسم الكميات الفيزيائية إلى قسمين إما مكممة أو متصلة كما هو موضح في الشكل التالي:

الطاقة المتصلة و الطاقة المنفصلة:

الحاله الاولى:

نقول للجسم أن له طاقة متصلة إذا سمح له أن يأخذ أي قيمة من الطاقة ، فمثلا جسم كل طاقته هي طاقة حركة فيمكن أن تزيد أو تنقص بدون أي قيود او شروط


الحاله الثانيه :

نقول أن للجسم طاقة منفصلة أو متقطعة إذا سمح للجسم أن يأخذ قيم محددة للطاقة فمثلا الجسم يمكن أن تكون طاقته E_1 أو E_2 أو E_3 أو E_n ، والقيم E_1, E_2, E_3, \dots تسمى مستويات الطاقة ولا يجوز للجسم حينئذ أن تكون طاقته تتراوح بين القيمة E_1 و E_2 ، أو تتراوح بين القيمة E_2 و E_3 ، أو الخ وهذا هو الشيء الجديد و الغريب الذي أضافته نظرية الكم فلو فرضنا أن طاقة الجسم كانت E_1 وأعطينا هذا الجسم قدرا من الطاقة فهناك أمرين:

١- إذا كانت قيمة الطاقة المعطاه اقل من $(E_1 - E_2)$ فان طاقة الجسم الكلية ستكون E_1

٢- إذا كانت قيمة الطاقة المعطاه تساوي $(E_1 - E_2)$ فان طاقة الجسم ستكون E_2 ، وبذلك يمكننا القول بأن الجسم انتقل من المستوي E_1 الي المستوي E_2 و نسمي الفرق

بين مستويات (قيم الطاقة) بالمسافات الطاقية. إذا كانت المسافات بين مستويات الطاقة كبير نقول إن الطاقة متصلة و إذا كانت المسافات بين مستويات الطاقة صغير جدا فيمكن النظر إليها باعتبار أن الجسم يتخذ أي قيم للطاقة و ذلك يجيز لنا القول بان الطاقة متصلة



- ✓ سرعة الضوء في الفراغ دائما تساوي c.
- ✓ الشحنة التي يكتسبها الجسم دائما تكون عدد صحيح من شحنة الإلكترون.
- ✓ سرعة الأجسام المادية يمكن إن تكون أية قيمة من الصفر إلى اقل من سرعة الضوء.
- ✓ الأمواج الموقوفة التي تتكون نتيجة اهتزاز وتر مثبت عند طرفيه.
- ✓ الطاقة الميكانيكية التي تربط جسيمين يمكن إن تأخذ قسم متصلة بالسالب أو الموجب.
- ✓ الزاوية التي تأخذها إبرة مغناطيسية موجودة في مجال مغناطيسي خارجي. أيضا تأخذ قيم متصلة.

تم اكتشاف نظرية الكم بعد استخدامها في تفسير ظاهرة إشعاع الجسم الأسود والتي لم يتمكن العلماء من تفسير هذه الظاهرة إلا عندما قدم العالم ماكس بلانك في عام ١٩٠٠ تفسيراً معتمداً على نظرية الكم.. وهذه الظاهرة التي سنبدأ بها لتوضيح المفهوم الفيزيائي للنظرية الكمية والخاصية الجسيمية للإشعاع الكهرومغناطيسي..

• نظرية الكم الأولى: "ماكس بلانك" وإشعاع الجسم الأسود

• Blackbody Radiation




ينبعث إشعاع كهرومغناطيسي من كل الأجسام عند أية درجة حرارة يتواجد عندها ويسمى بالإشعاع الحراري. كمية هذا الإشعاع الحراري المنبعث من الجسم يزداد بزيادة درجة حرارة ويقل بنقصانها. كما أن الأجسام تتبادل الحرارة بينها وبين الوسط المحيط بها إذا اختلفت درجات الحرارة بينهما، فإذا كانت درجات الحرارة متساوية ففي هذه الحالة يكون الجسم في حالة اتزان حراري Thermal Equilibrium أي إن ما يمتصه الجسم من أشعة حرارية من الوسط المحيط به لكل وحدة زمن تساوي ما ينبعث منه.

إن توزيع الأشعة المنبعثة من الجسم عند درجة حرارة معينة كدالة في الطول الموجي كانت مسألة محيرة للعلماء حيث إنهم لم يجدوا تفسيراً علمياً للنماذج العملية التي توضح علاقة توزيع الأشعة مع الطول الموجي ولم تكن النظرية الكلاسيكية قادرة على إيجاد تفسير لها وذلك حتى مطلع القرن العشرين.

المنحني الموضح في الشكل التالي يوضح العلاقة لتوزيع شدة الأشعة المنبعثة من الجسم الأسود كدالة في الطول الموجي بوحدة النانومتر.. والمنطقة المحددة باللون الأزرق إلى اللون الأحمر توضح الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي.

ما هو الجسم الأسود

تعتمد الأشعة المنبعثة من الجسم بالإضافة إلى درجة حرارته على عدة عوامل مثل نوع مادة الجسم ولذلك تم تعريف جسم مثالي عبارة عن جسم اسود قادر على امتصاص كافة الأشعة الساقطة عليه وهذا الجسم عبارة عن صندوق مجوف له ثقب صغير فإذا سقط شعاع إلى داخل الصندوق من خلال الثقب فإن الشعاع ينعكس على جدران الصندوق الداخلي حتى يتم امتصاصه بالكامل.



توزيع الانبعاث الحراري الصادر عن الجسم الأسود

بدراسة الانبعاث الحراري المنبعث من الجسم الأسود عند درجات حرارة مختلفة وجد عملياً أن هناك نتيجتان هما:

* النتيجة الأولى: أن هناك توزيعاً معيناً لشدة الإشعاع المنبعث من الصندوق الأسود كدالة في الطول الموجي (λ) أو طاقة الأشعة لأن الطاقة E ترتبط مع الطول الموجي من خلال العلاقة

$$E = hc / \lambda$$


كما إن الطاقة ترتبط مع التردد من خلال العلاقة التالية:

$$E = h\nu$$

حيث ν المتردد.

* النتيجة الثانية: كلما زادت درجة الحرارة للجسم الأسود تكون الطاقة المنبعثة منه تحدث عن أطوال موجية اقل ويزداد مقدار الإشعاع بزيادة درجة الحرارة.

الشكل التالي يوضح رسم بياني للنتائج العملية لإشعاع الجسم الأسود عند درجات حرارة مختلفة



لا شك إن ظاهرة إشعاع الجسم الأسود نلاحظها في حياتنا اليومية فعند تسخين جسم ما مثل الحديد نلاحظ إن الجسم عندما ترتفع حرارته يبدأ في إشعاع لون قريب من اللون الأحمر وعندها تكون درجة حرارة الجسم تقارب ٧٠٠ درجة مئوية ثم بزيادة الحرارة يتحول إلى اللون البرتقالي وهكذا حتى يصل إلى اللون الأبيض والذي يدل على أن الجسم وصل إلى درجة حرارة ١٢٠٠ درجة مئوية. فمثلاً فتيلة المصباح الكهربائي التي تعطي الضوء الأبيض فإن حرارتها ترتفع بمرور التيار الكهربائي فيها إلى إن تصل درجة الحرارة إلى ١٢٠٠ درجة مئوية.

محاولات وتفسيرات العلماء للطيف المنبعث من الجسم الأسود

• قانون ستيفان بولتزمان

ينص قانون ستيفان بولتزمان على أن الطاقة المنبعثة من الجسم الأسود لكل وحدة مساحة تتناسب مع القوة الرابعة لدرجة حرارة الجسم.

$$E(T) \propto T^4$$

$$E(T) = \sigma T^4$$

$E(T)$ is the energy of the blackbody radiation per unit area

σ is called Stefan constant = $5.67 \times 10^8 \text{ Watt/m}^2\text{K}^4$


T is the temperature in Kelvin

وثابت ستيفان لا يعتمد على المادة أو طبيعتها أو شكلها وهو ثابت عام.

وهذا القانون أثبتته العالم بولتزمان باستخدام قوانين الديناميكا الحرارية وسمي باسميهما..

• قانون وينز Wien's Law

يتعلق قانون وينز بتردد الأشعة التي يكون عندها الإشعاع الحراري اكبر ما يمكن وقد وجد علمياً أن التردد يزداد بزيادة درجة الحرارة كما هو موضح في المنحنيات التالية:



ووضع العام وينز القانون التالي:

$$\nu_{\max} = \text{constant} \times T \text{ (Winz Displacement Law)}$$

حيث إن قيمة الثابت تساوي $5.88 \times 10^{10} \text{ Hz/K}$

قام العالم وينز بوضع معادلة لتفسير توزيع كثافة الطاقة على الأطوال الموجية في حدود المدى من λ إلى $\lambda + d\lambda$ وهي على النحو التالي:

$$E(\lambda)d\lambda = c_1 \lambda^{-5} e^{-c_2/\lambda T} d\lambda$$

حيث أن c_1, c_2 ثوابت اختيارية لمطابقة المعادلة مع النتائج العملية ووجد أن هذه المعادلة تنطبق على إشعاع الجسم الأسود عن الترددات العالية فقط (الأصول الموجية القصيرة).

• نظرية رايلي جينز

اعتبر العالمان رايلي وجينز أن الجسم الأسود مكون من عدد كبير من المتذبذبات المشحونة التي تتحرك حركة توافقية بسيطة simple harmonic motion وهذه المتذبذبات المشحونة تطلق أشعة

كهرومغناطيسية أثناء حركتها بحيث تكون كثافة توزيع الطاقة المنبعثة من الجسم الأسود مساوية لكثافة الطاقة للمتذبذبات عند الاتزان الحراري. وقد وضع العالمان بناء على هذه الفرضية المعادلة التي تعطي عدد المتذبذبات لكل وحدة حجوم المسئولة عن كثافة الإشعاع عند طول موجي معين حيث أن:

$$g(\lambda)d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} d\lambda$$

وتكون طاقة هذا العدد من المتذبذبات هي المسئولة عن طول موجي في المنطقة من $\lambda + d\lambda$, λ عند درجة حرارة T

$$E(\lambda, T) = \frac{2\pi C}{\lambda^4} KT$$

حيث KT تعطي قيمة متوسط طاقة المتذبذبات و K هو ثابت بولتزمان والطرف الأيسر من المعادلة يعبر عن الطاقة لكل وحدة حجوم.

ولكن هذه الفرضية لرايلي وجينز فشلت في تفسير طيف الجسم الأسود.

نظرية بلانك لإشعاع الجسم الأسود

وضع بلانك نظريته لتفسير ظاهر إشعاع الجسم الأسود وقد كانت نظريته ناجحة وذلك لاعتماده على استخدام مبدأ تكميم الإشعاع. وقد وضع بلانك بعض الافتراضات على أساس النظرية الكمية للإشعاع وهي على النحو التالي:

(١) كمية الطاقة المنبعثة أو الممتصة من المتذبذب في الجسم الأسود تتناسب مع تردده أي أن

$$\Delta E \propto \nu$$

$$\Delta E = h\nu$$

where h is the blank constant = $6.6 \times 10^{-34} \text{J.s}$

(٢) تأخذ طاقة المتذبذب قيم محددة (مكممة) أي أن

$$E_n = nh\nu$$

Where n is the principal quantum number ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

فإذا كانت $n=0$ يكون المتذبذب في أدنى قيمة له في الطاقة ويسمى Ground Level أما إذا كانت $n=1$ فإن المتذبذب يكون في مستوى طاقة رقم (١) وهكذا

من هنا نلاحظ أن بلانك ادخل مبدأ التكميم على المتذبذبات في الجسم الأسود وأنها لها طاقات محددة وبقيم محددة بالعدد الكمي n ولا وجود لقيم متصلة للطاقة كما افترض العالمان رايلي جينز.

وعند امتصاص أشعة أو انبعاثها من الجسم الأسود فإن طاقتها تساوي فرق الطاقة بين مستويات الطاقة للمتذبذبات بحيث إن

$$E = h\nu$$

ويحمل هذا الكم من الطاقة جسيم يسمى الفوتون Photon وتكون كمية حركته

$$P = h/\lambda$$

وعلى أساس هذه الفرضيات تمكن العالم بلانك من اشتقاق قانون بلانك لإشعاع الجسم الأسود الذي فسر النتائج العلمية


$$E(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

$$E(\nu, T) = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

الفوتونات : كمية الضوء

في عام ١٩٠٥ اتخذ ألبرت آينشتاين خطوة إضافية أشار فيها أن كمية الضوء لم تكن خدعة رياضية حيث أن الطاقة في شعاع الضوء تظهر في حزم فردية والتي تسمى الآن فوتونات وتحسب طاقة الفوتون الواحد عن طريق ضرب التردد بثابت بلانك وقد تجادل العلماء لعدة قرون بين نظريتين محتملتين للضوء: هل هو موجة أم تيار من الجسيمات الصغيرة؟ وبحلول القرن التاسع عشر تم تسوية الجدل بشكل عام لصالح نظرية الموجة حيث كانت قادرة على تفسير آثار ملحوظة كانكسار وانحراف الضوء والاستقطاب وقد بين جيمس كليرك ماكسويل أن كلاً من الكهرباء والمغناطيس والضوء مظاهر لنفس ظاهرة الحقل الكهرومغناطيسي وتصف معادلات ماكسويل والتي هي مجموعة كاملة من قوانين الكهرومغناطيسية الكلاسيكية الضوء على أنها موجات مجموعة من الحقول الإلكترونية والمغناطيسية المتذبذبة وبسبب رجحان الأدلة لصالح نظرية الموجة فإن فكرة أينشتاين التقت مبدئياً بشكوك هائلة ولكن وفي نهاية المطاف أصبح نموذج الفوتون محبباً وكان أحد الأدلة المهمة لصالحه هو قدرته على تفسير عدد من الخصائص المحيرة للتأثير الكهروضوئي والذي سيتم وصفه في القسم التالي ومع ذلك ظل تشبيه الموجة أساسياً لا غنى عنه لمساعدته في فهم خصائص أخرى للضوء كانحراف الضوء.

التأثير الكهروضوئي



يشع الضوء (الأسهم الحمراء، يساراً) فوق المعدن. إذا كان الضوء ذا ترددٍ كافٍ (أي طاقة كافية)، فإن الإلكترونات تنطلق (الأسهم الزرقاء، يمين)

The Photoelectric Effect


الظاهرة الكهروضوئية

الظاهرة الكهروضوئية هي إحدى الظواهر العديدة التي يمكن منها انبعاث الكترونات من سطح مادة فمن هذه الظواهر (١) الانبعاث الحراري (٢) الانبعاث الثانوي (٣) الانبعاث الكهربي (٤) الانبعاث الكهروضوئي.

الظاهرة الكهروضوئية تحدث عند سقوط إشعاع كهرومغناطيسي على سطح معدن فينتج عنه تحرير الكترونات من سطح المعدن. ولتفسير ما يحدث هو إن جزء من طاقة الشعاع الكهرومغناطيسي يمتصها الإلكترون المرتبط بالمعدن يتحرر منه ويكتسب طاقة حركة. وهذه العملية تعتمد على العديد من المتغيرات وهي:

- تردد الشعاع الكهرومغناطيسي
- شدة الشعاع الكهرومغناطيسي
- التيار الفوتوضوئي الناتج
- طاقة حركة الإلكترون المتحرر من سطح المعدن
- نوع المعدن

ولفهم تأثير كل عامل من العوامل السابقة فإننا سندرس تأثير العوامل السابقة على التيار الكهربي الناتج والذي يسمى هنا التيار الفوتوضوئي photocurrent لأنه نتج عن تحرير الالكترونات بواسطة الضوء (شعاع كهرومغناطيسي) من خلال إجراء عدة تجارب عملية تعتمد على تغيير احد هذه العوامل مع تثبيت الباقي ودراسة تأثيره على التيار الفوتوضوئي. وفي الشكل التالي يوضح الجهاز المستخدم لهذا الغرض.



عندما يسقط شعاع كهرومغناطيسي أحادي اللون (Monochromatic) على سطح معدن (الأنود) متصل مع الطرف الموجب للبطارية وموجود داخل وعاء مفرغ من الهواء وذلك لمنع تصادم الالكترونات المتحررة بجزيئات الهواء. عندما تتحرر الالكترونات من سطح المعدن وتتمكن من الوصول إلى اللوح السالب (الكاثود) - وفي الأغلب يكون من نفس مادة الأنود - فإن تيارا كهربيا يمر في الدائرة ويمكن قياسه من خلال الأميتر والذي يعبر عن شدة التيار الفوتوضوئي المار في الدائرة وكلما ازدادت عدد الالكترونات المتحررة من سطح المعدن كلما كان التيار الناتج اكبر. (لاحظ هنا أن اتجاه التيار الاصطلاحي في عكس اتجاه حركة الالكترونات).

لاحظ أن

- طاقة الالكترونات المتحررة من الأنود مختلفة
- القوة الكهربائية الناتجة عن المجال الكهربائي بين الكاثود والأنود تعمل في عكس اتجاه حركة الالكترونات.
- طاقة حركة الالكترونات تكون مساوية للشغل المبذول عليها بواسطة المجال الكهربائي من خلال العلاقة التالية:



$$1/2mv^2=eV \quad (2.1)$$



حيث v سرعة الإلكترونات و V فرق الجهد المطبق بين لوحى الأنود والكاثود. ويعمل فرق الجهد هذا على إيقاف الإلكترونات ويمكن زيادته تدريجياً إلى أن نصل إلى القيمة التي عندها يسمى فرق الجهد المطبق بفرق جهد الإيقاف $stopping\ potential$ وهو الجهد اللازم لإيقاف أسرع الإلكترونات أو تلك التي تمتلك أعظم طاقة حركة. وعندها يكون التيار المار في الدائرة مساوياً للصفر.

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0 \quad (2.2)$$

ومن خلال هذه المعادلة يمكن تقدير أقصى سرعة للإلكترونات المنطلقة من الأنود وذلك من خلال زيادة فرق الجهد إلى أن يصبح التيار المار مساوياً للصفر ومن ثم إيجاد مقدار هذا الجهد والتعويض في المعادلة (٢.٢).

النتائج العملية للتجربة

	<p>(١) بمجرد تسليط الشعاع الكهروضوئي على الأنود يمر التيار في الدائرة في نفس اللحظة تقريباً وقد قدر الفارق الزمني بـ ١٠-٩ s ولا يعتمد الفارق الزمني بين سقوط الشعاع الكهرومغناطيسي والمرور التيار على شدة الأشعة أو ترددها.</p>
	<p>(٢) عند تثبيت التردد و فرق الجهد فإن التيار الكهروضوئي يزداد بزيادة شدة الأشعة الكهرومغناطيسية الساقطة على الأنود.</p>

 <p>(c)</p>	<p>(٣) عند ثبوت تردد الأشعة الكهرومغناطيسية وشدتها I فإن التيار الكهروضوئي يقل بزيادة فرق الجهد المطبق حتى تصل إلى القيمة صفر. وعندها تكون قيمة فرق الجهد هي V_0 والتي تسمى بجهد الإيقاف. ولا تعتمد قيمة جهد الإيقاف على شدة الأشعة الكهرومغناطيسية عند نفس التردد ولنفس المعدن</p>
 <p>(d)</p>	<p>(٤) وجد عمليا أن قيمة جهد الإيقاف تعتمد على تردد الأشعة الكهرومغناطيسية فكلما زاد التردد كلما كانت قيمة جهد الإيقاف أكبر. قيمة جهد الإيقاف تتغير بتغير نوع مادة المعدن. كما وجد أيضا أن قيمة جهد الإيقاف لا تعتمد على شدة الأشعة الكهرومغناطيسية. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن أدنى تردد ν_0 مطلوب للانبعاش الإلكتروني من سطح المعدن يسمى بالتردد الحرج threshold frequency.</p>

لا يمكن أن نحصل على تيار كهروضوئي إلا إذا كان تردد الأشعة الكهرومغناطيسية أكبر من التردد الحرج لأي معدن يستخدم في التجربة فقد وجد من تحليل النتائج العملية للتجربة (٤) أن المنحنيات هي معادلة خط مستقيم يأخذ المعادلة التالية:

$$eV_0 = h\nu - h\nu_0 \quad (2.3)$$

حيث أن h هي ميل المنحنى والتي وجدت أنها ثابتة لكل المعادن المستخدمة في التجارب. وأن ν_0 هي التردد الحرج لكل معدن. كما يمكن كتابة المعادلة السابقة بالصورة التالية:

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + h\nu_0 \quad (2.4)$$

التفسير الفيزيائي لنتائج التجارب العملية السابقة

لم يتمكن العلماء من ايجاد تفسير لنتائج التجارب العملية للظاهرة الكهروضوئية إلا بعد ان قام العالم ألبرت اينشتاين بتطبيق نظرية الكم Quantum theory على الاشعاع الكهرومغناطيسي في عام ١٩٠٥.

طبقا لنظرية الكم فإن الأشعة الكهرومغناطيسية التي تعاملنا معها في الفيزياء الكلاسيكية على إنها موجات تنتشر في الفراغ تم اعتبارها في نظرية الكم على إنها جسيمات تسمى فوتونات photons كل فوتون يحمل طاقة E تعتمد على تردده من خلال المعادلة التالية:

$$E = h \nu = h c / \lambda \quad (2.5)$$

حيث ان الثابت h هو ثابت بلانك Planck constant

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

من وجهة نظر ميكانيكا الكم فإن الشعاع الضوئي ذو التردد ν يحتوي على عدد من الفوتونات طاقة كل فوتون هي $h\nu$ يتعامل كل فوتون مع إلكترون مرتبط بسطح المعدن فإذا كانت طاقة الفوتون هذه اكبر من طاقة ربط الإلكترون بالمعدن فإنه يتحرر من سطح المعدن وباقى طاقة الفوتون يكتسبها الإلكترون المتحرر على شكل طاقة حركة تمكنه من الوصول إلى الكاثود.

وبناء على ما سبق يمكن تفسير نتائج التجارب العملية للظاهرة الكهروضوئية على النحو التالي:

النتيجة (٤)

توضح المعادلة (٢,٤) مفهوم الطاقة المتبادلة بين الفوتون والإلكترون الذي يعطي التيار الكهروضوئي.

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + h\nu_0 \quad (2.4)$$


حيث يمثل الطرف الأيسر من المعادلة الطاقة التي يحملها الفوتون الساقط على سطح المعدن والتي يكتسبها الإلكترون المرتبط بسطح المعدن. يتحرر الإلكترون الأقل ارتباطاً بسطح المعدن مكتسباً طاقة حركية kinetic energy. أما الطرف الأيمن من المعادلة يعطي طاقة الإلكترون التي يكتسبها من الفوتون على صورة طاقة حركية وطاقة ربط. ويعبر عن طاقة ربط الإلكترون بسطح المعدن بالرمز ϕ والذي يعرف على انه دالة الشغل work function والتي تعرف على إنها الشغل اللازم لتحرير الإلكترون الأقل ارتباطاً بسطح المعدن. وتعتمد دالة الشغل على نوع المعدن.

$$\phi = h\nu_0 \quad (2.6)$$

ويمكن كتابة المعادلة (٤) على الصورة التالية:

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \phi \quad (2.7)$$

ولهذا فإن تردد الأشعة الكهرومغناطيسية للحصول على تيار كهربائي يجب أن يكون طاقته أكبر من دالة الشغل.



النتيجة (٣)

أعظم طاقة حركة يكتسبها الإلكترون عند تردد معين للأشعة الكهرومغناطيسية تعتمد فقط على التردد لان التردد يحدد قيمة طاقة الفوتون من خلال $E = h \nu$

النتيجة (٢)

شدة الأشعة الكهرومغناطيسية من وجه نظر ميكانيكا الكم تكون عبارة عن طاقة

الفوتون مضروبة في عدد الفوتونات الساقطة على المعدن لكل وحدة زمن لكل وحدة مساحة. ولهذا يمكن تفسير النتيجة الثانية على انه بزيادة شدة الأشعة الكهرومغناطيسية يزداد عدد الفوتونات وبالتالي يزداد عدد الالكترونات المتحررة ويزداد التيار الكهروضوئي.

النتيجة (١)

التيار الكهروضوئي يمر في الدائرة الكهربية بمجرد سقوط الفوتون على الإلكترون بدون أي تأخير زمني لان إذا كانت طاقة الفوتون الواحد كافية لتحرير الإلكترون يتحرر مباشرة لينقل التيار ولا يحدث في أي حال من الأحوال أن تتراكم الفوتونات على الإلكترون لتكسبه الطاقة على شكل تراكمي حيث أن طاقة الربط لا تعتمد على شدة الأشعة إنما تعتمد على تردددها.

احتساب طاقة الشعاع الكهرومغناطيسي بوحدة الإلكترون فولت eV

يمكن التعبير عن الشعاع الكهرومغناطيسي بوحدة التردد (الهرتز Hz) أو بوحدة الطول الموجي (Å) ومن خلال المعادلة (٤) و (٥) يمكن أيضا التعبير بوحدة الطاقة الإلكترون فولت.

وحدة الإلكترون فولت هي وحدة طاقة وتعرف على إنها مقدار الطاقة التي يكتسبها الإلكترون عندما يعجل في فرق جهد قدره ١ فولت.

$$E = qV = e V = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C } 1 \text{ volt} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ eV}$$

$$1 \text{ joule} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ eV}$$


يمكن إيجاد علاقة مباشرة بين طاقة الفوتون بوحدة الإلكترون فولت والطول الموجي بوحدة الانجستروم فعلى سبيل المثال إذا كان شعاع كهرومغناطيسي طوله الموجي ١ انجستروم يحتوي على فوتون طاقته بوحدة الإلكترون فولت هي:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^8 \text{ m/s})}{(1.0 \text{ \AA})(10^{-10} \text{ m/\AA})(1.602 \times 10^{-19} \text{ J/eV})}$$

$$= 1.240 \times 10^4 \text{ eV} = 12.40 \text{ keV}$$

وبصورة عامة طاقة الفوتون بوحدة الإلكترون فولت يمكن تحويلها إلى طول موجي بوحدة الانجستروم من خلال المعادلة التالية:

$$E = \frac{1.240 \times 10^4 \text{ eV}\cdot\text{\AA}}{\lambda} = \frac{0.01240 \text{ MeV}\cdot\text{\AA}}{\lambda}$$



مخطط للطيف الكهرومغناطيسي بوحدة الإلكترون فولت.


نلاحظ أن أقل طاقة يمتلكها الفوتون هي طاقة موجة الراديو وأكبر طاقة يمتلكها الفوتون هي في موجة أشعة جاما..

The Compton Effect

ظاهرة كومبتون

في الظاهرة الكهروضوئية يعطي الفوتون كامل طاقته للإلكترون المرتبط بسطح المادة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يعطي الفوتون جزء من طاقته إلى إلكترون حر وهذا النوع من التفاعل بين الشعاع الكهرومغناطيسي والإلكترون يسمى بتشتت الفوتونات بواسطة الإلكترون Scattering وتعرف هذه الظاهرة في علم ميكانيكا الكم بظاهرة كومبتون Compton Effect.

تعتمد ظاهرة كومبتون في تفسيرها على ان الضوء يتكون من فوتونات لها طاقة وكمية حركة ولا يمكن تفسيرها على اعتبار النموذج الموجي للضوء. تم التحقق من هذه الظاهرة عملياً في عام ١٩٢٣ في جامعة سانت لويس من قبل العالم آرثر كومبتون وذلك بإسقاط أشعة اكس على لوح من الكربون كما هو موضح في الشكل التالي:



وكانت نتائج التجربة على النحو التالي:

وجد ان الاشعة المشتتة لها طولين موجيين هما λ و λ' بالرغم من أن الشعاع الساقط يحتوي على طول موجي وحيد λ .

تم قياس الفرق في الطول الموجي للفوتونات المشتتة ووجد إنها تعتمد على زاوية تشتت الأشعة المشتتة حيث ان هذا الفرق يكون أكبر ما يمكن عندما تكون الزاوية ١٨٠ درجة.

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$$

إذا ما تم الاعتماد على النموذج الموجي للأشعة الكهرومغناطيسية لا يمكن إيجاد تفسير للزيادة في الطول الموجي للأشعة المشتتة من لوح الكربون لأن حسب النظرية الكلاسيكية فإن الكثرونات ذرات الكربون سوف تتذبذب بنفس تردد الفوتونات الساقطة ولا يحدث في هذه الحالة أية زيادة تطراً على الطول الموجي للفوتونات المشتتة بل أنها سوف تحتوي على نفس الطول الموجي. ولتفسير هذه الظاهرة اعتمد كمبتون على أن الأشعة الساقطة تتكون من سيل من الفوتونات لها طاقة وكمية حركة

$$\text{Energy of the photon } E = h\nu = hc/\lambda$$


$$\text{Momentum of the photon } P = h/\lambda$$

وعندما تتصادم بعض من هذه الفوتونات مع الإلكترونات في لوح الكربون فإنها تفقد جزء من طاقتها كما أن الجزء الآخر من الفوتونات يصطدم بالإلكترونات تصادم مرناً فلا تفقد طاقتها وهذا ما يؤدي إلى الحصول على طولين موجيين..


وحيث أن الفوتونات المشتتة تفقد جزء من طاقتها فإن ذلك يؤدي إلى أن الطول الموجي للفوتونات المشتتة أكبر من الطول الموجي للفوتونات الساقطة أي أن

$$\lambda' > \lambda$$

ولتفسير هذه النتيجة وإيجاد علاقة رياضية تربط بين التغير في الطول وزاوية التشتت فإننا نعتبر التصادم بين فوتون وإلكترون حر على النحو التالي:




بتطبيق قانون الحفظ على الطاقة والحفاظ على كمية الحركة نجد أن



وبإعادة ترتيب متجهات كمية الحركة للفوتون والإلكترون الحر بعد التصادم كما في الشكل

التالي:



بتطبيق قاعدة فيثاغورس على المثلث القائم الزاوية نجد أن

$$p^2 = \left(\frac{h\nu' \sin \theta}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c} - \frac{h\nu' \cos \theta}{c}\right)^2$$

بالضرب في مربع السرعة

$$p^2 c^2 = (h\nu')^2 + (h\nu)^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta$$

من قانون الحفظ على الطاقة حيث أن الطاقة قبل التصادم تساوي الطاقة بعد التصادم

$$E_0 = m_0 c^2$$

$$h\nu + E_0 = h\nu' + E$$

بعد التصادم قبل التصادم

$$h\nu - h\nu' = E - E_0$$

بتربيع طرفي المعادلة نحصل على

بالتعويض عن $2E$ بالمعادلة

$$(h\nu')^2 + (h\nu)^2 - 2h^2 \nu \nu' = 2E_0^2 + p^2 c^2 - 2EE_0$$

بالتعويض في المعادلة (١) من المعادلة (٢) نحصل على

$$p^2 c^2 = 2E_o^2 + p^2 c^2 - 2EE_o + 2h^2 \nu \nu' - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta$$

$$2h^2 \nu \nu' (1 - \cos \theta) + 2E_o^2 - 2EE_o = 0$$

$$h^2 \nu \nu' (1 - \cos \theta) = E_o (E - E_o)$$

هذه هي المعادلة الرياضية لظاهرة كمبتون والتي توضح العلاقة بين التغير في الطول الموجي للفوتونات المتشتتة $\Delta \lambda$ وزاوية التشتت θ . تعتمد قيمة $\Delta \lambda$ على كتلة m_o السكون للجسم (الإلكترون) وثابت بلانك وسرعة الضوء وزاوية التشتت θ .

المقدار $\frac{h}{m_o c}$ يسمى بالطول الموجي لكمبتون compton wavelength حيث ان لهذا المقدار وحدة طول. وبالتعويض عن قيمة الثوابت نجد أن:


$$h/m_o c = 0.024 \text{ \AA}$$

ولهذا فإن عند التعويض في معادلة كمبتون عن قيم مختلفة للزاوية θ

$\theta = 0$	$\Delta \lambda = 0$
$\theta = 90$	$\Delta \lambda = 0.024 \text{ \AA}$
$\theta = 180$	$\Delta \lambda = 0.048 \text{ \AA}$

لاحظ أن في حالة الزاوية 180° يكون التغير في الطول الموجي أكبر ما يمكن وعندها يكون

التصادم بين الفوتون والإلكترون هو تصادم مباشر head-on-collision.



- ملاحظات

يمكن فقط قياس التغير في الطول الموجي عندما يكون الفوتون ذو طول موجي صغير أي في مدى أشعة اكس والأشعة الأصغر منه. فمثلاً إذا كان الطول الموجي للفوتون ٤٠٠٠ انجستروم (الضوء المرئي) فإن الزيادة في الطول الموجي نتيجة لظاهرة كمبتون

$$\text{for } \lambda = 4000 \text{ \AA} \quad \Delta\lambda/\lambda = 0.006\%$$

وهذا التغير صغير جداً ولا يمكن قياسه أما إذا كان الطول الموجي للفوتون الساقط ١ انجستروم (أشعة اكس) فإن الزيادة في الطول الموجي نتيجة لظاهرة كمبتون

$$\text{for } \lambda = 1 \text{ \AA} \quad \Delta\lambda/\lambda = 0.3\%$$

وبهذا فإننا نلاحظ ظاهرة كمبتون عند الأطوال الموجية الصغيرة

- مثال


إذا كان طول موجة أشعة اكس الساقطة على لوح الكربون تساوي ٠,٠١ انجستروم فما طول موجة أشعة اكس التي تشتتت عند زاوية ٣٠ درجة.
بالتعويض في معادلة كمبتون

$$\lambda' = 0.013 \text{ \AA}$$

امتصاص الفوتونات The Photon Absorption

Photon-Electron Interaction

في الظواهر السابقة مثل الظاهرة الكهروضوئية وظاهرة إنتاج أشعة اكس وظاهرة كمبتون وظاهرة إنتاج وتلاشي الجسيمات أن الفوتونات تتحول إلى جسيمات كالإلكترونات أو العكس وهذه الظواهر جميعها تم تفسيرها على أساس اعتبار الشعاع الكهرومغناطيسي كمكم في شكل جسيمات تسمى الفوتونات لها طاقة وكمية حركة والشكل التالي يوضح الظواهر الخمسة السابقة...



- (١) الظاهرة الكهروضوئية: اصطدام فوتون بالكترون مرتبط بسطح المعدن فتنقل كامل طاقة الفوتون إلى الإلكترون المرتبط فيتححرر من سطح المعدن ويكتسب طاقة حركة.
- (٢) ظاهرة كمبتون: اصطدام فوتون بالكترون حر فينتج فوتون بطاقة اقل (طول موجي اكبر) وينطلق الفوتون في اتجاه مختلف (يتشتت) أما الإلكترون فيكتسب طاقة حركة.
- (٣) ظاهرة إنتاج الجسيمات: يتلاشى فوتون ذو طاقة عالية بالقرب من نواة ذرة ثقيلة (عدد ذري كبير) وينتج عن ذلك إنتاج جسيمان هما الإلكترون والبوزترون (إلكترون موجب) لهما طاقة حركة إذا كانت طاقة الفوتون اكبر من طاقة تكوين الجسيمان.
- (٤) ظاهرة إنتاج أشعة اكس: انحراف إلكترون معجل بالقرب من نواة عنصر ثقيل يؤدي إلى تقليل طاقته وتنطلق هذه الطاقة في صورة فوتون أشعة اكس وينحرف الإلكترون عن مساره.

(٥) ظاهرة تلاشي الجسيمات: يمكن لإلكترون اقتناص البوزترون ليندمجا وتتححر طاقة يحملها فوتون.


الوصف الكمي للمادة: نموذج " بوهر " للذرة

في مطلع القرن العشرين، تطلب برهان وجود المادة نموذجاً للذرة مع سحابة من الإلكترونات السالبة المنتشرة والتي تحيط بنواة صغيرة عالية الكثافة وموجبة الشحنة ولأجل هذه الخصائص تم اقتراح نموذج تدور فيه الإلكترونات حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس. ومع ذلك، كان من المعروف أيضاً أن الذرة في هذا النموذج ستكون غير مستقرة.

وفقاً للنظرية الكلاسيكية (التقليدية) في هذا الشأن التي ترى أن الإلكترونات الدوارة تخضع لتسارع الجاذبية وبالتالي فإنها تطلق الإشعاع الكهرومغناطيسي، كما أن فقدان الطاقة يؤدي إلى التوجه في دوامة نحو النواة عندها يحدث الاصطدام بها في جزء من الثانية.

الحيرة الثانية المتعلقة بها كانت في الإشعاعات الطيفية للذرات فعندما يسخن الغاز تطلق الضوء ولكن في ترددات منفصلة مثلاً الضوء المرئي المطلق من الهيدروجين يحتوي على أربعة ألون مختلفة كما هو موضح في الصورة أدناه بينما في المقابل الضوء الأبيض يحتوي على إشعاعات مستمرة بلا انقطاع عبر نطاق الترددات المرئية.

الصيغة الرياضية التي تصف طيف انبعاث الهيدروجين .



نموذج بور للذرة، يبين إلكترون من مدار واحد، ينتقل من مدار إلى آخر عن طريق انبعاث فوتون.

في عام ١٩١٣، قدّم نيلز بور نموذجاً جديداً للذرة يشمل مدارات الإلكترون المكممة، ولا تزال الإلكترونات في نموذج بوهر تدور حول النواة بقدر الكواكب التي تدور حول الشمس ويُسمح لها بالتواجد في مدارات معينة فقط وليس في أي مدار أو على أي مسافة. إن الذرة عندما تبعث أو تمتص الطاقة، فإن الإلكترونات لا تتحرك في مسار مستمر من مدار واحد حول النواة إلى آخر كما هو متوقع بشكل تقليدي، بدلاً من ذلك فإن الإلكترون يقفز من مدار إلى آخر على الفور ويُطلق الضوء المنبعث على هيئة فوتون، يتم تحديد الطاقات الممكنة من الفوتونات التي تخرج من كل عنصر على حسب الاختلافات في الطاقة بين المدارات وبالتالي فإن طيف الانبعاث لكل عنصر من شأنه أن يحتوي على عدد من الخطوط.



نيلز بور

كان نموذج بور قادرًا على ربط الخطوط الطيفية المرصودة في انبعاثات الطيف للهيدروجين بالكميات الثابتة المعروفة مسبقاً، بالرغم من أن هذا النموذج لم يوضح لماذا يجب أن تكون المدارات مكممة بتلك الطريقة وكان نموذج بور غير قادر أيضاً على وضع توقعات دقيقة لذرات الإلكترونات المتعددة أو لشرح لماذا بعض الخطوط الطيفية أكثر سطوعاً من غيرها ومع مرور الوقت تم إدراك الطريقة التي تسلكها الإلكترونات بأنها مختلفة بشكل يلفت النظر عن ذرة بور وكذلك عن ما نشاهده في العالم من تجاربنا اليومية وهذا ما تم مناقشته في الأسفل عن الكم الحديث للنموذج الميكانيكي في الذرة.

ازدواجية الموجة-الجسيم

عام ١٩٢٣ اقترح لويس دي بروي فكرة أنه كما أن للضوء خصائص كلاً من الموجات والجسيمات معاً فإن للمادة أيضاً خصائص الموجات ، الطول الموجي λ المتعلق بجسيم ما مرتبط بكمية حركته p من خلال ثابت بلانك h : تنطبق العلاقة السابقة (والتي سُميت بفرضية دي بروي) على كل أنواع المادة ولذلك فإن كل المواد تمتلك خصائص كلاً من الجسيمات والموجات، بعد ٣ سنوات تم الكشف عن طبيعة الإلكترون المشابهة للموجات عن طريق إظهار أن شعاع من الإلكترونات يمكنه الحيود (الإنحراف) تماماً مثل شعاع الضوء.

في جامعة أبردين قام جورج ثومسون بتمرير شعاع من الإلكترونات عبر طبقة معدنية رقيقة ولاحظ أنماط الحيود المتوقعة وفي مختبرات بل قام كلاً من دافيسون وجيرمر بتمرير شعاع من الإلكترونات عبر شبكات كريستالية، تم لاحقاً الكشف عن ظواهر مشابهة في الذرات وحتى في الجزيئات الصغيرة حيث تمتلك خصائص الموجات أيضاً، مُنح دي بروي جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٢٩ عن فرضيته، كما تقاسم ثومسون ودافيسون جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٣٧ لتجاربه المتعلقة بهذا المجال.


مبدأ ازدواجية الموجة-الجسيم يُظهر أن المفهوم الكلاسيكي لنظرية "الجسيمات" و"الموجات" لا يمكنه وصف سلوك المواد (سواء كانت جسيمات أو فوتونات) على المستوى الكمي بشكل كامل ودقيق ولذا فإن ازدواجية الموجة-الجسيم هو مثال على مبدأ التكامل *principle of complementarity* في فيزياء الكم سوف يتم مناقشة مبدأ ازدواجية الموجة-الجسيم من خلال تجربة شقي يونغ *Double-slit experiment* . لا يمكن للمفهوم الكلاسيكي للجسيمات أو للموجات أن يصف مفهوم موجة-الجسيمات الازدواجية بشكل متكامل لسلوك كائنات الكم بكلا الحالتين: كفوتون أو كمادة، في الواقع اقترح عالم الفيزياء أي إس إيدينغتون في عام ١٩٢٧ أنه " بإمكاننا أن نصف هذا الكيان كموجة أو كجسيم وربما كحل وسط ينبغي أن نطلق عليه ". *Wavicle* " (هذا المصطلح اشتهر لاحقاً عن طريق الرياضي بانيش هوفمان) ، موجة الجسيمات الازدواجية هي مثال على مبدأ ازدواجية الجسيمات في الكم الفيزيائي ومثال فريد لموجة الجسيمات الازدواجية وهي تجربة الشقين، ستتم مناقشتها

لاحقا فمعالجة الدكتور بروغلي لأحداث الكم هي النقطة البدء لشوردينغر عندما أنشئ معادلة الموجة لشرح أحداث الكم النظرية.

الثغرة الكوانتية (التكميم):


في أوائل القرن التاسع عشر، وخلال تفسير إشعاع الجسم الأسود، اكتشف ماكس بلانك أنّ الطاقة وعلى المستوى دون الذري من الممكن أن تتحرّر أو تُمتصّ بكميات منفصلة غير قابلة للتجزئة وليس بشكل مستمر تسمى "كوانتا" (مضاعفات ثابت معين)، مما يعني أنّ الإلكترونات لها مدارات ثابتة حول الذرة بما أنّ طاقتها تأتي بشكل منفصل، أي أنه عندما يُثار الإلكترون أو العكس، سوف يمتص أو يُحرّر كمية محددة من الطاقة "كوانتا" مما يعني أنه سوف يقفز إلى مدار أبعد أو أقرب من دون أن يتواجد بين هذه المدارات.

عندما يكتسب الإلكترون الطاقة فإنه يقفز لمدار أبعد، وعندما يخسر الطاقة فإنه يقفز لمدار أقرب، وتكون الطاقة اللازمة حتى يقفز الإلكترون لمدار أبعد أو أقرب مساوية لفرق الطاقة بين المدارين.



تظهر في الصورة ذرة الهيدروجين، حيث تُعطى كمية الطاقة لكل مدار بالعلاقة:

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ [electronvolts]}$$



عندما يقفز الإلكترون من المدار الثاني إلى الأول، فعندها سوف يُصدر فوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بين المدارين، وهناك علاقة تربط بين طاقة الفوتون وتردده بعد ضربه بثابت:


$$E = hv = h \frac{c}{\lambda}$$

h ثابت بلانك
 c سرعة الضوء
 λ الطول الموجي

ويظهر من المعادلة أنّ الطاقة الكبيرة سوف ترتبط مع طول موجي أقل، وعلى هذا الأساس يمكننا معرفة أنّ الأزرق يمتلك طاقة أكبر من الأحمر! وقد لوحظ سابقاً من تحليل الضوء من خلال المنشور أنّ الألوان المختلفة تعطي حرارات مختلفة، لذلك سوف يعتمد لون "تردد" الفوتون الصادر على الطاقة التي يمتلكها، والتي تعتمد على الفروق الطاقية بين مدارات الذرة ولكل ذرة مختلفة "مادة مختلفة" سوف تكون هنالك مدارات طاقة مختلفة، مما يعني أنّه بتحليل الضوء الصادر عن النجوم البعيدة قد نعرف الكثير عن المادة المشكّلة لهذه النجوم وحرارتها! فمثلاً عند تحليل طيف الإصدار الذري لضوء الشمس يظهر طيفا


ذرتي الهيدروجين والهيليوم بوضوح، وبهذا تم الاستنتاج بأن الشمس تتكون بصفة أساسية من الهيدروجين والهيليوم .

هل الإلكترون موجة أم جسيم؟



حقوق الصورة: Johannes Kalliauer/Wikimedia, CC-BY-SA 3.0

تمتلك تجربة يونغ *young* ، والتي تُمرر فيها حزمة متوازية من الضوء أحادي طول الموجة من خلال زوج متوازٍ وضيق من الشقوق، نظيراً إلكترونياً لها. في تجربة يونغ الاصلية، تختلف شدة الضوء بالاتجاه بعد عبورها من الشقين. تتذبذب الشدة بسبب تداخل موجات الضوء الخارجة من الشقين ونتيجة اعتماد معدل التذبذب على الطول الموجي للضوء وتباعد الشقين. ينتج التذبذب نمطاً من الأهداب المكونة من خطوط مضيئة ومظلمة متناوبة تتغير تبعاً لنمط حيود الضوء المار من كل شق. إذا حُجب أحد الشقين، ستتلاشى أهداب التداخل وسيُرى فقط نمط الحيود الموضح كخط منكسر في الشكل التالي.



الشكل A: يُنتج الضوء أحادي طول الموجة الساقط على زوج من الشقوق أهداف تداخل (خطوط مضيئة ومظلمة متناوبة) على لوحة عرض مقابلة. الشكل B: يظهر الاختلاف في شدة الضوء على الشاشة عندما يُفتح كلا الشقين. لا ينتج نمط تداخل باستخدام شق واحد ويظهر اختلاف الشدة كما هو موضح في الخط المنكسر. وكما في الشكل B ، يعطي الخط البياني نفسه الاختلاف في شدة الإلكترونات في تجربة الإلكترونات النظرية لترجمة الضوء. حقوق الصورة، Encyclopædia Britannica, Inc.

يمكن تكرار تجربة يونغ باستخدام إلكترونات لها نفس الزخم. تُستبدل الشاشة في التجربة الضوئية بشبكة مترابطة من كواشف الإلكترونات. هناك عدة أجهزة لكشف الإلكترونات، لكن أكثرها شيوعاً هي أجهزة الكشف الومضية. عندما يمر الإلكترون عبر مادة وماضة، مثل يوديد الصوديوم، فإن المادة تُنتج ومضة ضوئية مما يعطي نبضة من فرق الجهد الكهربائي يمكن تضخيمها وتسجيلها. يماثل نمط الإلكترونات المسجل من قبل كل كاشف النمط المتوقع للأمواج ذات الطول الموجي المعطى بمعادلة دي بروي de Broglie. وبالتالي تقدم هذه التجربة دليلاً قاطعاً على السلوك الموجي للإلكترونات. إذا كررت التجربة باستخدام منبع إلكترونات ضعيف بحيث يعبر إلكترون واحد فقط من الشقين، سيقوم كاشف واحد بتسجيل وصول الإلكترون إليه. يُعبر هذا عن خاصية

التموضع الجيد للجسيمات. في كل مرة تُكرر فيها التجربة، يمر إلكترون واحد عبر الشقين ليتم كشفه. يظهر الرسم البياني، الذي يظهر فيه موقع الكاشف على طول أحد المحاور وعدد الإلكترونات على المحور الآخر، تماماً كنمط التداخل المتذبذب الموضح في الشكل B. وبذلك تتناسب دالة الشدة في الشكل مع احتمال تحرك الإلكترون وفق اتجاه معين بعد عبوره للشقين. وبصرف النظر عن وحداتها، تُطابق الدالة تماماً Ψ^2 ، حيث Ψ هي حل معادلة شرودنجر التي لا تعتمد على الزمن الخاصة بهذه التجربة. إذا حُجب أحد الشقين، سيتلاشى نمط الأهداب وسيحل محله نمط الحيود الخاص بالشق المنفرد. وبالتالي، يلزم وجود كلا الشقين لإظهار نمط أهداب التداخل. مع ذلك، إذا كان الإلكترون جسيماً، فمن المنطقي الافتراض بأنه مر عبر أحد الشقين فقط. يمكن تعديل معدات التجربة للتأكد من الشق الذي عبره الإلكترون عن طريق تثبيت حلقة من الأسلاك الرفيعة حول كل شق. عندما يعبر الإلكترون من خلال إحدى الحلقتين، فإنه يولد إشارة كهربائية صغيرة تحدد الشق الذي مر عبره الإلكترون. مع ذلك، سيختفي نمط أهداب التداخل وسيعود نمط الحيود الخاص بالشق المنفرد للظهور مجدداً. بما أن كلا الشقين ضروري لظهور نمط التداخل وبما أنه من المستحيل معرفة أي شق سيعبر منه الإلكترون من دون تخريب ذلك النمط، فعلى المرء أن يستنتج مجبراً أن الإلكترون قد مر من كلا الشقين في نفس الوقت. للتلخيص، توضح التجربة الخصائص الموجية والجسيمية للإلكترون. تتنبأ الخاصية الموجية باحتمالية جهة مرور الإلكترون قبل أن يُكشف. وبالمقابل، يُوضح الكشف عن الإلكترون في مكان محدد الخاصية الجسيمية التي يتصف بها. وبالتالي، فإن جواب سؤال ما إذا كان الإلكترون موجة أم جسيماً هو أنه ليس أياً منهما. إنه جسم يبدي خصائص جسيمية وموجية تبعاً لنوع القياس المُجرى عليه. بعبارة أخرى، لا يمكن للمرء أن يتحدث عن الخصائص الجوهرية للإلكترون، بل يجب أن يأخذ بالحسبان خصائص الإلكترون وخصائص أجهزة القياس سوياً.

الفصل الثالث

The wave aspects of material particles

الخصائص الموجية للجسيمات المادية

علمنا مما سبق أن للأشعة الكهرومغناطيسية خاصية موجية وخاصية جسيمية وان العديد من الظواهر الفيزيائية للأشعة الكهرومغناطيسية لا يمكن تفسيرها إلا إذا اعتمدنا على الخاصية الجسيمية مثل ظاهرة الانعكاس والانكسار والظاهرة الكهروضوئية، كما ان هناك ظواهر فيزيائية مثل التداخل والحيود لا يمكن تفسيرها إلا بالاعتماد على الخاصية الموجية للضوء.

بتطبيق نظرية الكم على الشعاع الكهرومغناطيسي يمكن اعتبار الضوء مكون من فوتونات لها طاقة E وكمية حركة p .

$$\text{Energy of the photon} \quad E = h \nu$$

$$\text{Momentum of the photon} \quad p = h/\lambda$$

تظهر الخصائص الموجية في هاتين المعادلتين في الطرف الأيمن في λ و ν بينما تظهر الخواص الجسيمية في الطرف الأيسر من المعادلتين في E و p .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يمكن للجسيمات المادية كالإلكترون؟ أي هل الخاصية المزدوجة موجودة في الجسيمات؟


وللإجابة على هذا التساؤل سنتناول دراسة الجزء الثاني من الفيزياء الحديثة.....

الجسيمات تتصرف كالأموج:


هناك تجربة شهيرة في الفيزياء الكمية تسمى تجربة الشقّ المزدوج، والتي تكشف حقائق مُحيرة عن المادة، وهي أنّ الجسيمات تتصرف كجسيمات وأمواج في نفس الوقت! سوف نتخيل التجربة على مستوى أكبر في البداية.

تخيل أنك تقوم بقذف كرات التنس عبر جدار فيه فتحتين، وقد وُضِعَ خلف هذا الجدار جداراً آخر وعليه حسّاسات بحيث يستطيع تحسّس مكان اصطدام الكرات به، وسوف يكون واضحاً أنّك عندما ترمي هذه الكرات باتجاه الجدار، فإنّ البعض منها سوف يذهب من الفتحة


اليمينية أو اليسارية أو يصطدم بالمنتصف، وعندما تنتهي من ذلك وتطلع على النتائج، سوف تصطدم الكرات بالجدار الثاني في المكان المقابل للفتحتين فقط، كما في الصورة:




سوف نقوم الآن بتكرار نفس التجربة لكن على المستوى الأصغر بكثير! سوف نقوم برمي الإلكترونات باتجاه الجدار وتسجيل النتائج على الجدار الآخر، تبدو النتيجة واضحة، أليس كذلك؟ لا!



كما في الصورة، سوف تأخذ هذه الإلكترونات أماكن مختلفة وبنسب توزيع مختلفة، فهناك أماكن سيتواجد بها الكثير من الإلكترونات، وأماكن أخرى لن يتواجد بها. النمط الذي وجدناه يسمى نمط تداخل وهو متعلق تحديداً بالموجات.



تخيّل تداخل الموجتين في القسم الأعلى من الصورة، إنّ قمة الموجة سوف تصبح أكبر وكذلك قاعها، لأنّ الموجتين متشابهتين. والآن في الحالة الأخرى، حيث أنّ الموجة الثانية تعاكس الأولى، سوف تفني الموجتين بعضهما!
إذا تخيلنا أنّ الإلكترونات تتصرّف بشكل موجي أيضاً، وليس ككرات التنس، ماذا سيحدث؟



عندما تتجاوز هذه الموجات الشقين، سوف تنشئت حول هذه الثقوب مُشكّلةً جبهتين دائريتين من الموجات، هذه الموجات سوف تتفاعل مع بعضها وتشكّل أماكن ذروة (حيث توجد فيها أكبر كمية من الإلكترونات) وقاع (حيث لن تتواجد أية إلكترونات) وأماكن بين هذين الحدّين.

هذا النمط سوف يُظهر نفسه تماماً في حال قمنا بإرسال موجة باتجاه الجدار "ضوء مثلاً" ولذلك يبدو أنّ الموجة سوف تمثّل احتمالات تواجد الإلكترون بمكانٍ ما، ويبدو أنّ الإلكترون قد دخل من الشقين بنفس الوقت. قام شرودينغر بتطوير معادلة تفاضليّة

تصف تغير هذه الموجة مع الزمن، وبحل هذه المعادلة سوف نحصل على "دالة الموجة" التي ستسمح لنا بحساب احتمال وجود الإلكترون بمكان ما

تأثير المراقبة:

لأخذ فكرة أفضل سوف نقوم بمراقبة الشقين حتى نعرف من أي شق قد دخل الإلكترون. في الواقع عند مراقبة هذه الإلكترونات سوف تسلك سلوك كرات التنس مجدداً ولن يظهر نمط التداخل بل سوف يظهر نمط مثل الصورة الأولى، وسوف يدخل الإلكترون من أحد الشقين، وكذلك في حال قمنا بسد أحد الشقين. يبدو أن فعل المراقبة جعل دالة الموجة تنهار وجعل الإلكترون يسلك سلوك جسيم.

رأينا سابقاً أن الذرات والجزيئات في المستوى المايكروسكوبي لا تتصرف بشكل يمكن التنبؤ به حيث أن الإلكترون يتصرف مثل موجة عندما لا تتم مراقبته، ويمثل هذا الموجة احتمالات وجوده في مكان ما، ولكن عند مراقبته سوف يتصرف كجسيم والسؤال الذي قد يطرحه البعض هو: لماذا يتصرف الإلكترون بهذه الغرابة ولا تتصرف كرة التنس هكذا مثلاً؟


وبصيغة أخرى، لماذا لا تدخل كرة التنس من الشقين بنفس الوقت عندما لا تتم مراقبتها؟ لماذا لا تتصرف الأجسام الكبيرة مثل الصغيرة؟

في الواقع، تمتلك الأجسام الكبيرة خاصية موجية مثل الأجسام الصغيرة تماماً، ولكن الفرق هو أنها تمتلك طاقة أكبر وترتبط الطاقة الكبيرة للأمواج مع الترددات العالية والطول الموجي الصغير جداً، فسيكون لموجة كرة البيسبول طول موجي يساوي 33- متر 1.8

$$E=h.v = h/ \lambda$$

(تناسب طاقة الجسم عكسياً مع الطول الموجي وطردياً مع التردد)

ويمكن ملاحظة أن تفاعل الأمواج ذات الترددات العالية مع بعضها يختلف عن ذلك في الترددات المنخفضة نسبياً "مثل الإلكترون مثلاً"



فعندما تمرّ الموجة عالية التردد لن يظهر نمط التداخل كما في حالة الموجة منخفضة التردد وسوف تكون النتيجة مشابهة للسلوك الجسيمي، ولذلك لا تظهر الخاصية الموجية في حالة الأجسام الكبيرة، بل تظهر في الصغيرة فقط. ولنعد إلى حالة الإلكترون. سوف نقوم بتجربة ذهنية، كما في الصورة، سوف نضع جسماً خلف كل فتحة.

نقوم بقذف الإلكترون باتجاه الحائط، ونراقب ذلك، سوف يسلك الإلكترون سلوك الجسيم، وسوف يدخل من إحدى الفتحتين ويقوم بصدم أحد الجسمين وإيقاعه أرضاً.

لكن ماذا لو قذفنا الإلكترون ولم نراقب النتيجة؟

في الواقع عندها سوف تدخل موجة الاحتمالات من كلا الفتحتين وسوف يصبح حدث صدم الإلكترون للجسمين أيضاً تابعاً لموجة الاحتمالات، ومهما انتظرنا قبل أن نراقب النتيجة فلن يكون للجسيمين أي وضع محدد، وتبعاً للرياضيات التي تشرح الدالة الموجية، فإنّ أيّاً من الحالتين هو ليس أكيداً وفقط عندما نقوم بالمشاهدة، سوف نرى النتيجة وسوف يكون أحد الجسمين واقعاً بينما الآخر واقفاً. وفي الواقع الأمر ليس أننا نحن فقط لا نعرف النتيجة قبل أن ننظر، بل يبدو أنّ الكون نفسه لا يعرف أيّ جسم قد ظل واقفاً وأيّ جسم قد وقع حتى نقوم نحن بالمراقبة.

تفسير الطبيعة الموجية للجسيمات

نفترض العلاقة بين احتمالية مشاهدة الجسيم ومربع سعة موجته يماثل تماماً العلاقة بين احتمالية مشاهدة الفوتون ومربع سعته γE

فإذا رمزنا لسعة موجة الجسيم بالرمز ψ ونسميها الدالة الموجية wave function فإن الدالة الموجية ψ هي كمية فيزيائية مربعها ψ^2 يتناسب طردياً مع احتمالية رصد الجسيم المادي عند نقطة معينة في الفراغ في وحدة الزمن..

وعلى هذا فإن الدالة الموجية للجسيم تماثل المجال الكهربائي للفوتون, ومثلما تكون E دالة تعتمد على كلاً من الزمان والمكان فإن ψ أيضاً دالة في الزمان والمكان. وحيث انه من غير الممكن تحديد موقع أي فوتون عند لحظة معينة من الزمن بدقة متناهية ولكن من الممكن فقط تحديد الاحتمالية γE لمشاهدة الفوتون في وحدة الزمن, وبالمثل من غير الممكن تحديد موقع أي جسيم مادي عند أي لحظة من الزمن بدقة متناهية ولكن من الممكن تحديد احتمالية وجوده عند موقع في الفراغ في لحظة معينة وعلى هذا الأساس فإن الدالة الموجية ψ للجسيم تعبر عن توزيع احتمالية تواجد المادي..

• فرضية دي برولي (De Broglie Hypothesis)

إن موجة دي برولي المرافقة للجسيمات المادية (de Broglie matter wave)

The waves can be described using
the language of *quantum* particles (photons).
Can particles behave as waves?



(السلوك الموجي) لا يقتصر على الفوتونات (يقول دوبري) بل يمتد على كافة الجسيمات المادية (الكترونات، بروتونات، نيوترونات،.....).

وسنحاول استنتاج العلاقة التي تربط طول الموجة مع كمية الحركة (العلاقة (3)) كما افترضها دوبري وذلك كما يلي:

• من فرضية بور: كمية الحركة الزاوية المدارية للإلكترون حول النواة تساوي عددا صحيحا من ثابت بلانك أي:


$$L = r \cdot p = n\hbar = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow 2\pi r = \frac{nh}{p} \quad (1-3)$$

من شرط بور - سمر فيلد: مسار الإلكترون حول النواة يكون مستقرا إذا كان يساوي عددا صحيحا من طول الموجة (الشكل 1) أي:

$$2\pi r = n\lambda \quad (2)$$

من العلاقة 1 و 2 نجد:

$$\lambda = h/p \quad (3)$$



الشكل (3) مسار الإلكترون يساوي عددا صحيحا من ال طول الموجي

والنظرية النسبية لاينشتاين قدمت جوابا مقنعا لعلاقة دي برولي من خلال علاقة التكافؤ بين الكتلة والطاقة ، فالكتلة التي تمثل الصفة المادية هي شكل من أشكال الطاقة ومعلوم أن الطاقة ترتبط بالتردد والطول الموجي التي سبق عرضها أعلاه . والعلاقة الأخيرة لموجة دوبري تبين أن أي جسم يتحرك يمكن اعتباره موجة !! بما فيما ذلك الأجسام الضخمة !! ولكن الأمثلة التالية توضح أي نوع من الأجسام تحمل المعنى الفيزيائي للأطوال الموجية المرافقة للأجسام .

• تمارين:

- ١- ما هو طول موجة دوبري لإلكترون طاقته 50 إلكترون فولت؟
 - ٢- ما هو طول موجة دوبري لكرة تنس كتلتها 70 جرام وسرعتها 25 م\ثا؟
- لاحظ أن الطول الموجي الناتج صغير جدا ولا يحمل معنى فيزيائي وخارج نطاق الاكتشاف التجريبي لان الأجسام الكبيرة لا تظهر طبيعتها الموجية للعيان ولا يحصل لها تداخل بناء وهدام .
- ٣- احسب طول موجة دوبري لجسيم كمية حركته (اندفاعه) 1 كيلو إلكترون فولت \ سرعة الضوء؟
 - ٤- احسب طول موجة كرة السلة ذات الكتلة 0.2kg وسرعتها 10m/s.
- ما هو تعليقك على الجواب؟
- ٥- ما هو طول موجة الإلكترون في ذرة الهيدروجين؟
- هذا الطول الموجي يساوي تقريبا قطر ذرة الهيدروجين ومن خلاله يمكننا تكوين تصور مبدئي لحجم الذرة , أي أن الخواص الموجية للإلكترون تعطينا أبعاد الذرة وهذه ميزة ممتازة لان الإلكترون يظهر كغيمة ضمن حجم يحدد أبعاد الذرة.
- ٦- أحسب طول موجة النيوترون علما أن طاقته الحركية لحظة تحرره من النواة تساوي 10Mev وهذا الطول الموجي يتوافق مع أبعاد النواة والتي تكون من مرتبة الفيرمي، لاحظ بالمقارنة بين أبعاد الذرة والنواة نجد أن أبعاد الذرة اكبر من أبعاد النواة بمليون مرة ، وهو دليل على الكثافة العالية للمادة النووية (1 سم³ مادة نووية تساوي تقريبا كتلته مقدارها 120 مليون طن) .
 - ٧- أحسب طول موجة الكوارك الذي يمتلك طاقة حركية مقدارها 2000Me ..

تطور ميكانيكا الكم الحديثة

ميكانيكا الكم نظرية فيزيائية أساسية، جاءت كتعميم وتصحيح لنظريات نيوتن الكلاسيكية في الميكانيكا. وخاصة على المستوى الذري ودون الذري. تسميتها بميكانيكا الكم يعود إلى أهميتها الكم في بنائها (وهو مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر كمية يمكن تقسيم الأشياء إليها، ويستخدم في الإشارة إلى كميات الطاقة المحددة التي تنبعث بشكل متقطع، وليس بشكل مستمر).

قام إروين شرودنغر في عام ١٩٢٥ بناءً على فرضية دي برولي بتطوير المعادلة التي تصف سلوك الموجة الميكانيكية الكمية وتعد المعادلة التي يطلق عليها معادلة شرودنجر نسبة للعالم الذي اكتشفه، أساسية لميكانيكا الكم، فهي تعرف الحالات المستقرة للنظام الكمي وتصف كيف تتغير الحالة الكمية للنظام الفيزيائي عبر الزمن. وكان سكرودنغ قادرا على حساب مستويات الطاقة في الهيدروجين وذلك بمعالجة إلكترون ذرة الهيدروجين كموجة كلاسيكي متحركا داخل جدارا من الجهد الكهربائي بفعل البروتين. وتعيد هذه العملية إنتاج مستويات طاقة نموذج بوهر. كان ورنر هايزنبرغ في زمن سابق يحاول إيجاد تفسير للإختلافات الموجودة في قوة انبعاث طيف الهيدروجين بسلسلة من التماثلات الرياضية إذ كتب عن قوة التماثلات الميكانيكية الكمية، بعد ذلك بوقت قصير أدرك زميله ماكس بورن أن طريقة هايزنبرغ في حساب احتمالات انتقال مستويات الطاقة المختلفة يمكن أن يفسر أفضل باستخدام مفهوم المصفوفات. في مايو ١٩٢٦، أثبت شارودنغر أن نظريتي هايزنبرغ لميكانيكا المصفوفات وميكانيكا الموجة في التنبؤ بخصائص وسلوكيات الإلكترون متطابقتان رياضياً، لكن مع ذلك لم يتفق شارودنغر وهايزنبرغ على التفسير المشترك للنظرية فهمايزنبرغ مثلاً لا يرى أي مشكلة في فرضية الانتقال الفوري للإلكترونات بين المدارات في الذرة، بينما كان شارودنغر يأمل بأن تتجنب

النظرية القائمة على خصائص الموجة الطولية ما أسماه (القفزات الكمية حول النواة) والتي أقتبست من قبل فلهم فيين

• تأويل كوبنهاغن

تفسير كوبنهاغن هو من أحد أهم التفسيرات شيوعاً في علم ميكانيكا الكم، ويفترض التفسير أن ميكانيك الكم لا تسفر عن وصف الظواهر الطبيعية بشكل موضوعي ولكن تتعامل فقط مع احتمالات الرصد والقياس، ولعل أغرب فروض هذا التفسير أن عملية القياس تؤثر على سلوك النظام الكمي بمعنى أن عملية القياس تسبب ما يعرف بانهيار الدالة الموجية، وقد وضعت المفاهيم الأساسية لهذا التفسير من قبل نيلز بور وفيرنر هايزنبرج وماكس بورن وغيرهم في السنوات ١٩٢٤-١٩٢٨ م.

المبادئ الأساسية لتفسير كوبنهاغن هي:


١. يوصف النظام كلياً بواسطة دالة الموجة Ψ (هايزنبرج)
٢. كيفية تغير Ψ عبر الزمن معطاة بواسطة معادلة شرودنجر.
٣. وصف الطبيعة هو قائم على الاحتمالات أساساً، فاحتمالية حدث ما - على سبيل المثال أين سيظهر الجسيم على الشاشة في تجربة الشقين مرتبطة بمربع القيمة المطلقة للسعة التي في معادلة الموجة (مبدأ الشك)
٤. إنه من غير الممكن معرفة قيم كل الخصائص للنظام في نفس الوقت هذه الخصائص الغير معروفة بدقة يجب أن توصف بالاحتمالات. مبدأ الشك لهايزنبرج
٥. المادة كالطاقة تظهر إزدواجية الموجة - الجسيم فيمكن لتجربة ما أن تستعرض الخصائص الجسيمية للمادة أو خصائصها الموجية لكن لا تستطيع استعراض كليهما في نفس الوقت مبدأ التكامل لبور.

٦. أدوات القياس هي أساساً أدوات كلاسيكية وتقيس خصائص كلاسيكية كالموضع وقوة الحركة.

٧. الوصف الميكانيكي الكمي لنظام كبير ينبغي أن يكون قريباً جداً من الوصف الكلاسيكي مبدأ التوافق ل بور وهايزنبرج.

مبدأ عدم اليقين (عدم التعيين, الشك,) لهايزنبرغ

• The Uncertainty Principle



Werner Heisenberg, 1901-1976.

يعتبر مبدأ الريبة أو مبدأ هايزنبرغ أحد نتائج الطبيعة الموجية للمادة، حيث يضع حدوداً لمدى دقة قياسنا لزوج من الخواص المتكاملة "مثل المكان وكمية الحركة" أو "الطاقة والزمن" حيث أنه كلما زادت دقة قياسنا لمكان جسيم ما، كلما قلت معرفتنا عن كمية حركته، وبالعكس، حيث يأخذ المبدأ الشكل الرياضي:

Δx عدم التعيين بمكان الجسيم.

Δp عدم التعيين بكمية حركة الجسيم.

h ثابت بلانك المصغر.

فكلما قلّ عدم التعيين بخاصية، كلما ازداد في الأخرى، لكن لماذا؟


إذا قمنا بدراسة الجسيم باعتبار خواصه الجسيمية فهذا بالضرورة يؤدي إلى فقد خواصه الموجية والعكس صحيح أي اذا درسنا الجسيم باعتبار الخاصية الموجية فهذا سيؤدي إلى فقد خواصه الجسيمية. وإذا أردنا أن ندرس الخاصيتين معاً فإننا سوف لا نستطيع تحديد موقع الجسيم بدقة بل نعين احتمالية تواجد الجسيم في الفراغ وفي هذه الحالة من عدم

الدقة في تحديد موقع الجسم فإنه لن يفقد خواصه الموجية.. لذا من المستحيل أن نطبق الخواص الموجية والجسيمية في وقت واحد على الجسيمات المادية أو الفوتونات فإذا اخترنا أحد الصفتين فلا بد من استبعاد الأخرى. لذا فإن مبدأ الشك يجمع الخاصيتين معاً.

مبدأ الشك في الفيزياء الكلاسيكية


الجسيم المثالي هو الجسم الذي يمكن تعيين موقعه في الفراغ بدقة كما إن كتلته وشحنته محددة بدقة. والموجة المثالية هي موجة جيبية لا يمكن تحديد مدى انتشارها في الفراغ أي أنها تمتد امتداداً لانهاياً ولها تردد محدد ν وطول موجي معين λ وسرعة انتشار v $v\lambda = \nu$

لنفترض أن لدينا موجة مثالية ونريد أن نقارن موجة مجهولة بتلك الموجة القياسية. والسؤال هنا كيف يمكن أن نقول بمنتهى الدقة أن تردد الموجة المجهولة يساوي تماماً تردد الموجة المثالية؟



سوف ندع الموجتان تداخلان لكي ينتج عنها ظاهرة الضربات Beats عدد الضربات في وحدة الزمن يساوي الفرق في ترددهما, إذا قمنا بمراقبة الموجتان لمدة محدودة من الزمن قد لا نلاحظ تغيراً ملحوظاً على سعة الموجة المحصلة الناتجة من التداخل ولكن لا يمكننا بذلك

أن نجزم بأنه لا يوجد ضربات إذ أنه إذا انتظرنا وقتاً كافياً لأمكننا تسجيل ضربة. ولكي نكون متأكدين تماماً من عدم وجود ضربات أي أن فرق التردد بين الموجتين يساوي صفر أي لهما نفس التردد فلا بد من الانتظار زمناً لانهائياً.



إذا كان الفرق في التردد بين الموجتين هو Δv فإن الفاصل الزمني بين ضربة والتي تعقبها هو $1/\Delta v$

ولذلك لا بد من أن ننتظر زمناً Δt على الأقل أكبر من الزمن بين الضربتين أي أن

$$\Delta t \geq 1/\Delta v$$

بمعنى أن الاحتمالية (الشك) في قياس التردد Δv تكون كبيرة إذا كان التردد قد قيس على امتداد فترة زمنية قصيرة وحتى يكون الشك في التردد Δv مساوياً للصفر فإن Δt لا بد أن تكون لانهائية.

$$\Delta v \Delta t \geq 1 \quad (1)$$

العلاقة التي تعطي الاحتمالية المناظرة للطول الموجي هو $\Delta \lambda$ يمكن اشتقاقها كالتالي:

$$\Delta x = v \Delta t$$

$$\Delta t \geq \frac{1}{\Delta \nu} \quad \Delta t = \frac{\Delta x}{v}$$

$$\therefore \frac{\Delta x}{v} \geq \frac{1}{\Delta \nu}$$

$$\text{But } v = v\lambda \quad v = \frac{v}{\lambda} \quad \Delta \nu = \frac{v \Delta \lambda}{\lambda^2}$$

$$\frac{\Delta x}{v} \geq \frac{\lambda^2}{v \Delta \lambda}$$


$$\Delta \lambda \geq \frac{\lambda^2}{\Delta x}$$

$$\Delta \lambda \Delta x \geq \lambda^2 \quad (2)$$

المعادلة (٢) تشير إلى انه إذا كان امتداد الموجة في الفراغ غير محدد أو لا حتمي بمقدار Δx فإن طولها الموجي غير حتمي بمقدار $\Delta \lambda$ حيث أن $\Delta \lambda = \lambda^2 / \Delta x$. بمعنى أنه لكي تكون الموجة وحيدة اللون $\Delta \lambda = 0$ فإن امتدادها يكون لا نهائي في الفراغ.

النبضة الموجية Wave Packet

النبضة الموجية هي اهتزازة موجية محصورة في مدى محدد من الفراغ يمكن إثبات (رياضياً) إن تلك الموجة مكونة من عدة موجات مختلفة في التردد ومتطابقة الواحدة فوق الأخرى أي لها محتوى ترددي $\Delta \nu$ وإذا جمعنا عدد الموجات ذات الترددات المختلفة التي تداخلها مع بعضها البعض لنحصل على نبضة حادة تماماً فسوف نجد أن جميع الترددات من صفر إلى ما لا نهاية أي أن المحتوى الترددي لهذه النبضة هو $\Delta \nu = \infty$ ومعنى ذلك أن $\Delta \lambda = \infty$ ومن المعادلة (٢) فإن $\Delta x = 0$ وهي الصفة الجسيمية.



• مبدأ الشك لهيزنبرج

$$\Delta x = \Delta t = 0$$

ومن ناحية أخرى فإن الشك في تحديد الطول الموجي والتردد يكونان مالا لنهاية

$$\Delta \lambda = \Delta \nu = \infty$$

إذا اعتبرنا حالة وسط أي ان يكون رصد الفوتون في المكان والزمان بطريقة غير محددة بدقة بل بنسبة شك قدرها Δx للمكان و Δt للزمان فإن من المعادلتين (١) و (٢) يكون

$$\Delta \nu \Delta t \geq 1 \quad (1)$$

$$\Delta \lambda \Delta x \geq \lambda^2 \quad (2)$$

والمعادلة (١) تعني أنه في حالة قياس التردد لموجة خلال فترة محددة من الزمن Δt يكون الشك في التردد هو $\Delta \nu$ والمعادلة (٢) تعني أنه في حالة قياس الطول الموجي لموجة في مسافة قدرها Δx فإن الشك في قياس الطول الموجي يكون $\Delta \lambda$.

هاتين المعادلتين تم استنتاجهما على أساس الفيزياء الكلاسيكية وفي الفيزياء الحديثة يستعان بهاتين المعادلتين في ربط الخصائص الجسيمية (الطاقة وكمية الحركة) مع الخصائص الموجية (التردد والطول الموجي). من خلال المعادلتين التاليتين:

$$\text{Energy of the photon} \quad E = h \nu$$

$$\text{Momentum of the photon} \quad p = h/\lambda$$

ويأجاء التفاضل للمعادلة الأولى نحصل على مقدار الشك في الطاقة بالنسبة للشك في التردد

$$\Delta E = h \Delta \nu$$

$$\Delta E \Delta t \geq h \quad (3)$$

وهذه الصيغة الأولى لمبدأ الشك لهيزنبرج والتي تنص على أن حاصل ضرب مقدار الشك في الطاقة والزمن يكون على الأقل أكبر من أو يساوي ثابت بلانك. وهذا يعني أن في حالة جسيم مثل الإلكترون أو الفوتون أو مجموعة من الجسيمات تكون في مستوى طاقة معين لفترة زمنية محددة بـ Δt , وعليه يكون الشك في مقدار مستوى الطاقة صفر إذا بقيت الجسيمات في ذلك المستوى لفترة زمنية لانهائية, وحيث أن الجسيمات تمكث في مستوى الطاقة فترة زمنية محددة إذا سيكون هناك مقدراً من الشك في الطاقة قدره ΔE ويساوي ثابت بلانك على Δt .

لجسيم يتحرك في بعد واحد على محور x فإن العلاقة بين الشك في كمية حركة الجسيم والشك في الطول الموجي يمكن الحصول عليه بتفاضل المعادلة

$$\lambda/p = h$$

$$\Delta\lambda = \frac{h}{p_x^2} \Delta p_x$$

$$\Delta\lambda\Delta x = \frac{h\Delta p_x}{p_x^2} \Delta x \geq \lambda^2$$

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{(\lambda p_x)^2}{h}$$

$$\Delta p_x \Delta x \geq h$$


- وهذه الصيغة الثانية لمبدأ الشك لهيزنبرك والتي تنص على أن حاصل ضرب مقدار الشك في الموقع ومقدار الشك في كمية الحركة يساوي على الأقل ثابت بلانك. وعليه فإنه من المستحيل قياس كلاً من المكان وكمية الحركة في نفس اللحظة بدقة متناهية.

نتائج مبدأ هايزنبرغ:

- لا نستطيع في هذه العجالة أن نغطي بالتفصيل مبدأ هايزنبرغ في مقرر الكم 1 ولكن هذه مقتطفات من نتائج مبدأ اللاتحديد لهايزنبرغ
- a. علاقة عدم التعيين عبارة رياضية تعبر عن وجود خواص جسيمية وموجية للجسيمات (فرضية دوبري) ، ولا معنى للقياس المفرد في العلاقة ،والجداء المزدوج هو الذي يعطي العلاقة أهميتها في ميكانيكا الكم.
- b. لايجوز على الإطلاق دراسة الظاهرة الموجية للجسيم دون الظاهرة الجسيمية لأننا نحصل على مفاهيم خاطئة.
- c. لايمكن تطبيق مفاهيم العالم الجهرى (الأجسام الكبيرة - قوانين نيوتن) على مفاهيم العالم المجهرى الذي يستند إلى مبدأ هايزنبرغ.
- d. إن مسألة الدقة المتناهية في القياس مسألة خيالية في الجمل المجهرية والتي تعتمد في القياس على مبدأ الاحتمال .

- كيف يمكن تصور شكل موجة الإلكترون بالاعتماد على مبدأ الشك؟

ذكرنا سابقاً أن للإلكترون خصائص موجية وأن الإلكترون يمكن اعتباره موجة ولكن طبيعة هذه الموجة غير معروف وتم اعتبار الدالة الموجية ψ هي الموجة المصاحبة للإلكترون. ومن مبدأ الشك يمكن الجمع بين الخاصية الجسيمية والخاصية الموجية باعتبار موجة تنتشر على مدى محدد في الفراغ وبالتأكيد فإن هذه الموجة لن تكون موجة جيبية لأن الموجة الجيبية غير محددة في الفراغ ولها امتداد لانهائي. وإذا افترضنا مجموعة من الموجات الجيبية بترددات مختلفة تشكل نبضة موجية wave packet تنتشر على مدى محدد في الفراغ كما في الشكل يمكن ان تمثل موجة الإلكترون.



تمارين:

- أوجد مقدار الخطأ في قياس كمية تحرك إلكترون يحمل طاقة قدرها ١٠٠٠ إلكترون فولت ويتحرك على استقامة محور x افترض أن الخطأ الحتمي في قياس موقع الإلكترون لا يتعدى ١ انجستروم (وهذا يمثل الأبعاد الذرية)
- أوجد مقدار الاحتمية (الشك) في قياس كمية تحرك جسم كتلته ١٠ جرام يتحرك بسرعة قدرها ١٠ سم/ثانية. افترض أن الاحتمية في تحديد موقع الجسم تساوي ١٠^{-٣} سم

• التطبيق على ذرة الهيدروجين

نموذج المدار الذري كان نموذج بور الذري كوكبياً حيث تدور الإلكترونات حول "الشمس" الذرية، لكن مبدأ الشك في الإلكترون ينص على أنه لا يستطيع أن يمتلك مكاناً محدداً وسرعة متجهة في أن واحد كما تمتلك الكواكب بدلاً عن المدارات التقليدية ، لذلك يُقال عن الإلكترونات بأنها تقطن في مدارات ذرية، المدار هو "غيمة" ويعني الأماكن التي يُحتمل وجود إلكترون فيها لذا هو عبارة عن توزيع احتمالات عوضاً عن مكان محدد. لكل مدار ذري ثلاثة أبعاد، وهي نوعاً ما أكثر من المدارات الثنائية، وغالباً ما تصور كمناطق ثلاثية أبعاد داخلية مع احتمال وجود الإلكترون داخلها بنسبة ٩٥٪. وقد تمكن العالم إرفين شرودينغر من حساب مستويات طاقة الهيدروجين بمعاملة إلكترون ذرة الهيدروجين كموجة، ووصفت بـ "الدالة الموجية ψ " ، وأما في فرق الجهد الكهربائي V ، فيعد البروتون مكوّنها. كما أن الحلول لمعادلة شرودينغر كانت تكمن في تصنيف احتمالات لأوضاع وأماكن الإلكترون. وللمدارات الذرية مجموعة مختلفة من الأشكال الثلاثية الأبعاد. ومن الممكن حساب طاقة هذه المدارات التي تتطابق بدقة مع مستويات الطاقة في نموذج بور.

• وفي مثال شرودينغر، لكل إلكترون أربع خصائص:

١. تعيين "مداري" يشير إلى ما إذا كانت موجة الجسيم الأقرب من النواة لها طاقة أقل أو أن الأبعد من النواة لها طاقة أكثر.
٢. "شكل" المدار سواء كان كروي أو غير ذلك.
٣. "ميل" المدار، وذلك بتحديد العزم المغناطيسي للمدار حول محور z.
٤. "عزل" الإلكترون.

والاسم المجمع لهذه الخصائص هو الحالة الكمومية للإلكترون. quantum state والحالة الكمومية يمكن أن توصف بإعطاء رقم لكلٍ من هذه الخصائص: وهذه الأرقام تعرف بأعداد الكم للإلكترون quantum numbers ، الحالة الكمومية للإلكترون توصف بدالته الموجية، وينص مبدأ استبعاد باولي بأنه لا يمكن لإلكترونين في الذرة أن يكون لهم نفس القيم لكل

الأرقام الأربعة. أول خاصية تصف المدار هي عدد الكم الرئيسي وهي الأعداد الصحيحة ورقم الكم لمدار الكتروني n هو نفسه نموذج بور بحيث يمثل n مستوى الطاقة لكل مدار كما أن القيم الممكنة ل n هي أعداد صحيحة. عدد الكم التالي هو عدد الكم المداري الذي تمت الإشارة إليه يصف الشكل المداري l وهذا الشكل نتيجة لزخم الزاوية المداري ويتم هذا الزخم الزاوي بمقاومة اللف المغزلي لزيادة السرعة أو إبطاءها تحت تأثير قوى خارجية ويمثل عدد الكم المداري زخم الزاوية المداري للإلكترون حول النواة والقيمة الممكنة ل l هي الأعداد الصحيحة من ٠ إلى ١

يُرمز لشكل كل مدار بحرف معين أيضاً. الشكل الأول يرمز إليه بالحرف s ليساعد في تذكر كلمة ("sphere") الشكل الثاني يرمز إليه بالحرف p وله شكل الدمبل (الذي يستخدم في تمرين عضلات اليد)، المدارات الأخرى لها أشكال أكثر تعقيداً (أنظر المدار الذري) ويرمز إليها بالحروف d ، f ، و g .

الرقم الكمي الثالث، الرقم الكمي المغناطيسي، يصف اللحظة المغناطيسية للإلكترون، ويرمز إليه ب m_l أو m . القيم المحتملة ل m_l هي أعداد صحيحة من $-l$ إلى l : العدد الكمي المغناطيسي يقيس المكوّن للعزم الزاوي في اتجاه معين، اختيار الاتجاه يتم اعتباطياً، اعتيادياً يتم اختيار الاتجاه z .

عدد الكم الرابع، عدد الكم الدوار (متعلق "باتجاه" دوران الإلكترون) ويرمز له ب m_s ، مع اتخاذ القيمة $+1/2$ أو $-1/2$.

• التشابك الكمي

ينص مبدأ باولي للاستبعاد على أنه لا يمكن لإلكترونين في نفس النظام أن تكون لهم نفس الحالة، الطبيعة -على أي حال- تترك الاحتمالية مفتوحة لأن يكون للإلكترونين كلا الحالتين "متداخلة" على كل واحد منهم، نستذكر أن دوال الموجة التي تنشأ في نفس اللحظة من شقين إثنين تصل إلى شاشة الكشف في حالة تراكب فلا شيء مؤكد مالم تنهار الأشكال الموجية المتراكبة ففي تلك اللحظة يبرز إلكترون في مكان ما حسب الإحتمالية التي هي مربع

القيمة المطلقة لمجموع السعات ذات القيم المركبة للشكلين الموجيين المتراكبين فالحالة هناك هي تصويرية جدا حالياً فهي طريقة محددة في التفكير عن الفوتونات المتشابكة الفوتونات حيث تتراكب حالتان متضادتان إثنان على كل منهما في نفس الحدث هي كما يلي: تخيل أن تركيب حالتين يمكن وصفهما ذهنياً باللون الأزرق والآخر باللون الأحمر فسوف يظهر (تخليياً طبعاً) كحالة أرجوانية ولنفترض أيضاً أن الفوتونان نتجا عن نفس الحدث الذري وقد يكونا تكونهما ناتج عن إثارة كريستالة لديها خاصية امتصاص فوتون ذو تردد معين ومن ثم إصدار فوتونان لذيهما نصف التردد الأصلي لذا فكل الفوتونين يكونان بالحالة الأرجوانية.

إذا ما قام المختبر ببعض التجارب لتحديد كون أحد الفوتونات أحمر أو أزرق فإن هذه التجربة تغير حالة الفوتون المعني من كونه يمتلك حالة تراكب من "الأحمر" و "الأزرق" إلى فوتون لديه واحد فقط من هذه الصفات كانت المشكلة التي عانى منها اينشتاين مع هذه الحالة التخيلية هي أنه إذا كان أحد هذه الفوتونين في حالة ارتداد مستمر بين مرآيا متعددة في مختبر على كوكب الأرض وقطع الفوتون الثاني نصف مسافة الطريق إلى أقرب نجم خارجي فعندما يتم الكشف عن الفوتون الأول بكونه أزرق أو أحمر فهذا يعني أن الفوتون البعيد عليه أيضاً ان يفقد حالته الأرجوانية فإذا تم اختباره بعد قياس الفوتون التوأم فإنه حتماً سوف يظهر في الحالة المعاكسة لحالة توأمه.

في محاولة لإثبات أن ميكانيكا الكم ليست نظرية كاملة بدأ اينشتاين بالتنبؤ الخاص بالنظرية التي تنص على أن اثنين أو أكثر من الجسيمات التي تفاعلت في الماضي يمكن أن يُظهر ارتباطاً قوياً عندما يتم قياس خصائصهما المختلفة في وقتٍ لاحق، سعى اينشتاين لتفسير هذا التفاعل بطريقة كلاسيكية أي من خلال ماضيها المشترك، مفضلاً أن لا يكون التفسير على افتراض "عمل تخيلي عن بعد" وقام كلاً من اينشتاين وبودولسكي وروزن عام ١٩٣٥ بكتابة ورقة بحثية علمية شهيرة عُرفت اختصاراً بـ (EPR) إي-بي-آر نسبة إلى الحروف الأولى لأسمائهم) مفصلة ما يُعرف الآن بـ "مفارقة إي-بي-آر EPR paradox" والتي استناداً على

ما يُعرف الآن بالواقعية المحلية تحاول أن تُظهر من خلال النظرية الكمية أن الجسم يمتلك موضع وكمية حركة في آنٍ معاً على عكس ما يفترضه تفسير كوبنهاغن القائل بأنه واحد فقط من هذه الخصائص يمكن أن يتواجد فقط في اللحظة التي يتم قياسه فيها. تستنتج فرضية إي-بي-آر أن النظرية الكمية غير مكتملة لأنها ترفض الأخذ بالإعتبار الخصائص الفيزيائية التي توجد بشكل مؤثر في الطبيعة (تعد ال إي-بي-آر أحد أكثر فرضيا اينشتاين ذكراً في مجالات الفيزياء) ففي نفس العام استخدم إرفين شرودنغر Erwin Schrödinger مصطلح "التشابك الكمي" "entanglement" "وصرح قائلاً: "لا يمكنني أن أصفه بأنه صفة واحدة بل سمة مميزة من سمات ميكانيكا الكم". يظل التساؤل حول ما إذا كان "التشابك الكمي" حالة واقعية محل خلاف وجدل بين العلماء. كما تظل مبرهنة (لاتساويات) بيل Bell inequalities من أكبر التحديات التي تواجه فرضية اينشتاين.


• المعنى الفيزيائي للدالة الموجية (التابع الموجي) المرافقة للجسيم المادي

- مقدمة
- المعلومات التي تحويها الدالة الموجية المرافقة للجسيم المادي وفق المنظور الجديد
- احتمال وجود الجسيم في مكان ما

• مقدمة:

يبدو من خلال دراسة سرعة المجموعة أن الموجة المرافقة للجسيم ليست جيبيية بل تراكب عدة موجات جيبيية متقاربة التردد (حزمة أمواج) لتعطي دالة مركبة ، يمكن تحليل حزمة الأمواج تلك وفقا لتحليل فورييه حيث يمكن تحليل أي دالة دورية إلى مجموع دوال جيبيية وفق آلية رياضية (راجع الرياضيات للفيزيائيين) يمكن من خلالها التعرف على الدوال الجيبية التي شكلت الدالة الدورية ، أي أن الدالة الموجية التي سنتعامل معها مستقبلا هي حزمة الأمواج (مجموعة الأمواج المترابكة) ، يمكن كتابة ذلك بالشكل:

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3 + \dots \Psi_n \quad (1)$$



الشكل (1): تراكب عدة موجات تعطي نبضة مغلفها يمثل سعة الدالة الموجية

مثال تراكب موجتين متقاربتين في التردد والعدد الموجي:

$$\Psi(x, t) = \Psi_1(x, t) + \Psi_2(x, t)$$

$$\Psi_1(x, t) = \sin(kx - \omega t)$$

$$\Psi_2(x, t) = \sin((k + \Delta k)x - (\omega + \Delta \omega)t)$$

(2)

وجمع الدالتين يعطي:

$$\Psi(x, t) = 2 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin\left(\frac{2k + \Delta k}{2}x - \frac{2\omega + \Delta \omega}{2}t\right)$$

(3)

وذلك بالاستفادة من القاعدة الرياضية:

$$\sin A + \sin B = 2 \cos\left(\frac{1}{2}(A - B)\right) \sin\left(\frac{1}{2}(A + B)\right)$$


(4)

Now suppose that $\Delta k \ll 2k$ and $\Delta \omega \ll 2\omega$ so that

$$\Psi(x, t) \approx 2 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin(kx - \omega t) = P(x, t) \sin(kx - \omega t).$$

(5)

العلاقة (5) تمثل الدالة الموجية الجديدة حيث $P(x, t)$ يمثل سعة الموجة ويلاحظ أنها تمثل موجة جيبيية تغلف حزمة الأمواج المتراكبة (الشكل 2).



الشكل (2): تراكب (تداخل) موجتين

- المعلومات التي تحويها الدالة الموجية المرافقة للجسيم المادي وفق المنظور الجديد:

نستفيد هنا من الدالة الموجية للموجة الكهرومغناطيسية باعتبار أن الفوتون يمثل الجانب المادي للموجة والتي نحصل عليها من حل المعادلة التفاضلية الموجية للفوتون وتكتب بالشكل:

$$\nabla^2 \phi(r, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi(r, t)}{\partial t^2}$$

$$\phi(r, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (6)$$

المعادلة (6) دالة مركبة (عقدية) تحوي وصفا موجيا لأنها تحوي متجهة الموجة والتردد الزاوي (لاحظ أن A تمثل سعة الموجة الموصوفة أعلاه)، ويمكننا استخدام العلاقات التي تربط الخواص الموجية مع الخواص المادية من العلاقتين :

$$\vec{P} = \hbar \vec{k} \quad \Rightarrow \quad \vec{k} = \frac{\vec{P}}{\hbar}$$

$$E = \hbar \omega \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{E}{\hbar} \quad (7)$$

وبتعويض (7) في (6) نحصل على دالة موجية تحوي في طياتها وصفا ماديا وهو ما نريده هنا بتمثيل دالة موجية تعبر عن حركة جسيم مادي وسنعطيها العلاقة التالية:

$$\psi(r, t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)} \quad (8)$$

العلاقة (8) هي حل لمعادلة شرودينجر، أي يجب أن نحصل عليها من حلول معادلة شرودينجر لاحقا ، ولكننا هنا نبحث عن أهميتها وماذا تقدم لنا من معلومات عن الجسيم الذي ترافقه وتتحرك معه وبسرعته؟؟؟؟؟

يفترض بالدالة الموجية أن تعطينا كافة المعلومات الفيزيائية المتعلقة بطاقة الجسيم وكمية حركته وهذه أول ميزة لهذه الدالة الموجية. والفقرات اللاحقة تعطي الميزات الأخرى.

احتمال وجود الجسيم في مكان ما:

تحتل الدالة الموجية أو دالة الموجة مكانة مهمة في ميكانيكا الكم، حيث ينص مبدأ الشك على عدم قدرتنا بنفس اللحظة تحديد موضع وسرعة جسيم ما بنفس الدقة، لكن نعلم إلى دالة موجية مرافقة لكل جسيم حسب التصور الموجي الذي قدمه شرودنغر، وتقوم هذه الدالة الموجية بتحديد احتمال وجود الجسيم في أي نقطة من الفراغ التي يمكن للجسيم التواجد به، وذلك حسب اقتراح ماكس بورن 1926م (Max Born) والذي بين فيه أن مربع الدالة الموجية ($\psi^2 = \psi \psi^*$) النجمة تعني مرافق الدالة المركبة (عقدية أو تخيلية) يحمل معنىً فيزيائياً رائعاً ألا وهو معرفة احتمالية وجود الجسيم في عنصر حجم مقدار dv بدلالة دالته الموجية، فالدالة الموجية ψ لإلكترون ذرة الهيدروجين (مثلاً) المتواجد في مكان ما من الفضاء حول النواة يمكن معرفة احتمالية تواجده في الأمكنة المختلفة المحيطة بالنواة من خلال العبارة الرياضية التالية:

$$dp = |\psi^2(r,t)| dv = \psi(r,t)\psi^*(r,t)dv \quad (9)$$

حيث dp احتمال تواجد الجسيم بالحجم dv ويأخذ دوماً قيماً حقيقية.

في العلاقة (9) عند تقسيم الطرفين على عنصر الحجم نحصل على أبعاد كثافة نسميها كثافة الاحتمال (probability density) كما في العلاقة التالية:

$$\rho(r,t) = \frac{dp}{dv} = |\psi^2(r,t)| \quad (10)$$

أما احتمال تواجد الجسيم في الفضاء كله فإننا نكامل العلاقة (9) على الفضاء كله الممتد من اللانهاية والذي يعبر عن مجموع احتمالات تواجد الجسيم في كل عناصر الحجم المترابطة حول بعضها البعض مكونة الفضاء اللانهائي، وهنا نحن متأكدون من تواجد الجسيم في هذا

الفضاء المفروض وبالتالي فان احتمال تواجد الجسيم سيكون (100%=1)، وذكذب ذلك بالعلاقة الرياضية التالية:


$$\int_0^1 dp = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi^2(r,t)| dv = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(r,t)\psi^*(r,t) dv = 1 \quad (11)$$

إن العلاقة التي تحقق الشرط في العلاقة (11) تسمى دالتها الموجية بالدالة المعايرة أو المظمنة وتسمى العلاقة بعلاقة المعايرة أو شرط لتنظيم (normalization condition)، وإذا كانت الدالة ليست معايرة فإننا نضربها بثابت بحيث تتحقق العلاقة (11) كما يلي:

$$\begin{aligned} \int_0^1 dp &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(r,t)|^2 dv = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(r,t)\psi^*(r,t) dv = N \neq 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(r,t)\psi^*(r,t) dv &= N \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\psi(r,t)|^2}{N} dv = 1 \\ \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(r,t)|^2 dv &= 1 \quad (12) \end{aligned}$$

يشترط بالدالة الموجية التي تحقق شرط المعايرة مايلي

- أن تكون الدالة الموجية أحادية القيمة أي أن كل قيمة محددة للموضع يقابلها قيمة وحيدة للدالة الموجية فقط وليس أكثر، وهذا شرط أساسي لان الدالة أحادية القيمة تعطي احتمال واحد لتواجد الجسيم بينما المتعددة القيمة تعطي أكثر من احتمال لتواجد الجسيم وهذا مرفوض لان الجسيم لايمكن أن يتواجد في أكثر من مكان في نفس اللحظة والعكس أيضا لايمكن لجسيم أن يكون له دالتان مختلفتان في نفس المكان ، انظر الشكل (3) يمثل دالتين أحدهما أحادية القيمة والثانية متعددة القيمة.



الشكل (3) يمثل دالتين أحدهما أحادية القيمة والثانية متعددة القيمة

- أن تكون الدالة الموجية متصلة (continuous) وكذلك مشتقاتها متصلة ، لأن كون الدالة غير متصلة (عندها انقطاع في الدالة في مكان ما) يصبح الجسم غير معرف في منطقة الانقطاع.
- يجب على الدالة أن تكون معرفة في كل نقطة ولا يجوز أن تكون قيمتها مالانهاية لان احتمال تواجد الجسم يصبح مالانهاية وهو أمر غير مقبل فيزيائيا.

معادلة شرو دنجر

معادلة شرو دنجر هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية تحققها دالة موجية. هذه المعادلة تصف تطور حالة الجسيم خلال الزمن كما تحدد الحالات المستقرة للجسيم في وضعيات معينة.

تطلب التصور الجوهري الجديد الذي أعلنه ديبرولي وجود فيزياء جديدة. كيف من الممكن أن تتحد الطبيعة الموجية والجسمية في الرياضيات؟ قام آينشتاين سابقاً بربط طاقة الفوتون مع تردد الضوء، والذي بدوره أثبت وجود علاقة مع طول الموجة حسب المعادلة: $\lambda = c/f$. حيث أن λ هي طول الموجة، و c هي سرعة الضوء، و f هي التردد. وباستخدام نتائج النظرية النسبية من الممكن أن نوجد تناسب بين الطاقة والفوتون وكمية تحركه. لنخرج بالعلاقة التالية:

$$\lambda = h/p$$

حيث أن λ هي طول موجة الفوتون، و p هي كمية تحركه، و h هي ثابت بلانك. وباستنتاج السابق، افترض ديبرولي أن نفس العلاقة بين طول الموجة وكمية التحرك يجب أن تعمل على أي جسيم.

في هذه المرحلة، من الأفضل أن تفصل حدسك عن ما هو معنى قول أن الجسيمات تتصرف كأمواج (سيُشرح الموضوع بالتفصيل في مقالنا التالي) ومتابعة الرياضيات فحسب. في الميكانيكا الكلاسيكية، تشرح معادلة الموجة Wave Equation تطوّر الموجة عبر الوقت، مثل موجة الصوت وموجة الماء، وهي معادلة تفاضلية حلّها هو اقتران الموجة الذي يُعطيك شكل الموجة في أي وقت.

على سبيل المثال، افترض أن لدينا أمواج تتحرك عبر حبل مشدود على المحور السيني (X -axis)، ويهتز في سطح المحاور السيني والصادي (XY -plane) حتى توصف الموجة كليا، سنحتاج إيجاد إزاحة الحبل في اتجاه المحور الصادي، ويرمز لها بالرمز $Y(x,t)$ حيث x هي

كل نقطة يمر بها و t هي كل وقت خلال الحركة. باستخدام قانون نيوتن الثاني للحركة، نجد أنّ لدينا هذه المعادلة:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

حيث أنّ v هي سرعة الأمواج.




Figure2: the displacement in XY-plane

إنّ الحل العام لهذه المعادلة معقّد بعض الشيء، بسبب حقيقة أنّه من الممكن أن يتذبذب الحبل بجميع الطُرُق الممكنة، وحقيقة أنّنا نحتاج معلومات إضافية عن النظام (مثل الحالة الأولية للنظام والظروف المحيطة به) حتى نجد بالتحديد ما هو نوع الحركة الموجود. ولكن كمثال، فإنّ المعادلة التالية تصف حركة الموجة في اتجاه المحور السيني الموجب (Positive X-direction) مع وجود التردد الزاوي ω ، إذًا كما تم التوقّع، من الممكن إيجاد حل لمعادلة الموجة:

$$y(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

وبالتشابه، يجب أن توجد معادلة موجيّة تحكم تطوّر لغز "أمواج المادة"، بغض النظر عمّا يكون في خلال الوقت. يجب أن يكون حلّها اقتران موجي ψ لكن يقاوم فكرة وصفه على أنّه موجة حقيقية) والذي يخبرنا كل ما نريد معرفته عن النظام الكمومي - مثل جسيم واحد يدور داخل صندوق - في أي وقت. وهو ما أخرجه العالم النمساوي إروين شرودنجر عام ١٩٢٦. لنظام جسيم وحيد يدور ويتحرك في الثلاثة أبعاد، يمكن كتابة معادلته كالتالي:

$$\frac{i\hbar}{2\pi} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m} \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \right) + V\Psi.$$

حيث أن V هي طاقة الوضع للجسم (واقتران بدلالة x, y, z و t) و i هو العدد التخيلي، و m هي كتلة الجسم، و \hbar هو ثابت بلانك. حل هذه المعادلة هو اقتران الموجة

$$\psi(x, y, z, t)$$

في بعض الحالات، لا تعتمد طاقة الوضع على الوقت. وفي هذه الحالة نستطيع في العادة حل السؤال من خلال اعتبار نسخة عدم الاعتماد على الوقت time-independent من معادلة شرودنجر، حيث يعتمد الاقتران على الفراغ فقط:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{\hbar^2} (E - V)\psi = 0,$$

حيث أن E هي الطاقة الكلية للجسيم، وحل المعادلة الكاملة يكون:

$$\Psi = \psi e^{-i(2\pi E/\hbar)t}$$

تُطبَّق هذه المعادلات على جسيم يتحرك حركة ثلاثية الأبعاد، لكن لديها نظائر تصف نظام بأي عدد من الجسيمات. وِعوضاً عن صياغة اقتران الموجة كاقتران يعتمد على الموقع والزمن، يمكننا صياغته كاقتران يعتمد على كمية التحرك والزمن.

إدخال عدم اليقين

سنقوم باستعراض حل معادلة شرودنجر لمثال بسيط في الفقرة التالية، وكيف يشابه حله بشكل كبير المعادلة الرياضية التي تصف حركة الأمواج.

لكن ما هو معنى هذا الحل؟ لا يمكن أن يُعطي موقع محدد للجسيم المدروس في وقت مُعطي، لذلك لا يمكنه أيضاً التنبؤ بمسار الجسيم مع مرور الوقت. بدلاً من ذلك، يُعطي هذا الحل اقتراناً مع الوقت ويُعطي قيمة لجميع الأماكن الممكنة $\psi(x, y, z, t)$ ، ويكون حله (x, y, z) والسؤال الآخر، ما هو معنى هذه القيمة؟ في عام ١٩٢٦ قام العالم ماكس بورن Max Born بإيجاد تفسير احتمالي للمعنى. حيث قام بافتراض أن مربع القيمة المطلقة لاقتران الموجة يُعطي احتمالية لإيجاد الجسيم في هذه الأماكن في الوقت المُعطي. بمعنى

آخر، احتمالية أننا سنجد هذا الجسيم في منطقة R عند وقت t من خلال الصيغتين التاليتين:

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2$$

$$\int_R |\Psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz.$$

يرتبط هذا التصور الاحتمالي بشكل أو بآخر بنتيجة صادمة لصيغة ديبرولي لطول الموجة وكمية التحرك للجسيم، التي اكتشفها ورنر هايزينبيرج Warner Heisenberg عام ١٩٢٧. وجد هايزينبيرج وجود حدود أساسية للدقة التي من الممكن أن نقيس بها موقع وكمية تحرك جسيم متحرك. كلما زادت دقة قياسك لأحد الجسيمات، قلت دقتك لقياس الآخر. وهذا ليس بسبب جودة آلات القياس، وإنما بسبب وجود انعدام يقين أساسي في الطبيعة. تُعرف هذه النتيجة الآن باسم مبدأ هايزينبيرج للايقين Heisenberg's uncertainty principle، وهي إحدى النتائج التي تُقتبس لتسليط الضوء على غرابة ميكانيكا الكم. وهذا يعني: أنه لا يمكننا في ميكانيكا الكم التحدث ببساطة عن مسار أو موقع أحد الجسيمات التي نقوم بدراستها.

لِمَ يجب علينا تصديق هذه الادعاءات الخيالية؟ في هذا المقال، فُمنّا بتقديم معادلة شرودنجر كما لو أنها التُقطت من الفراغ، لكن من أين أتت فعلياً؟ كيف اشتقها شرودنجر؟ اعتبر الفيزيائي ريتشارد فاينمان Richard Feynman هذا السؤال سؤالاً عقيماً: "من أين أتينا بهذه المعادلة؟ ليس من الممكن اشتقاقها من أي شيء قد تعرفه. لقد أتت من عقل شرودنجر فحسب."

حتى الآن، تماسكت المعادلة في جميع التجارب التي أُجريت عليها. واعتبرها العلماء إحدى المعادلات الأساسية في ميكانيكا الكم، واعتبروها نقطة الانطلاق لجميع أنظمة ميكانيكا الكم التي نحاول تفسيرها مثل: البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وغيرها. إن الظاهرة الأساسية التي أدت إلى ميلاد ميكانيكا الكم، وسميت لاحقاً بـ "مُحفز شرودنجر" هي وصف


ظاهرة طيف الطاقة لذرة الهيدروجين. بالنسبة لنموذج رذرفورد الذي شرحناه في مقالنا السابق، إن تردد الإشعاع من ذرة مثل الهيدروجين يجب أن يكون مستمراً. لكن أظهرت التجارب أنه غير مستمر: تشع ذرة الهيدروجين فقط عند ترددات معينة، ويوجد قفزة عند تغير التردد. كان هذا الاكتشاف بمثابة صدمة للأحكام التقليدية، والتي أيدت مقولة وضعها الفيلسوف في القرن السابع عشر جوتفريد ليبنيز: **Gottfried Leibniz** ”الطبيعة لا تقوم بقفزات”.

في عام ١٩١٣، وضع بور نموذجاً ذرياً جديداً تكون فيه الإلكترونات مرتبطة بمستويات طاقة محددة. طبق شرودنجر معادلته على ذرة الهيدروجين ووجد أن حلوله أنتجت مستويات الطاقة التي تحدت عنها بور. وهو ما اعتُبر لاحقاً أحد أهم إنجازات معادلة شرودنجر. مع كثرة النجاحات العملية لمعادلة شرودنجر، أصبحت النظرية الأساسية لقانون نيوتن الثاني في الحركة لميكانيكا الكم.

بعض التطبيقات لميكانيكا الكم:

- ظاهرة النفق الكمي


لكي نستطيع فهم النفق الكمي علينا أن نتذكر أن الجسيمات لا تمتلك مكاناً محدداً، وبالمقابل فإن جميع الجسيمات يتم وصفها بما نسميه "دالة الموجة" حيث احتمال تواجد الجسيم في مكان معين يعطى بأخذ مربع مطال الموجة في هذا المكان.



فمثلاً في تجربة الشق المزدوج تعبر الموجة عن احتمالية تواجد الإلكترون في مكان ما، والجسم باللون الأحمر هو المكان ذو أكبر احتمال أن نجد به الإلكترون عند المراقبة. لنفترض مثلاً أننا نتجاوز بهذه الكرة جبلاً، فسوف نحتاج لتحريك الكرة من فوق الجبل، أي أننا سوف نعطي الجسم طاقةً حركية والتي بدورها سوف تتحول في قمة الجبل إلى طاقة كامنه E_a .

في ظاهرة النفق الكمي، سيستطيع الجسيم تجاوز هذا الجبل من دون أن يصعد فوقه. فهناك احتمال -تبعاً لدالة الموجة- أن يتجاوز جسيم يحمل الطاقة E حاجزاً يحمل طاقة

U، حيث ستظهر دالة الموجة انخفاضاً متزايداً ضمن هذا الحاجز إلا أنها سوف تستمر بعد تجاوزه.



في النهاية سوف يكون احتمال تواجد الجسيم بعد الحاجز ضئيلاً إلا أنه ليس صفراً، تم التحقق من هذه الظاهرة من خلال التجارب وتستخدم هذه الظاهرة في العديد من مكونات الأجهزة الإلكترونية.

- بوزون هيغز:

أو ما يسمى بالجسيم الإلهي- . جسيم أولي يُظن أنه المسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها. وقد تم رصد إشارات لجسيم هيغز عملياً في عام ٢٠١١ في ما يعرف بمصادم الهادرونات الكبير، وأعلن مختبر سرن في ٤ يوليو ٢٠١٢ أنه متأكد بنسبة ٩٩,٩٩٩٪ من وجود بوزون هيغز فعلياً. وكان قد تنبأ الفيزيائي الإسكتلندي "بيتر هيغز" عام ١٩٦٤ بوجوده في إطار النموذج الفيزيائي القياسي الذي يفترض أن القوى الأساسية قد انفصلت عند الانفجار العظيم ، وكانت قوة الجاذبية هي أول ما انفصل ثم تبعها بقية القوى. ويُعتقد طبقاً لهذه النظرية أن البوزون - وهو جسيم أولي افتراضي ثقيل ، تبلغ كتلته نحو ٢٠٠ مرة كتلة البروتون - هو المسؤول عن طريق ما ينتجه من مجال هيغز عن حصول الجسيمات الأولية كتلتها ، مثل الإلكترون والبروتون والنيوترون وغيرها . وتمكن العلماء من رصده عملياً بنسبة ٩٩,٩٩٩٪ بواسطة مصادم الهادرونات الكبير (LHC) الموجود في مختبر سرن حيث تصل

فيه سرعة البروتونات إلى سرعة الضوء تقريبا. والأعظم من ذلك أنه في معجل الهادرونات الكبير يصوب شعاعي بروتونات كل منهما بسرعة مقاربة لسرعة الضوء ضد بعضهما رأسيا، ثم دراسة نتائج هذا الاصطدام الذي يماثل ظروف الانفجار العظيم على مستوى مصغر. ولتمثيل ظروف اللحظة الزمنية ١٠-٣٥ من الثانية الأولى بعد الانفجار العظيم، والتي يُعتقد أن بوزونات هيگز تكونت عندها، يتطلب تخليقها ظروفًا قد تصل إلى ٥٠٠٠ مليار إلكترون فولت.



المراجع:

1. *Quantum Mechanics* نسخة محفوظة الإذاعة الوطنية العامة من واي باك مشين يوليو ٢٠١٧ على موقع
2. Kuhn ،Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Fourth ed. Chicago; London: The University of Chicago Press ، 2012. Print.
3. Taylor ،J. R. ؛Zafiratos ،C. D. ؛Dubson ،M. A. (2004). *Modern Physics for Scientists and Engineers*. Prentice Hall. – صفحات ١٢٧ – ٩. ISBN 0-13-589789-0.
4. Stephen Hawking, *The Universe in a Nutshell*, Bantam, 2001.
5. McEvoy ،J. P. ؛Zarate ،O. (2004). *Introducing Quantum Theory*. Totem \Books. صفحات ٧٠–٨٩, especially p. 89. ISBN 1-84046-577-8.
6. *World Book Encyclopedia*, page 6, 2007.
7. Dicke and Wittke, *Introduction to Quantum Mechanics*, p. 10f.
8. *Introducing Quantum Theory*, p. 87
9. Van der Waerden ،B. L. (1967). *Sources of Quantum Mechanics* (German translated to English). Mineola, New York: Dover Publications.