

استخدام الحاسب الآلي فى الفيزياء

3ع ف

الفيزياء الحاسوبية

4 ت ط ك

المحتوى

- 1- مقدمة عن الكمبيوتر
- 2-الباب الاول: مقدمة عن الفروق
 - المقصود بالفروق الامامية
 - تفاضل الدالة المتصلة بدلالة الفروق
 - التفاضل الاول بدلالة الفرق الامامى
 - التفاضل الاول بدلالة الفرق الخلفى
 - الحصول علي التفاضل الاول بدلالة الفرق الامامى الاول باستخدام متسلسلة تايلور
 - الحصول علي التفاضل الاول بدلالة الفرق الخلفى الاول باستخدام متسلسلة تايلور
 - الحصول علي التفاضل الاول بدلالة الفرق المركزى باستخدام متسلسلة تايلور
- 2- الباب الثانى:
 - الفروق الامامية
 - المشتقات بدلالة الفروق الامامية
 - الفروق الامامية بدلالة المشتقات
- 3- الباب الثالث:
 - الفروق الخلفية
 - الفروق الخلفية بدلالة المشتقات
 - المشتقات بدلالة الفروق الخلفية
- 4- الباب الرابع:
 - الفروق المركزية
 - القيمة المتوسطة للدالة
 - الفروق المركزية بدلالة المشتقات

- المشتقات بدلالة الفروق المركزية
- العلاقة ما بين القيمة المتوسطة و الفرق المركزى
- 5- الباب الخامس:
- الاستكمال Interpolation
- الطريقة المباشرة
- طريقة نيوتن للفروق المقسمة
- طريقة لاجرانج
- طريقة شتيرلنج
- 6- الباب السادس:
- التوفيق Regression
- التوفيق الخطى
- 7- الباب السابع:
- قياس الاخطاء

مقدمة عن الكمبيوتر

تم عمل الكمبيوتر لحل العديد من المشكلات. فقد حل فى البداية المسائل الرياضية والهندسية. ثم تعامل مع البيانات لأغراض تجارية. ويعمل هذه الأيام كأداة تحكم فى الغواصات والطائرات وخطوط إنتاج الآلات فى المصانع. يقوم الكمبيوتر بعمله فى كل هذه المجالات عن طريق استقبال البيانات ثم معالجتها ثم إخراج المخرجات.

مكونات الكمبيوتر:

يتكون الكمبيوتر من جزئين أساسيين هما:

1- Hardware الأجزاء الصلبة

2- Software مجموعة البرامج التي تتحكم فى عمل الأجزاء الصلبة.

يتميز الكمبيوتر بأنه آلة للاستخدامات المتعددة, بخلاف الآلات الأخرى التي تصمم للقيام بعمل واحد فقط. يرجع ذلك إلى قابلية الكمبيوتر للبرمجة ببرامج متعددة ومختلفة للقيام بمهام متعددة. وكذلك لاتصاله بالعديد من الأجهزة و المعدات الأخرى.

المكونات الصلبة للكمبيوتر:

يوجد أربعة أنواع من المكونات الصلبة للكمبيوتر وهى:

1- وحدات الإدخال

2- وحدات الإخراج

3- الذاكرة الرئيسية

4- وحدة العلاج والمنطق

وحدات الإدخال ووحدات الإخراج:

تعمل أجهزة الإدخال على إدخال البيانات من الخارج إلى ذاكرة الكمبيوتر. يوجد العديد من أجهزة الإدخال, منها, لوحة المفاتيح, محرك الأقراص, محرك الأقراص المغناطيسية, الماسح الضوئي, الفأرة. أما أجهزة الإخراج فتشمل: محرك الأقراص, محرك الأقراص المغناطيسي, الشاشة, الطابعة.

من مميزات الكمبيوتر:

1- قدرته على الأداء بطريقة أوتوماتيكية Automation.

2- قابليته للبرمجة Programmable.

ينقسم الكمبيوتر حسب احجامه الى:

1- حجم صغير microcomputer

2- حجم وسط minicomputer

3- حجم كبير mainframe computer

توجد العديد من المشكلات فى الهندسة والعلوم يمكن أن يعبر عنها فى صورة معادلات تفاضلية مثل مسائل الحركة الاهتزازية ومسائل التيارات والجهود فى دوائر التيارات المترددة... وهكذا. لكن, قد يكون الحل الدقيق لمثل هذه المعادلات باستخدام قوانين التفاضل صعب أو غير موجود فى بعض الحالات. لذلك نلجأ إلى حل تلك المعادلات بطرق تقريبية, وذلك بحلها بطرق عددية Numerically, وهى طرق طويلة وتستهلك الكثير من الوقت. لذلك نستخدم برامج الكمبيوتر. سوف نتناول هنا بعض الطرق الرياضية المستخدمة فى برامج حل تلك المعادلات عددياً. وكذلك بعض طرق الاستكمال Interpolation, أى تكملة ما نقص من بيانات. و التوفيق Fitting, وهو استنتاج افضل خط أو منحى يمر بمجموعة من البيانات.

الباب الاول

مقدمة عن الفروق

يوجد فرع من الرياضيات مهتم بالفروق بين الأرقام المتتالية في متسلسلة. تستخدم نتائج هذه الفروق في كثير من التطبيقات منها حساب قيم تفاضلات قد يصعب حسابها بالطرق التحليلية. يوجد ثلاثة أنواع من الفروق: الفروق الامامية، والفروق الخلفية، والفروق المتوسطة.

-المقصود بالفروق الامامية

$$Y_n = 3n - 1 \quad \text{بفرض أن لدينا المعادلة}$$

صالحة للقيم $n = 1, 2, 3, \dots$, بالتعويض عن هذه القيم في المعادلة

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots \quad \text{نحصل علي القيم التالية للمتغير } Y$$

والفروق الامامية بين الأرقام المتتالية في النتائج هي :

$$5 - 2 = 3, \quad 8 - 5 = 3, \quad 11 - 8 = 3, \quad 14 - 11 = 3, \dots$$

يتم كتابة سلسله الأرقام وسلسله الفروق عادة كالتالي :

2	5	8	11	19	نتائج
3	3	3	3		فرق أمامي أول

$$Y_n = n^2 - 3n - 2 \quad \text{كذلك بفرض أن لدينا المعادلة :}$$

فإنه للقيم $n = 1, 2, 3, \dots$ تكون النتائج والفروق الامامية في الصورة التالية:

-4	-4	-2	2	8	16	نتائج
0	2	4	6	8		فرق أمامي أول
2	2	2	2			فرق أمامي ثاني

تكون الأرقام في الصف الثاني هي فروق الأرقام في الصف الأول، وأرقام الصف الثالث هي فروق الأرقام في الصف الثاني . تسمى أرقام الصف الثاني بالفروق الأول للصف الأول، وأرقام الصف الثالث بالفروق الثانية له .

بصورة عامة ، إذا فرضنا أن $y_1 , y_2 , y_3 , \dots , y_n$

هي أية أرقام متتالية ، فإن الفروق الأولى لها تعطي من العلاقة

$$\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$$

$$\Delta^2 y_n = \Delta y_{n+1} - \Delta y_n \quad \text{وفروقها الثانية تعطي ومن :}$$

$$\Delta^3 y_n = \Delta^2 y_{n+1} - \Delta^2 y_n \quad \text{وفروقها الثالثة يعطي ومن :}$$

وهكذا ، يعطي جدول الأرقام وفروقها الأول و الثاني والثالث فى الصورة :

$$y_1 \quad y_2 \quad y_3 \quad y_4 \quad y_5$$

$$\Delta y_1 \quad \Delta y_2 \quad \Delta y_3 \quad \Delta y_4 \quad \Delta y_5$$

$$\Delta^2 y_1 \quad \Delta^2 y_2 \quad \Delta^2 y_3 \quad \Delta^2 y_4 \quad \Delta^2 y_5$$

$$\Delta^3 y_1 \quad \Delta^3 y_2 \quad \Delta^3 y_3 \quad \Delta^3 y_4 \quad \Delta^3 y_5$$

Etc

تفاضل الدالة المتصلة بدلالة الفروق

لحساب تفاضل دالة $F(x)$ عند قيمة معلومة ل (x) , يوجد ثلاث طرق لعمل ذلك بطريقة تقريبية، وذلك بالتعبير عن التفاضل بدلالة الفروق بين قيم هذه الدالة. تسمى هذه العملية بحساب تفاضل الدالة عددياً. هذه الطرق هي :

1. حساب التفاضل بدلالة الفرق الأمامي.
2. حساب التفاضل بدلالة الفرق الخلفي.
3. حساب التفاضل بدلالة الفروق المركزية.

ما هو التفاضل ؟

يعرف تفاضل دالة $F(x)$ في الصورة التالية :

$$F^1(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \rightarrow (1)$$

لكي يتم إيجاد هذا التفاضل عددياً عند قيمة معينة x ، لابد من جعل Δx

صغيرة جداً لكنها لا تساوي الصفر . ويتم حساب التفاضل بأحدى الطرق الثلاث

السابقة.

1- التفاضل الاول بدلالة الفرق الامامي:


1- Forward difference approximation of the first derivative:

نعلم أن تفاضل الدالة $F'(x)$ يكون في الصورة الآتية :

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

وبجعل Δx صغيرة جداً يكون :

$$f^1(x) \cong \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



رسم توضيحي لحساب التفاضل الاول بدلالة الفرق الامامي

لذلك إذا أردنا إيجاد قيمة $f'(x)$ عند $x = x_i$ ، نختار نقطة أخرى تبعد

بمقدار Δx للأمام عندها $x = x_{i+1}$ وبالتالي يكون :

$$\begin{aligned} f'(x) &\cong \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x} \\ &= \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \quad \rightarrow \quad (2) \end{aligned}$$

حيث $\Delta x = x_{i+1} - x_i$

التفاضل الاول بدلالة الفرق الخلفي:

2- Backward difference approximation of the first derivative

نعلم مما سبق ان

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$


وباعتبار قيمة Δx صغيرة جداً يكون :

$$f'(x) \cong \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

فإذا تم اختيار Δx كقيمة سالبة (أي فرق خلفي)، فان

$$f'(x) \cong \frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{-\Delta x}$$

$$= \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$$



رسم توضيحي لحساب التفاضل الاول بدلالة الفرق الخلفي

فإذا أردنا إيجاد $F'(x)$ عند $x = x_i$ يمكننا أن نختار نقطة ترجع عنها بمقدار

Δx وهي $x = x_{i-1}$ وبالتالي :

$$f'(x) \cong \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x}$$

$$= \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \quad \rightarrow \quad (3)$$

حيث $\Delta x = x_i - x_{i-1}$

مثال 1

إذا كانت سرعة صاروخ تعطى من العلاقة التالية:

$$v(t) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100t} \right] - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 30$$

استخدم حساب التفاضل بواسطة الفرق الامامى لتعيين العجلة عند $t=16s$, استخدم

فرق مقداره $\Delta t=2s$.

الحل:

$$a(t) \cong \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{\Delta t} \quad \text{من المعادلة (2)}$$

$$\because t_i = 16,$$

$$\Delta t = 2$$

$$\therefore t_{i+1} = t_i + \Delta t$$

$$= 16 + 2 = 18$$

$$\therefore a(16) = \frac{v(18) - v(16)}{2}$$

بالتعويض لحساب $V(16)$, $V(18)$

$$V(18) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100(18)} \right] - 9.8(18)$$

$$= 453.02 \text{ m/s}$$

$$V(16) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2000(16)} \right] - 9.8(16)$$

$$= 392.07 \text{ m/s}$$

وبالتالي :

$$a(16) = \frac{v(18) - v(16)}{2} = \frac{453.02 - 392.07}{2} = 30.475 \text{ m/s}^2$$

وهذا هو الحل التقريبي بدلالة فرق السرعات

لإيجاد القيمة الحقيقية للعجلة عند 16s، فإننا نفاضل المعادلة :

$$V(t) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100t} \right] - 9.8t$$

وذلك كالتالي :

$$a(t) = \frac{d}{dt} [V(t)]$$

من المعلوم أن :

$$\frac{d}{dt} [\ln(t)] = \frac{1}{t} \quad , \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} \right) = -\frac{1}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore a(t) &= 2000 \left[\frac{14 \times 10^4 - 2100t}{14 \times 10^4} \right] \frac{d}{dt} \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100t} \right] - 9.8 \\ &= a(t) = 2000 \left[\frac{14 \times 10^4 - 2100t}{14 \times 10^4} \right] (-1) \left[\frac{14 \times 10^4}{(14 \times 10^4 - 2100t)^2} \right] (-2100) - 9.8 \\ &= \frac{4040 - 29.4t}{-200 + 3t} \\ a(16) &= \frac{-4040 - 29.4(16)}{-200 + 3(16)} \\ &= 29.674 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

من مقارنة القيمة التقريبية بالقيمة الحقيقية يمكن معرفة مقدار الخطأ بسبب التقريب .

مثال 2: إذا كانت سرعة صاروخ تعطي من العلاقة

$$V(t) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100t} \right] - 9.8 \quad 0 \leq t \leq 30$$

أحسب باستخدام تقريب الفرق الخلفي للتفاضل الأول العجلة عند $t = 16\text{s}$ ، استخدام

فرق مقداره $\Delta t = 2\text{s}$.

الحل :

$$a(t) = \frac{v(t_i) - V(t_{i-1})}{\Delta t} \quad \text{من العلاقة (3)}$$

$$\therefore t_i = 16$$

$$\Delta t = 2$$

$$\therefore t_{i-1} = 16 - 2 = 14$$

$$\therefore a(16) = \frac{V(16) - V(14)}{2}$$

$$\therefore V(16) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100(16)} \right] - 9.8(16)$$

$$= 392.07 \text{ m/s}$$

$$\therefore V(14) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100(14)} \right] - 9.8(14)$$

$$= 334.24 \text{ m/s}$$

$$\therefore a(16) = \frac{v(16) - v(14)}{2} = \frac{392.07 - 334.24}{2} = 28.915 \text{ m/s}^2$$

وبمعرفة القيمة الحقيقية للتفاضل يمكن حساب الخطأ .

الحصول علي التفاضل الاول بدلالة الفرق الأمامي الاول باستخدام متسلسلة تايلور

Derivative of the forward difference approximation

From Taylor series

تنص نظرية تايلور علي أنه في حالة معرفة قيمة دالة $F(x)$ عند نقطة x_i وكل

مشتقاتها عند تلك النقطة ، بشرط أن تكون المشتقات متصلة ما بين x_i و x_{i+1} فإن

قيمة الدالة عند x_{i+1} يعطي من العلاقة التالية:

$$F(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 + \dots$$

للتسهيل نعوض عن $\Delta x = x_{i+1} - x_i$

$$\therefore f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)\Delta x + \frac{f''(x_i)}{2!}(\Delta x)^2 + \dots$$

$$\therefore f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{\Delta x} - \frac{f''(x_i)}{2!}(\Delta x) - \dots$$

$$\therefore f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{\Delta x} - o(\Delta x)$$

حيث $o(\Delta x)$ تبين أن الخطأ في التقريب يكون دالة في (Δx) .

يلاحظ أننا استخدمنا هنا علامة = بدلاً من \cong السابقة كما يلاحظ أن الحل الناتج عن

الفرق الأمامي يكون أكبر من القيمة الحقيقية بمقدار يتناسب مع (Δx) كما أتضح من

المثال (1).

الحصول علي التفاضل الاول بدلالة الفرق الخلفى الاول باستخدام متسلسلة تايلور

Derivative of the backward difference approximation .

From Taylor series

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)\Delta x + \frac{f''(x_i)}{2!}(\Delta x)^2 - \frac{f'''(x_i)}{3!}(\Delta x)^3 + \dots$$

$$\therefore f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x} + o(\Delta x)$$

واضح ان درجة الدقة تكون دالة في Δx لذلك فان الدقة تزداد بنقص Δx .

الحصول علي التفاضل الاول بدلالة الفرق المركزي باستخدام متسلسلة تايلور.

Central difference approximation of the first derivative.

نستخدم الفرق المركزي بدلا من الفرق الامامى او الفرق الخلفى وذلك للوصول الى دقة

اكبر في تعيين التفاضل عدديا.

من مفكوك تايلور نعلم انه في حالة الفروق الامامية:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(\Delta x) + \frac{f''(x_i)}{2!}(\Delta x)^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}(\Delta x)^3 + \dots \quad 1$$

كذلك, فى حالة الفروق الخلفية:

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)\Delta x + \frac{f''(x_i)}{2!}(\Delta x)^2 - \frac{f'''(x_i)}{3!}(\Delta x)^3 + \dots \quad 2$$

ب طرح المعادلة 2 من المعادلة 1

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = f'(x_i)(2\Delta x) + \frac{2f''(x_i)}{3!}(\Delta x)^3 + \dots$$

$$\therefore f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} + o(\Delta x)^2 \dots$$

تعتبر هذه المعادلة اكثر دقة فى حساب التفاضل الاول لان الخطأ دالة فى مربع

المسافة الصغيرة Δx .

مثال

إذا كانت سرعة صاروخ تعطي من العلاقة

$$V(t) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100t} \right] - 9.8 \quad 0 \leq t \leq 30$$

أحسب التفاضل الأول باستخدام الفروق المركزية عند $t = 16s$ ، مستخدماً فرق مقداره

$$\Delta t = 2s.$$

الحل:

$$\therefore f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x}$$

$$\therefore t_i = 16$$

$$\therefore \Delta t = 2$$

$$\therefore t_{i+1} = 18$$

$$\therefore t_{i-1} = 14$$


$$\therefore a(t) = \frac{v(18) - v(14)}{2 * 2}$$

$$v(18) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100(18)} \right] - 9.8(18) = 453.02 \text{ m/s}$$

$$v(14) = 2000 \ln \left[\frac{14 \times 10^4}{14 \times 10^4 - 2100(14)} \right] - 9.8(14) = 334.24 \text{ m/s}$$

$$\therefore a(16) = \left[\frac{453.02 - 334.24}{4} \right] = 29.659 \text{ m/s}^2$$

وهى قيمة أدق من تلك التي تم الحصول عليها باستخدام الفرق الامامى أو الفرق



الخلفي.

رسم توضيحي لحساب التفاضل الاول بدلالة الفرق المركزي

الباب الثانى

الفروق الأمامية

المشتقات بدلالة الفروق الأمامية

الفروق الأمامية بدلالة المشتقات

** الفروق الأمامية **


تستخدم الفروق الامامية عندما نتعامل مع بدايات متسلسلة البيانات. بفرض وجود قيم معلومة عند نقاط محددة للمتغير المستقل x_i [تسمى قيم x_i بالأدلة] ، كل قيمة يقابلها y_i كمتغير تابع . وبفرض أن الأدلة x_i علي أبعاد متساوية بحيث $x_{i+h} - x_i = h$ فإن فروق القيم الناتجة للمتغير التابع y_i تعطي من العلاقة :

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i \quad \rightarrow (1)$$

بوضع الصيغ التالية للتسهيل ،

$$y_{i+1} = y_r , y_{i+2} = y_{2r} , y_{i+3} = y_{3r} \dots$$

فإنه يمكن رسم العلاقة بين x_i , y_i في الصورة التالية :



لذلك تأخذ المعادلة (1) الصورة التالية :

$$\Delta y_i = y_r - y_i \quad \rightarrow (1)$$

وتسمى معادلة الفروق الأمامية الأولى .

نلاحظ أننا حسبنا الفروق الأمامية الأولى Δy_i بدلالة قيم المتغير التابع (y_i) ,

في هذه الحالة تعبر عن ترتيب الرقم في متسلسلة البيانات المعبرة عن النتائج .

فروق الفروق الأمامية الأولى تسمى بالفروق الأمامية الثانية وتحسب كالتالي :

$$\begin{aligned} \Delta^2 y_i &= \Delta(\Delta y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \\ &= \Delta y_r - \Delta y_i \\ &= (y_{2r} - y_r) - (y_r - y_i) \\ &= y_{2r} - y_r - y_r + y_i \\ &= y_{2r} - 2y_r + y_i \quad \rightarrow (3) \end{aligned}$$

كذلك يمكن حساب الفرق الأمامي الثالث :

$$\begin{aligned} \Delta^3 y_i &= \Delta(\Delta^2 y_i) \\ &= \Delta(y_{2r} - 2y_r + y_i) \\ &= \Delta y_{2r} - 2\Delta y_r + \Delta y_i \\ &= (y_{3r} - y_{2r}) - 2(y_{2r} - y_r) + (y_r - y_i) \\ &= y_{3r} - y_{2r} - 2y_{2r} + 2y_r + y_r - y_i \end{aligned}$$

$$\Delta^3 y_i = y_{3r} - 3y_{2r} + 3y_r - y_i \quad \rightarrow (4)$$

لا تنسى بأن $r = i + 1$ أو $i = r - 1$

وبالمثل، يمكن حساب الفرق الأمامي الرابع :

$$\begin{aligned}
 \Delta^4 y_i &= \Delta (\Delta^3 y_i) \\
 &= \Delta(y_{3r} - 3y_{2r} + 3y_r - y_i) \\
 &= \Delta y_{3r} - 3\Delta y_{2r} + 3\Delta y_r - \Delta y_i \\
 &= (y_{4r} - y_{3r}) - 3(y_{3r} - y_{2r}) + 3(y_{2r} - y_r) - (y_r - y_i) \\
 &= y_{4r} - y_{3r} - 3y_{3r} + 3y_{2r} + 3y_{2r} - 3y_r - y_r + y_i \\
 \Delta^4 y_i &= y_{4r} - 4y_{3r} + 6y_{2r} - 4y_r + y_i \quad \rightarrow (5)
 \end{aligned}$$

مما سبق يمكن وضع قانون عام لحساب الفرق النوني الأمامي عند أية نقطة

(i) في المتسلسلة وذلك علي الصورة التالية:

$$\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$$

فمثلاً يمكن إيجاد $\Delta^3 y_i$ وهو الفرق الثالث الأمامي عند النقطة i كالتالي :

$$\Delta^3 y_i = \Delta^2 y_{i+1} - \Delta^2 y_i \quad \rightarrow (1)$$

*بتطبيق القانون على الحد الاول من الطرف الايمن نجد

$$\Delta^2 y_{i+1} = \Delta y_{i+2} - \Delta y_{i+1} \dots\dots\dots *$$

** بتطبيق القانون على الحد الثاني من الطرف الايمن نجد

$$\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \dots\dots\dots **$$

من المعادلة (*) نحصل علي :

$$\Delta^2 y_{i+1} = (y_{i+3} - y_{i+2}) - (y_{i+2} - y_{i+1})$$

$$= y_{i+3} - y_{i+2} - y_{i+2} + y_{i+1}$$

$$= y_{i+3} - 2y_{i+2} + y_{i+1}$$

من المعادلة (**) نحصل علي :

$$\Delta^2 y_i = (y_{i+2} - y_{i+1}) - (y_{i+1} - y_i)$$

$$= y_{i+2} - y_{i+1} - y_{i+1} + y_i$$

$$= y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i$$

بالتعويض في معادلة (1) عن $\Delta^2 y_{i+1}$, $\Delta^2 y_i$ فإن :

$$\Delta^3 y_i = (y_{i+3} - 2y_{i+2} + y_{i+1}) - (y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i)$$

$$= y_{i+3} - 2y_{i+2} + y_{i+1} - y_{i+2} + 2y_{i+1} - y_i$$

$$= y_{i+3} - 3y_{i+2} + 3y_{i+1} - y_i$$

فإذا أردنا حساب الفرق الثالث عند النقطة $i = 0$ مثلاً وهي أول نقطة في

متسلسلة النتائج فإن :

$$\Delta^3 y_0 = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

وذلك بالتعويض عن $i = 0$ في $\Delta^3 y_i$ السابقة.

كذلك فإن الفرق الثالث عند النقطة الرابعة مثلاً $i = 3$ فإن

$$\Delta^3 y_3 = y_6 - 3y_5 + 3y_4 - y_3$$

كذلك فإن $\Delta^3 y_8$ عند النقطة التاسعة تكون

$$\Delta^3 y_8 = y_{11} - 3y_{10} + 3y_9 - y_8$$

وهكذا

مثال :

أثبت أن

$$\Delta^4 y_0 = y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0$$

الحل :

من التعريف

$$\Delta^4 y_0 = \Delta^3 y_1 - \Delta^3 y_0 \rightarrow (1)$$

وحيث أن $\Delta^3 y_0$ تم الحصول عليها وهي تساوي :

$$\Delta^3 y_0 = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

فإن $\Delta^3 y_1$ نكون لها نفس الصيغة بزيادة الأدلة السفلية (بتقدمها) بمقدار 1

$$\Delta^3 y_1 = y_4 - 3y_3 + 3y_2 - y_1$$

بالتعويض في (1)

$$\Delta^4 y_0 = y_4 - 3y_3 + 3y_2 - y_1 - y_3 - 3y_2 - 3y_1 + y_0$$

$$= y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0 \quad \text{وهو المطلوب ,,,}$$

مثال : لحساب الفروق الأمامية

بفرض أن لدينا المعادلة $y_n = n^2 - 3n - 2$ صالحة لقيم $n = 1, 2, 3, 4, \dots$

أوجد الفرق الأمامي الأول والفرق الأمامي الثاني عند $n = 3$

الحل :

لقيم $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ تكون y_n لها النتائج التالية

y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
-4	-4	-2	2	8

معادلة الفرق الأمامي الأول هي

$$\Delta y_i = y_r - y_i$$

$$\Delta y_3 = y_4 - y_3$$

$$= 2 - (-2)$$

$$= 4$$

معادلة الفرق الأمامي الثاني

$$\Delta^2 y_i = y_{2r} - 2y_r + y_i$$

$$\Delta^2 y_3 = y_5 - 2y_4 + y_3$$

$$= 8 - 2(2) + (-2) = 8 - 4 - 2 = 2$$

للتأكد من ذلك الحل نكتب متسلسلة النتائج ومتسلسلتين الفرق الأمامي الأول الثاني علي

الترتيب كالتالي :

y_1 y_2 y_3 y_4 y_5

-4 -4 -2 2 8 ال نتائج

0 2 4 6 فرق اامى اول

2 2 2 فرق اامى ثانى

منها يتضح أن الفرق الأمامي الأول عند y_3 هو

$$2 - (-2) = 4$$

وأن الفرق الأمامي الثاني عند y_3 هو

$$6 - 4 = 2$$

يمكن حساب الفروق الامامية الاول و الثانى والثالث و بواسطة القانوت العام

التالى:

$$\Delta^k y_i = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} y_{k-i}$$

يعطى هذا القانون الحد رقم i فى الفرق رقم k

أى ان k هى رتبة الفرق (الاول. الثانى, الثالث,) و i هى رتبة الحد داخله.

الحد $\binom{k}{i}$ عبارة عن $\frac{k^{(i)}}{i!}$ ويعطى كما فى الجدول التالى لقيم k من 1 الى 5, وقيم i

من 0 الى 5.

$i \backslash k$	0	1	2	3	4	5
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

مثلا

$$\frac{4^{(3)}}{3!} = \frac{4*3*2}{3*2*1} = 4, \dots, \frac{3^{(1)}}{1!} = \frac{3}{1} = 3, \dots, \frac{3^{(2)}}{2!} = \frac{3*2}{2*1} = 3$$

مثال: باستخدام القانون $\Delta^k y_i = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} y_{k-i}$ احسب الفرق الامامى الاول

$$\Delta y_i$$

نضع فى القانون $k=1$, i تتغير من 0 الى 1.

أولا: بوضع $i=0$, $k=1$

$$\therefore \Delta y_0 = (-1)^0 \binom{1}{0} y_{1-0} = y_1$$

ثم بوضع $i=1$, $k=1$

$$\therefore \Delta y_1 = (-1)^1 \binom{1}{1} y_0 = -y_0$$

بجمع المعادلتين السابقتين،

$$\therefore \Delta y_i = y_1 - y_0$$

وهو الفرق الامامى الاول.

الفرق الامامى الثانى

لحساب الفرق الامامى الثانى، يأخذ القانون العام الصورة التالية:

$$\Delta^2 y_i = \sum_{i=0}^2 (-1)^i \binom{2}{i} y_{2-i}$$

بوضع $i=0$ يكون

$$\Delta^2 y_0 = (-1)^0 \binom{2}{0} y_{2-0} = y_2$$

بوضع $i=1$ يكون

$$\Delta^2 y_1 = (-1)^1 \binom{2}{1} y_{2-1} = -2y_1$$

بوضع $i=2$ يكون

$$\Delta^2 y_2 = (-1)^2 \binom{2}{2} y_{2-2} = y_0$$

بجمع الثلاث معادلات السابقة نحصل على

$$\Delta^2 y_i = y_2 - 2y_1 + y_0$$

بنفس الكيفية يمكن حساب الفرق الامامي الثالث

حيث يأخذ القانون العام الصورة التالية:

$$\Delta^3 y_i = \sum_{i=0}^3 (-1)^i \binom{3}{i} y_{3-i}$$

بوضع $i=0$ نحصل على

$$\Delta^3 y_0 = (-1)^0 \binom{3}{0} y_{3-0} = y_3$$

بوضع $i=1$ نحصل على

$$\Delta^3 y_1 = (-1)^1 \binom{3}{1} y_{3-1} = -3y_2$$

بوضع $i=2$ نحصل على

$$\Delta^3 y_2 = (-1)^2 \binom{3}{2} y_{3-2} = 3y_1$$

بوضع $i=3$ نحصل على

$$\Delta^3 y_3 = (-1)^3 \binom{3}{3} y_{3-3} = -y_0$$

بجمع الاربع معادلات السابقة

$$\therefore \Delta^3 y_i = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

كذلك يمكن حساب الفرق الرابع الأمامي.

حيث يأخذ القانون العام الصورة التالية:

$$\Delta^4 y_i = \sum_{i=0}^4 (-1)^i \binom{4}{i} y_{4-i}$$

بوضع $i=0$ نحصل على

$$\Delta^4 y_0 = (-1)^0 \binom{4}{0} y_{4-0} = y_4$$

بوضع $i=1$ نحصل على

$$\Delta^4 y_1 = (-1)^1 \binom{4}{1} y_{4-1} = -4y_3$$

بوضع $i=2$ نحصل على

$$\Delta^4 y_2 = (-1)^2 \binom{4}{2} y_{4-2} = 6y_2$$

بوضع $i=3$ نحصل على

$$\Delta^4 y_3 = (-1)^3 \binom{4}{3} y_{4-3} = -\frac{24}{6} y_1 = -4y_1$$

بوضع $i=4$ نحصل على

$$\Delta^4 y_4 = (-1)^4 \binom{4}{4} y_{4-4} = y_0$$

بجمع المعادلات الخمس السابقة, نحصل على

$$\Delta^4 y_i = y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0$$

يمكن ان يأخذ القانون السابق الشكل التالي لحساب الفرق الامامى

$$\Delta^k y_i = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} y_{i+k-m}$$

////////////////////////////////////

حيث i تعبر عن رقم الحد في متسلسلة البيانات الاصلية المراد حساب الفرق الامامى عنده ويمكن ان تأخذ القيم 0، 1، 2.... للحد الاول ، الثانى ، الثالث على الترتيب. K تعبر عن رتبة الفرق الامامى وتأخذ القيم 1، 2، 3، للفرق الامامى الاول ، الثانى ، الثالث، ... وهكذا.

m رقم الحد فى معادلة الفرق الناتجة وتأخذ القيم من 0 الى $k+1$.

وبالتالى فإنه للفرق الامامى الاول يكون لدينا

$$k=1$$

$$m=0, 1$$

فيكون الحد الاول من قانون الفرق الاول نحصل عليه بوضع $m=0$ و $k=1$

$$\Delta y_i = (-1)^0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} y_{i+1-0}$$

$$= \Delta y_i = 1 * 1 * y_{i+1} = y_{i+1}$$

ويكون الحد الثانى من قانون الفرق الاول نحصل عليه بوضع $m=1$ و $k=1$

$$\Delta y_i = (-1)^1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} y_{i+1-1}$$

$$\Delta y_i = -1 * 1 * y_i = -y_i$$

فيكون قانون الفرق الامامى الاول هو مجموع الحدين السابقين

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$$

قانون الفرق الامامى الثانى

فى هذه الحالة يتم وضع $k=2$ وبالتالى تكون $m=0, 1, 2$

نحصل على الحد الاول بوضع $m=0$ فى القانون

$$\Delta^2 y_i = \sum_m^2 (-1)^m \binom{2}{m} y_{i+2-m}$$

نحصل على الحد الاول بوضع $m=0$ فى القانون فيأخذ الصورة التالية

$$\Delta^2 y_i = (-1)^0 \binom{2}{0} y_{i+2-0} = 1 * 1 * y_{i+2} = y_{i+2}$$

بوضع $m=1$ نحصل على الحد الثانى

$$\Delta^2 y_i = (-1)^1 \binom{2}{1} y_{i+2-1} = -1 * 2 * y_{i+1} = -2y_{i+1}$$

بوضع $m=2$ نحصل على الحد الثالث

$$\Delta^2 y_i = (-1)^2 \binom{2}{2} y_{i+2-2} = 1 * 1 * y_{i+2-2} = y_i$$

$$\Delta^2 y_i = y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i$$

$$\Delta^2 y_i = y_{2r} - 2y_r + y_i$$

الفروق الامامية بدلالة المشتقات

تنص نظرية تايلور علي أنه في حالة معرفة قيمة دالة $y = f(x)$ وكل مشتقاتها عند نقطة x بشرط أن تكون الدالة و المشتقات متصلة ما بين x , h فإن قيمة الدالة عند $(x + h)$ تعطي من :

$$y(x+h) = y(x) + hDy(x) + \frac{h^2}{2i} D^2 y(x) + \frac{h^3}{3i} D^3 y(x) + \dots + \frac{h^n}{ni} D^n y(x)$$

$$D = \frac{d}{dx} \quad \text{حيث}$$

$$\therefore y(x+h) = y(x) \left[1 + hD + \frac{h^2}{2i} D^2 + \dots + \frac{h^n}{ni} D^n \right]$$

$$\therefore y(x+h) = y(x)e^{hD} \quad \rightarrow (1)$$

حيث المؤثر :

$$e^{hD} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} h^i D^i$$

وحيث أن

$$\begin{array}{l} y_x \quad \text{at} \quad y_i \\ y(x+h) \quad \text{at} \quad y_r \end{array}$$

فإن الفرق الأمامي الأول

$$\begin{aligned} \Delta y_i &= y_r - y_i \\ &= y(x+h) - y_x \\ &= y_x e^{hD} - y_x \\ &= y_x (e^{hD} - 1) \end{aligned}$$

$$\Delta y_i = y_i (e^{hD} - 1)$$

$$\Delta = e^{hD} - 1 \quad \rightarrow (1)$$

الفرق الأمامي الثاني بدلالة المشتقات

$$\begin{aligned}\Delta^2 &= \Delta \cdot \Delta \\ &= (e^{hD} - 1)^2 \\ &= e^{2hD} - 2e^{hD} + 1 \quad \rightarrow (2)\end{aligned}$$

الفرق الأمامي الثالث بدلالة المشتقات

$$\Delta^3 = \Delta(\Delta^2)$$

بالتعويض عن Δ , Δ^2 من (1), (2)

$$\begin{aligned}\Delta^3 &= (e^{hD} - 1)(e^{2hD} - 2e^{hD} + 1) \\ &= e^{3hD} - 2e^{2hD} + e^{hD} - e^{2hD} + 2e^{hD} - 1 \\ &= e^{3hD} - 3e^{2hD} + 3e^{hD} - 1 \quad \rightarrow (3)\end{aligned}$$

المشتقات بدلالة الفروق الأمامية



المشتقة الأمامية الأولى

$$\because \Delta = e^{hD} - 1$$

$$\therefore e^{hd} = \Delta + 1$$

بأخذ ln للطرفين

$$\therefore hD = \ln(\Delta + 1)$$

$$\therefore hD = \Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} + \dots \rightarrow 1$$

المشتقة الثانية بدلالة الفروق :

$$(hD)^2 = hD * hD$$

$$= \left(\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} \right) \left(\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} \right)$$

بضرب الحدين معاً

$$\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4}$$

*

$$\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4}$$

$$\Delta^2 - \frac{\Delta^3}{2} + \frac{\Delta^4}{3} - \frac{\Delta^5}{4}$$

$$\frac{-\Delta^3}{2} + \frac{\Delta^4}{4} - \frac{\Delta^5}{6} + \frac{\Delta^6}{8}$$

$$\frac{\Delta^4}{3} - \frac{\Delta^5}{6} + \frac{\Delta^6}{9} - \frac{\Delta^7}{12}$$

$$\frac{-\Delta^5}{4} + \frac{\Delta^6}{8} - \frac{\Delta^7}{12} + \frac{\Delta^8}{16}$$

بالجمع _____

$$\Delta^2 - \frac{2\Delta^3}{2} + \frac{11\Delta^4}{12} - \frac{20\Delta^5}{24} + \frac{26\Delta^6}{72} - \frac{2\Delta^7}{12} + \frac{\Delta^8}{16}$$

صيغ الفروق

~~~~~

يوجد العديد من صيغ الفروق للدوال سوف ندرس منها :

1- فرق الدالة الثابتة يساوي أصفاراً :

$$\Delta C = 0$$

أثبت أنه للدالة الثابتة تكون جميع الفروق أصفاراً

نفرض أن  $y_i = c$  لجميع قيم  $i$  وهذه دالة ثابتة ، وبالتالي يكون :

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i = c - c = 0$$

2- بفرض أن  $c$  مقدار ثابت فإن :

$$\Delta (cy_i) = c\Delta y_i$$

ولإثبات :

$$\Delta (cy_i) = cy_{i+1} - cy_i = c [y_{i+1} - y_i] = c\Delta y_i$$

3- الخاصية الخطية :

بفرض وجود دالتين معرفتين لنفس الفئة للأدلة  $x_i$  وأن قيم هاتين الدالتين هي

$u_i$  ،  $v_i$  وباعتبار دالة ثالثة نأخذ القيم التالية :

$$W_i = c_1 u_i + c_2 v_i$$

حيث  $c_1$  ،  $c_2$  ثابتان مستقلان عن  $x_i$  ، أثبت أن :

$$\Delta w_i = c_1 \Delta u_i + c_2 \Delta v_i$$

البرهان من التعريفات :

$$\Delta w_i = w_{i+1} - w_i$$

$$= (c_1 u_{i+1} + c_2 v_{i+1}) - (c_1 u_i + c_2 v_i)$$

$$= c_1 (u_{i+1} - u_i) + c_2 (v_{i+1} - v_i)$$

$$= c_1 \Delta u_i + c_2 \Delta v_i \quad \text{وهو المطلوب}$$

4- الفروق لحاصل ضرب الدالتين تعطي بالصيغة

$$\Delta (u_i v_i) = u_i \Delta v_i + v_{i+1} \Delta u_i$$

البرهان

باعتبار الدالتين معرفتين لنفس الفئة من الأدلة  $x_i$  وأن قيم هاتين الدالتين  $u_i$  ,  $v_i$

ونعتبر دالة  $z_i = u_i v_i$  فإنه :

من التعريف

$$\Delta z_i = u_{i+1} v_{i+1} - u_i v_i$$

بطرح وإضافة الحد  $u_i v_{i+1}$  للطرف الأيمن

$$\Delta z_i = u_{i+1} v_{i+1} - u_i v_{i+1} + u_i v_{i+1} - u_i v_i$$

$$= v_{i+1} (u_{i+1} - u_i) + u_i (v_{i+1} - v_i)$$



$$= u_i \Delta v_i + v_{i+1} \Delta u_i \quad \text{وهو المطلوب}$$

يمكن البرهنة علي النتيجة

$$\Delta z_i = u_{i+1} \Delta v_i + v_i \Delta u_i$$

وذلك بإضافة وطرح  $u_{i+1} v_i$  للطرف الأيمن

\*\*\*\* تمارين \*\*\*\*

تمرين (1)

1- أحسب إلي الفروق الرابعة للقيم  $y_k$  الآتية [ يمكن اعتبار أن  $x_k = k$  ]

|       |   |   |    |    |     |     |      |
|-------|---|---|----|----|-----|-----|------|
| k     | 0 | 1 | 2  | 3  | 4   | 5   | 6    |
| $y_k$ | 0 | 1 | 16 | 81 | 256 | 625 | 1296 |

الحل :

يمكن وضع الجدول والفروق في الصورة التالية :

| k | $y_k$ | $\Delta y_k$ | $\Delta^2 y_k$ | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|---|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0     |              |                |                |                |
| 1 | 1     | 1            |                |                |                |
| 2 | 16    | 15           | 14             |                |                |

|   |      |     |     |     |    |
|---|------|-----|-----|-----|----|
| 3 | 81   | 65  | 50  | 36  |    |
| 4 | 256  | 175 | 110 | 60  | 24 |
| 5 | 625  | 369 | 194 | 84  | 24 |
| 6 | 1296 | 671 | 302 | 108 | 24 |

واضح أن الفروق تصل إلي الثبات في المرحلة الرابعة وأن الفروق التي فوقها

تكون أصفار

تمرين (2)

مستخدما العلاقة التالية:

$$\Delta^k Y_i = \sum_{i=0}^k -1^i \binom{k}{i} y_{k-i}$$

أثبت أن

$$\Delta^5 y_i = y_5 - 5y_4 + 10y_3 - 10y_2 + 5y_1 - y_0$$

الحل

بوضع  $i = 0$  في التعريف

$$\therefore \Delta^5 y_0 = (-1)^0 \binom{5}{0} y_{5-0} = y_5 \rightarrow (1)$$

بوضع  $i = 1$

$$\Delta^5 y_1 = (-1)^1 \binom{5}{1} y_{5-1} = -5y_4 \rightarrow (2)$$

بوضع  $i = 2$

$$\Delta^5 y_2 = (-1)^2 \binom{5}{2} y_{5-2} = 10y_3 \rightarrow (3)$$

بوضع  $i = 3$

$$\Delta^5 y_3 = (-1)^3 \binom{5}{3} y_{5-3} = -10y_2 \rightarrow (4)$$

بوضع  $i = 4$

$$\Delta^5 y_4 = (-1)^4 \binom{5}{4} y_{5-4} = 5y_1 \rightarrow (5)$$

بوضع  $i = 5$

$$\Delta^5 y_5 = (-1)^5 \binom{5}{5} y_0 = -y_0 \rightarrow (6)$$

بجمع النتائج من (1) حتى (6) يكون

$$\Delta^5 y_i = y_5 - 5y_4 + 10y_3 - 10y_2 + 5y_1 - y_0$$

وهو المطلوب ....

**تمرين (3)**

أثبت أنه إذا كانت  $y_k = k^4$  فإن  $\Delta^4 y_k = 24$

الحل :

$$Y_k = k^4$$

$$\Delta y_k = 4k^3, \Delta^2 y_k = 12k^2, \Delta^3 y_k = 24k, \Delta^4 y_k = 24$$

وهو المطلوب :

تمرين (4)

باستخدام القيم للفروق الأولى المعطاة ، أحسب القيم المحترفة

|              |   |     |     |     |     |     |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| $y_k$        | 0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| $\Delta y_k$ | 1 | 2   | 4   | 7   | 11  | 18  |

الحل

|              |   |   |   |   |    |    |    |
|--------------|---|---|---|---|----|----|----|
| $y_k$        | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | 43 |
| $\Delta y_k$ | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 |    |

تمرين (5)

بتقدم جميع الأدلة في الصيغة

$$\Delta^2 y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

أكتب مفكوكاً مماثلاً لكل من  $\Delta^2 y_2, \Delta^2 y_1$  ثم أحسب حاصل الجمع للفروق الثلاثة هذه.

الحل

$$\Delta^2 y_1 = y_3 - 2y_2 + y_1$$

$$\Delta^2 y_2 = y_4 - 2y_3 + y_2$$

حاصل الجمع للفروق التالية كلها يكون

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_0 + \Delta^2 y_1 + \Delta^2 y_2 &= y_2 - 2y_1 + y_0 + y_3 - 2y_2 + y_1 + y_4 - 2y_3 + y_2 \\ &= -y_1 + y_0 - y_3 + y_4 = y_4 - y_3 - y_1 + y_0\end{aligned}$$

وهو الحل .....

الفروق الخلفية

الفروق الخلفية بدلالة المشتقات

المشتقات بدلالة الفروق الخلفية

# الفروق الخلفية



نحتاج للتعامل مع الفروق الخلفية عندما نتعامل مع نهاية متسلسلة البيانات. فإذا

فرضنا أنه لكل قيمة  $x_i$  توجد قيمة  $y_i$  للمتغير التابع, وبفرض ان الادلة  $x_i$  تكون علي

ابعاد متساوية بحيث  $x_i - x_{i-1} = h$  فإن الفروق للقيم الناتجة للمتغير التابع  $y_i$  تعطي

من :


$$\nabla y_i = y_i - y_{i-1} \quad \rightarrow (1)$$

ويسمى هذا بالفارق الخلفي الأول

بوضع الصبغ التالية للتسهيل

$$y_{i-1} = y_L, y_{i-2} = y_{2L}, y_{i-3} = y_{3L}, \dots$$

فإنه يمكن رسم العلاقة بين  $x_i$  ،  $y_i$  كالتالي :



لذلك نأخذ المعادلة (1) الصورة التالية :

$$\nabla y_i = y_i - y_L \quad \rightarrow (2)$$

وتسمى معادلة الفرق الخلفي الأولي.  $i$ ، كما في الفروق الأمامية السابق

الحديث عنها، تعبر عن ترتيب الرقم في متسلسلة النتائج .

فروق الفروق الخلفية الأولى تسمى بالفروق الخلفية الثانية :

$$\begin{aligned} \nabla^2 y_i &= \nabla (\nabla y_i) \\ &= \nabla (y_i - y_L) \\ &= \nabla y_i - \nabla y_L \\ &= (y_i - y_L) - (y_L - y_{2L}) \\ &= y_i - y_L - y_L + y_{2L} \\ &= y_i - 2y_L + y_{2L} \quad \rightarrow (3) \end{aligned}$$

يلاحظ أن :  $L = i - 1$  ,  $2L = i - 2$  ,  $3L = i - 3$  , .....

كذلك يمكن حساب الفرق الخلفي الثالث

$$\nabla^3 y_i = \nabla (\nabla^2 y_i)$$



$$\begin{aligned}
&= \nabla (y_i - 2y_L + y_{2L}) \\
&= \nabla y_i - 2\nabla y_L + \nabla y_{2L} \\
&= (y_i - y_L) - 2(y_L - y_{2L}) + (y_{2L} - y_{3L}) \\
&= y_i - y_L - 2y_L + 2y_{2L} + y_{2L} - y_{3L} \\
&= y_i - 3y_L + 3y_{2L} - y_{3L} \quad \rightarrow (4)
\end{aligned}$$

**كذلك يمكن حساب الفرق الخلفي الرابع :**

$$\begin{aligned}
\nabla^4 y_i &= \nabla (\nabla^3 y_i) \\
&= \nabla (y_i - 3y_L + 3y_{2L} - y_{3L}) \\
&= \nabla y_i - 3\nabla y_L + 3\nabla y_{2L} - \nabla y_{3L} \\
&= (y_i - y_L) - 3(y_L - y_{2L}) + 3(y_{2L} - y_{3L}) - (y_{3L} - y_{4L}) \\
&= y_i - y_L - 3y_L + 3y_{2L} + 3y_{2L} - 3y_{3L} - y_{3L} - y_{4L} \\
&= y_i - 4y_L + 6y_{2L} - 4y_{3L} + y_{4L} \quad \rightarrow (5)
\end{aligned}$$

**أمثلة علي حساب الفروق الخلفية :**

$$y_n = n^2 - 3n - 2 \quad \text{بفرض أن لدينا المعادلة}$$

صالحة لقيم  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$  ، أوجد الفرق الخلفي الأول والفرق الخلفي

الثاني عند  $n = 3$

## المحل :

للقيم  $n = 1, 2, 3, 4, 5$  تكون النتائج  $y_n$  لها المتسلسلة التالية :

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ | $y_5$ |
| -4    | -4    | -2    | 2     | 8     |

معادلة الفرق الخلفي الأول هي

$$\begin{aligned}\nabla y_i &= y_i - y_L \\ &= y_3 - y_2 \\ &= -2 - (-4) \\ &= 2\end{aligned}$$

معادلة الفرق الخلفي الثاني هي

$$\begin{aligned}\nabla^2 y_i &= y_i - 2y_L + y_{2L} \\ &= y_3 - 2y_2 + y_1 \quad , \text{حيث } i=3, L = i-1 = 2, 2L = i-2 = \\ &1 \\ &= -2 - 2(-4) + (-4) \\ &= -2 + 8 - 4 \\ &= 2\end{aligned}$$

للتأكد من ذلك نكتب متسلسلة النتائج ومتسلسلة الفروق الخلفية الأولى ثم

متسلسلة الفروق الخلفية الثانية كالتالي

|       |       |       |       |       |                  |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ | $y_5$ |                  |
| -4    | -4    | -2    | 2     | 8     | <b>النتائج</b>   |
|       | 0     | 2     | 4     | 6     | فروق خلفية أولى  |
|       |       | 2     | 2     | 2     | فروق خلفية ثانية |

منها يتضح أن الفرق الخلفي الأول عند  $y_3$  هو

$$-2 - (-4) = -2 + 4 = 2$$

وأن الفرق الخلفي الثاني عند  $y_3$  هو

$$2 - 0 = 2$$

استنتاج صيغ الفروق الخلفية من القانون:

$$\nabla^k y_i = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} y_{i-m}$$

حيث  $i$  تعبر عن رقم الحد في متسلسلة البيانات الاصلية المراد حساب الفرق الخلفى عنده ويمكن ان تأخذ القيم 0، 1، 2.... للحد الاول ، الثانى ، الثالث .....على الترتيب.  
 $K$  تعبر عن رتبة الفرق الخلفى وتأخذ القيم 1، 2، 3، .... للفرق الخلفى الاول ، الثانى ، الثالث، ... وهكذا.

$m$  رقم الحد فى معادلة (صيغة) الفرق الناتجة وتأخذ القيم من 0 الى  $k+1$  .

مثال 1 : استنتاج صيغة الفرق الخلفى الاول من العلاقة  $\nabla^k y_i = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} y_{i-m}$

الحل:

حيث ان المطلوب هو استنتاج صيغة الفرق الخلفى الاول، فإن  $k=1$  وبالتالي فإن  $m$  تأخذ القيم 0، 1.

بالتعويض عن  $k=1$  و  $m=0$  فى العلاقة  $\nabla^k y_i = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} y_{i-m}$

فإن

$$\nabla y_i = (-1)^0 \binom{1}{0} y_{i-0} = 1 * 1 * y_i = y_i$$

بالتعويض عن  $k=1$  و  $m=1$  نحصل على

$$\nabla y_i = (-1)^1 \binom{1}{1} y_{i-1} = -1 * 1 * y_{i-1} = -y_{i-1}$$

وبالتالى تكون الصيغة النهائية للفرق الخلفى الاول كالتالى:

$$\nabla y_i = y_i - y_{i-1}$$

ويمكن ان تكتب فى الصورة:

$$\nabla y_i = y_i - y_L$$

مثال 2

$$\nabla^k y_i = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} y_{i-m} \quad \text{استنتج صيغة الفرق الخلفى الثانى من العلاقة}$$

**الحل:**

حيث ان المطلوب هو استنتاج صيغة الفرق الخلفى الثانى، فإن  $k=2$  وبالتالى فإن  $m$  تأخذ القى 0، 1، 2.

$$\text{بالتعويض عن } k=2 \text{ و } m=0 \text{ فى العلاقة } \nabla^k y_i = \sum_{m=0}^k (-1)^m \binom{k}{m} y_{i-m} \text{ نحصل على:}$$

$$\nabla^2 y_i = (-1)^0 \binom{2}{0} y_{i-0} = y_i$$

بالتعويض عن  $k=2$  و  $m=1$

$$\nabla^2 y_i = (-1)^1 \binom{2}{1} y_{i-1} = -2y_{i-1}$$

بالتعويض عن  $k=2$  و  $m=2$

$$\nabla^2 y_i = (-1)^2 \binom{2}{2} y_{i-2} = y_{i-2}$$

$$\therefore \nabla^2 y_i = y_i - 2y_{i-1} + y_{i-2}$$

والتي يمكن ان تكتب فى الصورة

$$\nabla^2 y_i = y_i - 2y_L + y_{2L}$$

✓

## \* الفروق الخلفية بدلالة المشتقات \*

من مفكوك تايلور نعلم ان

$$\therefore y(x+h) = y(x)e^{hD} \rightarrow (1)$$

وإذا أخذنا  $h$  كقيمة سالبة  $-h$  فإن


$$y(x-h) = y(x)e^{-hD} \rightarrow (2)$$

المعادلتين (1) ، (2) تعبر عن مفكوك تايلور للدالة  $y(x)$  عند قيمة  $+h$  وقيمة  $-h$

قبل وبعد  $x$  أي في حالة الفرق الأمامي والخلفي.

التعبير عن الفرق الخلفي الأول عند  $y_i$  بدلالة المشتقات

\*\*\* ~~~~~ \*\*\*



يعبر عن الفرق الخلفي الأول في الصورة التالية

$$\begin{aligned}\nabla y_i &= y_i - y_L \\ &= y_x - y(x - h)\end{aligned}$$

بالتعويض عن  $y(x - h)$  من مفكوك تايلور

$$\begin{aligned}&= y_x - e^{-hD} y(x) \\ &= y_x (1 - e^{-hD}) \\ \nabla y_i &= y_i (1 - e^{-hD})\end{aligned}$$

الفرق الأول

$$\nabla = 1 - e^{-hD}$$

الفرق الخلفي الثاني

$$\begin{aligned}\nabla^2 y_i &= \nabla (y_i - y_L) \\ &= \nabla [y_x - y(x - h)] \\ &= \nabla [y_x - y_x e^{-hD}] \\ &= \nabla y_x [1 - e^{-hD}] \\ \nabla^2 y_i &= \nabla y_i [1 - e^{-hD}]\end{aligned}$$



$$\nabla^2 = \nabla [1 - e^{-hD}]$$

بالتعويض من  $\nabla$  من الحالة السابقة

$$\nabla^2 = (1 - e^{-hD})(1 - e^{-hD}) = 1 - 2e^{-hD} + e^{-2hD}$$

$$\begin{aligned} \text{or} &= \left[ 1 - \left( 1 - hD + \frac{h^2 D^2}{2!} - \frac{h^3 D^3}{3!} + \dots \right) \right] \left[ 1 - \left( 1 - hD + \frac{h^2 D^2}{2!} - \frac{h^3 D^3}{3!} + \dots \right) \right] \\ &= \left( 1 - 1 + hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!} \right) \left( 1 - 1 + hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!} \right) \\ &= \left( hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!} \right) \left( hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!} \right) \end{aligned}$$

بضرب القوسين معاً :

$$hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!}$$

$$hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!}$$


---

$$h^2 D^2 - \frac{h^3 D^3}{2!} + \frac{h^4 D^4}{3!}$$

$$- \frac{h^3 D^3}{2!} + \frac{h^4 D^4}{2!.2!} - \frac{h^5 D^5}{2!.3!}$$

$$\frac{h^4 D^4}{3!} - \frac{h^5 D^5}{2!.3!} + \frac{h^6 D^6}{3!.3!}$$

بالجمع \_\_\_\_\_

$$h^2 D^2 - \frac{2h^3 D^3}{2!} + \frac{14h^4 D^4}{24} - \dots$$

$$\therefore \nabla^2 = h^2 D^2 - h^3 D^3 + \frac{7h^4 D^4}{12} - \dots$$

### الفرق الخلفي الثالث بدلالة المشتقات

$$\nabla^3 y_i = \nabla (\nabla^2)$$

$$= \left( hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!} \right) \left( h^2 D^2 - h^3 D^3 + \frac{7}{12} h^4 D^4 \right)$$

بضرب القوسين معاً :

$$h^2 D^2 - h^3 D^3 + \frac{7}{12} h^4 D^4$$

$$hD - \frac{h^2 D^2}{2!} + \frac{h^3 D^3}{3!}$$


---

$$\begin{aligned}
& h^3 D^3 - h^4 D^4 + \frac{7}{12} h^5 D^5 \\
& - \frac{h^4 D^4}{2!} + \frac{h^5 D^5}{2!} - \frac{7}{12} \frac{h^6 D^6}{2!} \\
& \frac{h^5 D^5}{3!} - \frac{h^6 D^6}{3!} + \frac{7}{12} \frac{h^7 D^7}{3!}
\end{aligned}$$


---

$$\begin{aligned}
& = h^3 D^3 - \frac{3}{2} h^4 D^4 + \left( \frac{7h^5 D^5 + 6h^5 D^5 + 2h^5 D^5}{12} \right) - \left( \frac{7h^6 D^6 + 4h^6 D^6}{24} \right) + \dots \\
\therefore \nabla^3 & = h^3 D^3 - \frac{3}{2} h^4 D^4 + \frac{5}{4} h^5 D^5 - \frac{11}{24} h^6 D^6 \rightarrow
\end{aligned}$$

## المشتقات بدلالة الفروق الخلفية

اثبتنا ان

$$\nabla = 1 - e^{-hD}$$

$$\therefore e^{-hD} = 1 - \nabla$$

$$\therefore \ln(e^{-hd}) = \ln(1 - \nabla)$$

$$\therefore -hD = \ln(1 - \nabla)$$

وحيث ان مفكوك:

$$\ln(1 - x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots$$

$$\therefore -hD = -\left(\nabla + \frac{\nabla^2}{2} + \frac{\nabla^3}{3} + \frac{\nabla^4}{4}\right)$$

$$\therefore hD = \nabla + \frac{\nabla^2}{2} + \frac{\nabla^3}{3} + \frac{\nabla^4}{4} \quad \text{وهي معادلة تعبر عن المشتقة الاولى بدلالى الفروق}$$

الخلفية

كذلك يمكن اثبات ان المشتقة الثانية بدلالة الفروق الخلفية تكون فى الصورة:

$$h^2D^2 = \nabla^2 + \nabla^3 + \frac{11}{12}\nabla^4$$

و المشتقة الثالثة بدلالة الفروق الخلفية تكون فى الصورة:

$$h^3 D^3 = \nabla^3 + \frac{3}{2} \nabla^4 + \frac{7}{4} \nabla^5$$

و المشتقة الرابعة بدلالة الفروق الخلفية تكون فى الصورة:

$$h^4 D^4 = \nabla^4 + 2\nabla^5 + \frac{17}{6} \nabla^6$$

**الفروق المركزية**

**الفروق المركزية بدلالة المشتقات**


**القيمة المتوسطة للدالة**

**الفروق المركزية**

**الاختلافات المركزية المتوسطة**



## الفروق المركزية (الاختلافات المركزية المتوسطة)



الفروق المركزي الأول :

$$\delta y_i = y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i-\frac{1}{2}} \rightarrow \textcircled{6}$$

الفروق المركزي الثاني :

$$\begin{aligned} \delta^2 y_i &= \delta(\delta y_i) \\ &= \delta(y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i-\frac{1}{2}}) \\ &= \delta y_{i+\frac{1}{2}} - \delta y_{i-\frac{1}{2}} \rightarrow \textcircled{7} \\ &= y_r - y_i - (y_i - y_L) \\ &= y_r - 2y_i + y_L \end{aligned}$$

### الفرق الثالث :

$$\begin{aligned}
 \delta^3 y_i &= \delta(\delta^2 y_i) \\
 &= \delta(y_{r+1/2} - 2y_i + y_{L-1/2}) \\
 &= \delta y_{r+1/2} - 2\delta y_i + \delta y_{L-1/2} \\
 &= \left( y_{r+1/2} - y_{i+1/2} \right) - 2 \left( y_{i+1/2} - y_{i-1/2} \right) + \left( y_{i-1/2} - y_{L-1/2} \right) \rightarrow \textcircled{8} \\
 &= y_{r+1/2} - y_{i+1/2} - 2y_{i+1/2} + 2y_{i-1/2} + y_{i-1/2} - y_{L-1/2} \\
 &= y_{r+1/2} - 3y_{i+1/2} + 3y_{i-1/2} - y_{L-1/2}
 \end{aligned}$$

بالمثل يمكن حساب الفرق المركزي الرابع ، الخامس ، .....

### استنتاج صيغ الفروق المركزية

يمكن استنتاج صيغ الفروق المركزية من العلاقات التالية:

أولاً: صيغ الفروق المركزية ذات الرتب الزوجية (الفرق الثاني، الفرق الرابع، الفرق

السادس، ....)

تستنتج صيغ الفروق المركزية ذات الرتب الزوجية من العلاقة التالية:



$$\delta^{2k} y_i = \sum_m^{2k} (-1)^m \binom{2k}{m} y_{i+k-m}$$

حيث  $i$  تعبر عن رقم الحد في متسلسلة البيانات الاصلية المراد حساب الفرق المركزي عنده ويمكن ان تأخذ القيم 0، 1، 2... للحد الاول، الثاني، الثالث..... على الترتيب.  $K$  تعبر عن رتبة الفرق المركزي وتأخذ القيم 1، 2، 3، .... للفرق المركزي الاول، الثاني، الثالث، ... وهكذا.

$m$  رقم الحد في معادلة (صيغة) الفرق الناتجة وتأخذ القيم من 0 الى  $2k$ .

مثال 1:

$$\delta^{2k} y_i = \sum_m^{2k} (-1)^m \binom{2k}{m} y_{i+k-m} \quad \text{استنتج صيغة الفرق المركزي الثاني من العلاقة}$$

الحل: لحساب الفرق المركزي الثاني يتم وضع  $k=1$  وبالتالي  $m$  تأخذ القيم 0، 1، 2.

نحصل على العلاقات التالية:

بوضع  $k=1$  و  $m=0$

$$\delta^2 y_i = (-1)^0 \binom{2}{0} y_{i+1-0} = y_{i+1}$$

بوضع  $k=1$  و  $m=1$

$$\delta^2 y_i = (-1)^1 \binom{2}{1} y_{i+1-1} = -2y_i$$

بوضع  $k=1$  و  $m=2$

$$\delta^2 y_i = (-1)^2 \binom{2}{2} y_{i+1-2} = y_{i-1}$$

$$\therefore \delta^2 y_i = y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}$$

$$\delta^2 y_i = y_r - 2y_i + y_L$$

وبنفس الطريقة يمكن استنتاج صيغة الفرق المركزي الرابع والسادس و...

ثانياً: صيغ الفروق المركزية ذات الرتب الفردية (الفرق الاول، الفرق الثالث، الفرق

الخامس، ....)

تستنتج صيغ الفروق المركزية ذات الرتب الفردية من العلاقة التالية:

$$\delta^{2k+1} y_{i+\frac{1}{2}} = \sum_m^{2k+1} (-1)^m \binom{2k+1}{m} y_{i+k+1-m}$$

مثال:

$$\delta^{2k+1} y_{i+\frac{1}{2}} = \sum_m^{2k+1} (-1)^m \binom{2k+1}{m} y_{i+k+1-m} \text{ استنتج صيغة الفرق المركزي الاول من العلاقة}$$

الحل: لحساب الفرق المركزي الاول يتم وضع  $k=0$  وبالتالي  $m$  تأخذ القيم 0، 1.

نحصل على العلاقات التالية:

بوضع  $k=0$  و  $m=0$ .

$$\delta y_{i+\frac{1}{2}} = (-1)^0 \binom{1}{0} y_{i+0+1-0} = y_{i+1}$$

بوضع  $k=0$  و  $m=1$ .

$$\delta y_{i+\frac{1}{2}} = (-1)^1 \binom{1}{1} y_{i+0+1-1} = -y_i$$

بجمع الحدين السابقين

$$\therefore \delta y_{i+\frac{1}{2}} = y_{i+1} - y_i$$

بطرح  $\frac{1}{2}$  من الأدلة

$$\therefore \delta y_i = y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i-\frac{1}{2}}$$

مثال:

$$\delta^{2k+1} y_{i+\frac{1}{2}} = \sum_m^{2k+1} (-1)^m \binom{2k+1}{m} y_{i+k+1-m}$$
 استنتج صيغة الفرق المركزي الثالث من العلاقة

الحل: لحساب الفرق المركزي الثالث يتم وضع  $k=1$  وبالتالي  $m$  تأخذ القيم  $0, 1, 2, 3$

نحصل على العلاقات التالية:

بوضع  $k=1$  و  $m=0$ .

$$\delta^3 y_{i+\frac{1}{2}} = (-1)^0 \binom{3}{0} y_{i+1+1-0} = y_{i+2}$$

بوضع  $k=1$  و  $m=1$  .

$$\delta^3 y_{i+\frac{1}{2}} = (-1)^1 \binom{3}{1} y_{i+1+1-1} = -3y_{i+1}$$

بوضع  $k=1$  و  $m=2$  .

$$\delta^3 y_{i+\frac{1}{2}} = (-1)^2 \binom{3}{2} y_{i+1+1-2} = 3y_i$$

بوضع  $k=1$  و  $m=3$  .

$$\delta^3 y_{i+\frac{1}{2}} = (-1)^3 \binom{3}{3} y_{i+1+1-3} = -y_{i-1}$$

بجمع الحدود السابقة

$$\delta^3 y_{i+\frac{1}{2}} = y_{i+2} - 3y_{i+1} + 3y_i - y_{i-1}$$

$$\therefore \delta^3 y_{i+\frac{1}{2}} = y_{2r} - 3y_r + 3y_i - y_L$$

بطرح  $\frac{1}{2}$  من الادللة نحصل على

$$\delta^3 y_i = y_{r+\frac{1}{2}} - 3y_{i+\frac{1}{2}} + 3y_{i-\frac{1}{2}} - y_{L-\frac{1}{2}}$$

**\*\*\* القيمة المتوسطة للدالة \*\*\***

من الرسم السابق نجد أن  $y_{i+\frac{1}{2}}$  هي متوسط  $y_r + y_i$  أي أن :

$$y_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y_r + y_i)$$

كذلك نجد أن :

$$y_{i-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y_i + y_L)$$

فإذا أخذنا  $\mu$  ( مؤثر المنتصف ) أو مؤثر أخذ المتوسط فإن :

$$\mu y_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(y_r + y_i) \quad \rightarrow \textcircled{6}$$

$$\mu y_i = \frac{1}{2}(y_{i+\frac{1}{2}} + y_{i-\frac{1}{2}}) \quad \text{كذلك}$$

فإذا أدخلنا هذا المؤثر على معادلة الفرق الأول :

$$\delta y_i = y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i-\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \mu \delta y_i &= \mu y_{i+\frac{1}{2}} - \mu y_{i-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} [(y_r + y_i) - (y_i + y_L)] \\ &= \frac{1}{2} y_r + \frac{1}{2} y_i - \frac{1}{2} y_i - \frac{1}{2} y_L \\ \therefore \mu \delta y_i &= \frac{1}{2} (y_r - y_L) \end{aligned} \quad \rightarrow \textcircled{7}$$

بإدخال هذا المؤثر علي معادلة الفرق المتوسط الثاني :

$$\begin{aligned} \mu \delta^2 y_i &= \mu \delta (\delta y_i) \\ &= \mu (y_r - 2y_i + y_L) \\ &= \mu y_r - 2\mu y_i + \mu y_L \\ &= \frac{1}{2} (y_{r+\frac{1}{2}} + y_{i+\frac{1}{2}}) - 2 * \frac{1}{2} (y_{i+\frac{1}{2}} + y_{i-\frac{1}{2}}) + \frac{1}{2} (y_{i-\frac{1}{2}} + y_{L-\frac{1}{2}}) \\ &= \frac{1}{2} y_{r+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} y_{i-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} y_{L-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} y_{r+\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} y_{i+\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} y_{i-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} y_{L-\frac{1}{2}} \\ \mu \delta^2 y_i &= \frac{1}{2} (y_{r+\frac{1}{2}} - y_{i+\frac{1}{2}} - y_{i-\frac{1}{2}} + y_{L-\frac{1}{2}}) \quad \rightarrow 3 \end{aligned}$$

بإدخال هذا المؤثر علي معادلة الفرق المتوسط الثالث :

$$\begin{aligned} \therefore \mu \delta^3 y_i &= \mu y_{r+\frac{1}{2}} - 3\mu y_{i+\frac{1}{2}} + 3\mu y_{i-\frac{1}{2}} - \mu y_{L-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} (y_{2r} + y_r) - \frac{3}{2} (y_r + y_i) + \frac{3}{2} (y_i + y_L) - \frac{1}{2} (y_L + y_{2L}) \\ &= \frac{1}{2} \{ y_{2r} + y_r - 3y_r - 3y_i + 3y_i + 3y_L - y_L - y_{2L} \} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \{ y_{2r} - 2 y_r + 2y_L - y_{2L} \}$$

### الفروق المركزية بدلالة المشتقات



من مفكوك تايلور نجد انه فى حالة الفروق الامامية:

$$y_r = e^{hD} y_i$$

وكذلك فى حالة الفروق الخلفية:

$$y_L = e^{-hD} y_i$$

وحيث ان متوسط الفرق المركزي عند  $y_i$  يعطي من العلاقة :

$$\mu \delta y_i = \frac{1}{2} [y_r - y_L]$$

بالتعويض عن  $y_r, y_L$  :

$$\therefore \mu \delta y_i = \frac{1}{2} \left[ e^{hD} y_i - e^{-hD} y_i \right]$$

$$\therefore \mu \delta y_i = \frac{1}{2} y_i \left[ e^{hD} - e^{-hD} \right]$$

$$\therefore \mu \delta = \frac{1}{2} \left[ e^{hD} - e^{-hD} \right]$$

$$\therefore \mu \delta = \text{Sinh}(hD)$$

$$\therefore \delta = \frac{1}{\mu} \text{Sinh}(hD)$$

وهو الفرق المركزي الأول بدلالة المشتقات

وحيث أن :

$$\text{Sinh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \text{etc.}$$

$$\therefore \mu\delta = \text{Sinh}(hD) = hD + \frac{(hD)^3}{3!} + \frac{(hD)^5}{5!} + \dots$$

## الفرق المركزي الثاني بدلالة المشتقات

$$\mu\delta^2 y_i$$

$$\therefore \delta^2 y_i = (y_r - 2y_i + y_L)$$

$$= e^{hD} y_i - 2y_i + e^{-hD} y_i$$

$$\delta^2 y_i = y_i (e^{hD} + e^{-hD} - 2)$$

$$\therefore \mu\delta^2 = \mu (e^{hD} + e^{-hD} - 2)$$

$$= \mu (h^2 D^2 + \frac{2h^4 D^4}{4!} + \frac{2h^6 D^6}{6!})$$

## المشتقات بدلالة الفروق المركزية

من الفروق المركزية بدلالة المشتقات وجد ان

$$\mu\delta = \sinh(hD)$$



$$\therefore hD = \sinh^{-1}(\mu\delta) \dots\dots\dots 1$$

من مفكوك  $\sinh^{-1}$

$$\sinh^{-1}(x) = x - \left(\frac{1}{2}\right)\frac{x^3}{3} + \left(\frac{1*3}{2*4}\right)\frac{x^5}{5} - \left(\frac{1*3*5}{2*4*6}\right)\frac{x^7}{7} + \dots;$$

$$\therefore \sinh^{-1}(\mu\delta) = \mu\delta - \frac{(\mu\delta)^3}{3i} + \frac{3(\mu\delta)^5}{40} - \dots + \dots;$$

**للتبسيط نستعمل الثلاث حدود الاولى فقط**

$$\therefore \sinh^{-1}(\mu\delta) = \mu\delta - \frac{(\mu\delta)^3}{3i} + \frac{3(\mu\delta)^5}{40}$$

**بالتعويض في المعادلة (1), نحصل على**

$$\therefore hD = \mu \left[ \delta - \frac{\mu^2 \delta^3}{3!} + \frac{3\mu^4 \delta^5}{40} \right] \dots\dots\dots 2$$

**بالتعويض عن قيمة  $\mu^2, \mu^4$  في الحدين الثانى والثالث فيما بين الاقواس**

$$\therefore \mu = \sqrt{\frac{\delta^2}{4} + 1}$$

$$\therefore \mu^2 = \frac{\delta^2}{4} + 1$$

**وبالتالى فان**

$$\frac{\mu^2 \delta^3}{3!} = \frac{\delta^3}{3!} \left[ \frac{\delta^2}{4} + 1 \right] = \frac{\delta^5}{24} + \frac{\delta^3}{6} \dots \dots \dots *$$

$$\frac{3\mu^4 \delta^5}{40} \quad \text{كذلك لحساب}$$

$$\mu^4 = \left( \frac{\delta^2}{4} + 1 \right)^2 = \frac{\delta^4}{16} + \frac{2\delta^2}{4} + 1$$

$$\therefore \mu^4 = \frac{\delta^4}{16} + \frac{\delta^2}{2} + 1$$

$$\therefore \frac{3\mu^4 \delta^5}{40} = \frac{3\delta^5}{40} \left[ \frac{\delta^4}{16} + \frac{\delta^2}{2} + 1 \right] = \frac{3\delta^9}{40*16} + \frac{3\delta^7}{40*2} + \frac{3\delta^5}{40} \dots \dots \dots **$$

**بالتعويض عن المعادلتين \* و \*\* فى المعادلة (2)**

$$\begin{aligned} \therefore hD &= \mu \left[ \delta - \left( \frac{\delta^5}{24} + \frac{\delta^3}{6} \right) + \left( \frac{3\delta^9}{40*16} + \frac{3\delta^7}{40*2} + \frac{3\delta^5}{40} \right) \right] \\ &= \mu \left[ \delta - \frac{\delta^5}{24} - \frac{\delta^3}{6} + \frac{3\delta^9}{40*16} + \frac{3\delta^7}{40*2} + \frac{3\delta^5}{40} \right] \\ &= \mu \left[ \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \right] \end{aligned}$$

**وذلك بأخذ الحدود التى بها اقل ثلاث قوى فقط وذلك للتبسيط**

**المشتقة من الدرجة الثانية بدلالة الفروق المركزية**

$$(hD)^2 = (hD)(hD)$$

$$= \mu \left( \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \right) * \mu \left( \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \right)$$

$$= \mu^2 \left( \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \right) \left( \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \right)$$

$$= \mu^2 \left( \delta^2 - \frac{\delta^4}{6} + \frac{\delta^6}{30} - \frac{\delta^4}{6} + \frac{\delta^6}{36} - \frac{\delta^8}{180} + \frac{\delta^6}{30} - \frac{\delta^8}{180} + \frac{\delta^{10}}{900} \right)$$

$$= \mu^2 \left( \delta^2 - \frac{2\delta^4}{6} + \left( \frac{2\delta^6}{30} + \frac{\delta^6}{36} \right) \right)$$

$$= \mu^2 \left( \delta^2 - \frac{2\delta^4}{6} + \frac{102\delta^6}{1080} \right)$$

$$= \mu^2 \left( \delta^2 - \frac{2\delta^4}{6} + \frac{51\delta^6}{540} \right)$$

**بالتعويض عن**  $\mu^2 = \frac{\delta^2}{4} + 1$

$$\begin{aligned} \therefore (hD)^2 &= \left( \frac{\delta^2}{4} + 1 \right) \left( \delta^2 - \frac{2\delta^4}{6} + \frac{51\delta^6}{540} \right) \\ &= \frac{\delta^4}{4} + \delta^2 - \frac{2\delta^6}{24} - \frac{2\delta^4}{6} + \frac{51\delta^8}{4 * 540} + \frac{51\delta^6}{540} \end{aligned}$$

**باستبعاد الحد**  $\frac{51\delta^8}{4 * 540}$  **لصغره**

$$\therefore (hD)^2 = \delta^2 + \frac{6\delta^4 - 8\delta^4}{24} - \frac{2 * 540\delta^6 + 24 * 51\delta^6}{24 * 540}$$

$$\therefore (hD)^2 = \delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \frac{\delta^6}{90}$$

### المشتقة من الدرجة الثالثة بدلالة الفروق المركزية

$$(hD)^3 = (hD) * (hD)^2$$

$$\begin{aligned} &= \mu \left( \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \right) \left( \delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \frac{\delta^6}{90} \right) \\ &= \mu \left( \delta^3 - \frac{\delta^5}{12} + \frac{\delta^7}{90} - \frac{\delta^5}{6} + \frac{\delta^7}{72} - \frac{\delta^9}{540} + \frac{\delta^7}{30} - \frac{\delta^9}{30 * 2} + \frac{\delta^{11}}{30 * 90} \right) \\ &= \mu \left( \delta^3 - \frac{\delta^5}{12} - \frac{\delta^5}{6} + \frac{\delta^7}{90} + \frac{\delta^7}{72} + \frac{\delta^7}{30} \right) \\ &= \mu \left( \delta^3 - \frac{3\delta^5}{12} + \frac{4\delta^7}{90} + \frac{\delta^7}{72} \right) = \mu \left( \delta^3 - \frac{\delta^5}{4} + \frac{288\delta^7 + 90\delta^7}{90 * 72} \right) \\ &= \mu \left( \delta^3 - \frac{\delta^5}{4} + \frac{378\delta^7}{6480} \right) = \mu \left( \delta^3 - \frac{\delta^5}{4} + \frac{7\delta^7}{120} \right). \end{aligned}$$

### المشتقة من الدرجة الرابعة بدلالة الفروق المركزية

$$(hD)^4 = (hD)^2 * (hD)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (\delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \frac{\delta^6}{90})(\delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \frac{\delta^6}{90}) \\
&= \delta^4 - \frac{\delta^6}{12} + \frac{\delta^8}{90} - \frac{\delta^6}{12} + \frac{\delta^8}{144} - \frac{\delta^{10}}{12*90} + \frac{\delta^8}{90} - \frac{\delta^{10}}{90*12} + \frac{\delta^{12}}{90*90} \\
&= \delta^4 - \frac{\delta^6}{12} - \frac{\delta^6}{12} + \frac{2\delta^8}{90} + \frac{\delta^8}{144} \\
&= \delta^4 - \frac{\delta^6}{6} + \frac{378\delta^8}{90*144} \\
&= \delta^4 - \frac{\delta^6}{6} + \frac{7\delta^8}{240}
\end{aligned}$$

**إيجاد علاقة ما بين  $\delta$  ,  $\mu$**

**إيجاد  $\mu$  كداله في  $\delta$**

$$\begin{aligned}
\mu^2 y_i &= \mu(\mu y_i) \\
&= \mu\left(\frac{1}{2}(y_{i+\frac{1}{2}} + y_{i-\frac{1}{2}})\right) \\
&= \frac{1}{2}(\mu y_{i+\frac{1}{2}} + \mu y_{i-\frac{1}{2}}) \\
&= \frac{1}{2}(1/2(y_r + y_i + y_i + y_l)) \\
\therefore \mu 2 y_i &= \frac{1}{4}(y_r + 2y_i + y_l)
\end{aligned}$$

$$\therefore \delta^2 y_i = y_r - 2y_i + y_l \quad \rightarrow \textcircled{6}$$

$$4\mu^2 y_i = y_r + 2y_i + y_l \quad \rightarrow \textcircled{7}$$

بطرح 6 من 7

$$\begin{aligned}
\therefore y\mu 2 y_i - \delta 2 y_i &= 4 y_i \\
\therefore (4\mu^2 - \delta^2) y_i &= 4 y_i \\
\therefore 4\mu^2 &= \delta^2 + 4 \\
\therefore \mu 2 &= \frac{\delta^2 + 4}{4} \\
\therefore \mu &= \sqrt{\frac{\delta^2}{4} + 1}
\end{aligned}$$

كذلك يكون لدينا :

$$\begin{aligned}
\mu^3 &= \mu(\mu^2) = \left(\sqrt{\frac{\delta^2}{4} + 1}\right) \left(\frac{\delta^2}{4} + 1\right) \\
\therefore \mu^3 &= \left(\frac{\delta^2}{4} + 1\right)^{\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

كذلك :

$$\begin{aligned}\mu^4 &= \mu^2 \cdot \mu^2 \\ &= \left( \frac{\delta^2}{4} + 1 \right) \left( \frac{\delta^2}{4} + 1 \right) \\ &= \frac{\delta^4}{16} + \frac{\delta^2}{4} + \frac{\delta^2}{4} + 1 \\ &= \frac{\delta^4}{16} + \frac{\delta^2}{2} + 1\end{aligned}$$

## الاستكمال Interpolation

ما المقصود بـ الاستنتاج أو الاستكمال Interpolation.

بفرض وجود دالة  $y = f(x)$  معرفة فقط عند نقاط محددة  $(x_0, y_0)$ ,

$(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , ...  $(x_n, y_n)$  كيف يمكن أن نوجد قيمة الدالة عند أية قيمة أخرى

$x$  غير تلك القيم ؟ يمكن عمل ذلك باستخدام دالة متصلة  $f(x)$  تمثل تلك البيانات

بحيث أن الدالة  $f(x)$  تمر بنقاط عددها  $n+1$  ، حيث  $n$  درجة الدالة المستخدمة.

وبذلك يمكن حساب قيمة الدالة عند أية نقطة وهذا ما يسمى بـ Interpolation }

استكمال .{ بالطبع إذا كانت  $x$  تقع خارج مدى الدالة  $f(x)$  فإن تعيين قيمة الدالة عند

$x$  في هذه الحالة يسمى Extrapolation { استنتاج } .

نأتي بعد ذلك لاختيار نوع الدالة التي يجب استخدامها لتمثيل البيانات .

من الشائع استخدام الدوال كثيرة الحدود polynomial وذلك للصفات التالية وهي :

(1) سهولة حسابها .



(2) سهولة تفاضلها .

(3) سهولة تكاملها .

وذلك بمقارنتها بدوال  $\sin$  أو الدوال الأسية .

### كيفية عمل polynomial Interpolation

يمكن عمل كثيرة الحدود لتمثيل الدالة بعدة طرق منها

1. الطريقة المباشرة Direct method of Interpolation .
2. طريقة نيوتن للفروق المقسمة ewton's divided difference method .
3. طريقة لاجرانج Lagrange interpolation method .
4. طريقة شتيرلنج للاستدلال Sterling method .

أولا : الطريقة المباشرة لعمل كثيرة الحدود :

تعتمد الطريقة المباشرة علي أنه بفرض أن لدينا ( n+1 ) نقاط فإنه يمكن أن

يتم عمل كثيرة حدود من الدرجة (n) كما يلي :

$$Y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \rightarrow \textcircled{6}$$

عبر البيانات بحيث  $a_0, a_1, \dots, a_n$  عبارة عن n+1 ثوابت حقيقية. وحيث أننا لدينا

n + 1 قيم لـ y يقابلها n+1 قيم لـ x ، فإننا يمكننا عمل n+1 معادلات . ثم بعد

ذلك يتم حساب n+1 ثوابت وهي  $a_0, a_1, a_2 \dots a_n$  . وبمعرفة تلك الثوابت يتم معرفة

الدالة المعبرة عن البيانات رقم  $\textcircled{6}$  . وبالتعويض عن قيمة x فيها يتم معرفة قيمة y

المطلوب حسابها .

لكن ما درجة كثيرة الحدود التي سوف نستخدمها ؟ هل يمكن استخدام كثيرة حدود من

الدرجة الأول ( والتي تسمى معادلة خطية ) ، أم من الدرجة الثانية ( معادلة تربيعية )

، أم من الدرجة الثالثة ( تكعيبية ) ، وما الفرق في دقة النتيجة ؟ يمكن إيضاح ذلك

بمثال .

**مثال 1 :** تعطي السرعة الرأسية لصاروخ كما في الجدول التالي كدالة في الزمن

|                  |   |        |        |        |        |        |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| ts               | 0 | 10     | 15     | 20     | 22.5   | 30     |
| V <sub>m/s</sub> | 0 | 227.04 | 362.78 | 517.35 | 602.97 | 901.67 |

عين سرعة الصاروخ عند  $t=16s$  باستخدام الطريقة المباشرة وكثيرة حدود من الدرجة


الأولي

الحل : حيث أننا مطلوب منا استخدام معادلة من الدرجة الأولى ( معادلة خطية ) ،

تكون معادلة السرعة في الصورة التالية

$$V(t) = a_0 + a_1 t$$

ويكون رسمها البياني كما يلي




حيث أننا مطلوب منا استخدام معادلة من الدرجة الأولى ( معادلة خطية ) . تكون

معادلة السرعة في الصورة التالية :

$$v(t) = a_0 + a_1 t$$

ويكون رسمها البياني كما يلي :



رسم خط مستقيم لتمثيل البيانات الخاصة بالصاوخ

وحيث أن المعادلة من الدرجة الأولى  $n = 1$  فإننا نختار  $n + 1$  نقاط أي نقطتين .

هاتين النقطتين يجب أن يحيطا بالنقطة المطلوبة وذلك لكي تكون تلك النقطة واقعه في

مدى تطبيق المعادلة المستتجة .

وحيث أن النقطة المطلوبة  $\Delta t = 16s$  فإن النقطتين يجب أن يكونا

$$t_1 = 20 , t_0 = 15$$

وحيث أننا لدينا

$$t_0 = 15, v(t_0) = 362.78$$

$$t_1 = 20, v(t_1) = 517.35$$

يكون لدينا معادلتين

$$V(15) = a_0 + a_1(15) = 362.78$$

$$V(20) = a_0 + a_1(20) = 517.35$$

يمكن كتابة المعادلتين في صورة مصفوفة :

$$\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 1 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 362.78 \\ 517.35 \end{bmatrix}$$

بحل المعادلتين السابقتين تحصل علي :

$$a_0 = -100.91$$

$$a_1 = 30.913$$

وبالتالي تكون المعادلة المقترحة هي :

$$v(t) = -100.91 + 30.913 \quad 15 \leq t \leq 20$$

لحساب السرعة عند  $t = 16_s$  نعوض في هذه المعادلة عن قيمة  $t$

$$\therefore V(16) = 393.7 \text{ m/s}$$

مثال 2 :

تعطي سرعة صاروخ رأسيا كما بالجدول التالي :

|          |   |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| t= s     | 0 | 10     | 15     | 20     | 22.5   | 30     |
| v(t) m/s | 0 | 227.04 | 362.78 | 517.35 | 602.97 | 901.67 |


عين سرعة الصاروخ عن  $t = 16$  s باستخدام الطريقة المباشرة وكثيرة حدود

من الدرجة الثانية .

الحل : لعمل معادلة من الدرجة الثانية ( معادلة تربيعية ) تكون علي الشكل

$$v(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$$

وترسم بيانياً كالتالي :



وحيث أننا نريد أن نستنتج سرعة الصاروخ عند  $t = 16$  s فإننا نختار ثلاث

نقاط ( n+1 ) بحيث يشملان القيمة ( 16s ) هذه النقاط هي :

$$T_0=10 , t_1 = 15 , t_2 = 20$$

وتعطي المعادلات التالية لكل نقطة :

$$v(10) = a_0 + a_1(10) + a_2(10)^2 = 227.04$$

$$v(15) = a_0 + a_1(15) + a_2(15)^2 = 362.78$$

$$v(20) = a_0 + a_1(20) + a_2(20)^2 = 517.35$$

نضع تلك المعادلات في صورة مصفوفة كالتالي :

$$\begin{bmatrix} 1 & 10 & 100 \\ 1 & 15 & 225 \\ 1 & 20 & 400 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 227.04 \\ 362.78 \\ 517.35 \end{bmatrix}$$

يمكن حل هذه المصفوفة بطريقة جاوس للحذف الأمامي والتعويض الخلفي أو

بطريقة LU . نحصل بعد ها علي :

$$a_0 = 12.001 \quad , \quad a_1 = 17.740 \quad , \quad a_2 = 0.37637$$

وتكون المعادلة المطلوبة هي :

$$v(t) = 12.001 + 17.790t + 0.37637 t^2 \quad 10 \leq t \leq 20$$

بالتعويض عن قيمة  $t = 16s$  في هذه المعادلة نحصل على  $v(16)$  :

$$\begin{aligned} v(16) &= 12.001 + 17.790 (16) + 0.37637 (16)^2 \\ &= 392.19 \quad \text{m/s} \end{aligned}$$

من المثالين السابقين يمكن حساب الخطأ التقريبي النسبي المطلق:  $|\epsilon_c|$  absolute

relative approximate error الناشئ عن التحول من معادلة درجة أولى إلي

معادلة درجة ثانية :

$$|\epsilon_c| = \left| \frac{392.19 - 393.70}{392.19} \right| \times 100$$
$$= 0.38502\%$$



## Newton's Divided Difference Interpolating Polynomral

### Method

طريقة نيوتن لعمل كثيرة حدود بواسطة الفرق المقسوم

---

لشرح هذه الطريقة سوف يتم أولاً عمل كثيرة حدود من الدرجة الأولى (معادلة

خطية) ومن الدرجة الثانية (معادلة تربيعية) ثم يتم عمل الطريقة العامة وفيها يتم

عمل معادلة من الدرجة الثالثة .

**أولاً : استنتاج معادلة خطية ( من الدرجة الأولى ) :**

بفرض أن لدينا نقطتين  $(x_0, y_0)$  ،  $(x_1, y_1)$  ، استنتج معادلة من الدرجة الأولى

عبر البيانات.

بفرض ان  $y_1 = f_1(x)$  الرقم (1) اسفل  $f, y$  يشير إلي درجة المعادلة .

لذلك يكون لدينا

$$y_0 = f(x_0) , y_1 = f(x_1)$$

بفرض أن المعادلة الخطية تكون علي الصورة

$$f_1(x) = b_0 + b_1 (x - x_0)$$

نريد حساب الثوابت  $b_1, b_0$  نعوض عن  $x = x_0$

$$\therefore f_1(x_0) = f(x_0) = b_0 + b_1 (x_0 - x_0) = b_0$$

$$\therefore b_0 = f(x_0) \quad \rightarrow 1$$

ثم نعوض عن  $x = x_1$

$$\therefore f_1(x_1) = f(x_1) = b_0 + b_1 (x_1 - x_0)$$

$$\therefore b_1 = \frac{f(x_1) - b_0}{x_1 - x_0}$$

$$\therefore b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad \rightarrow 2$$

وبالتالي تكون قيمة الثوابت هي :

$$b_0 = f(x_0)$$
$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

وتكون المعادلة النهائية بالصورة :

$$f_{(1)}(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

مثال


تعطي سرعة الصاروخ الرأسية كدالة في الزمن كما في الجدول التالي :

|      |   |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| T= s | 0 | 10     | 15     | 20     | 22.5   | 3-     |
| s    | 0 | 227.04 | 362.78 | 517.35 | 602.97 | 901.67 |

عين قيمة السرعة عند  $t = 16s$  باستخدام معادلة من الدرجة الأولى مستخدماً

طريقة الفروق المقسمة لنيوتن .

الحل :



السرعة لأزمنة مختلفة كما في المثال

باستخدام المعادلة الخطية التي من الدرجة الأولى بطريقة الفروق المقسمة لنيوتن

تعطي السرعة من العلاقة :

$$V(t) = b_0 + b_1(t - t_0)$$

وحيث أننا نريد السرعة عند  $t=16s$  فإننا نحتاج نقطتين قبل وبعد تلك النقطة وهما

$$t_0 = 15 , t_1 = 20$$

$$\text{at } t_0 = 15 , v(t_0) = 362.78$$

$$\text{at } t_1 = 20 , v(t_1) = 517.35$$

ومنها يتم حساب الثوابت

$$b_0 = v(t_0) = 362.78$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{v(t_1) - v(t_0)}{t_1 - t_0} \\ &= \frac{517.35 - 362.78}{20 - 15} \\ &= 30.914 \end{aligned}$$

$$v(t) = b_0$$

وبالتالي تكون المعادلة :

$$+ b_1(t - t_0) = 362.78 + 30.914 (t - 15) \quad 15 \leq t \leq 20$$

لحساب السرعة عند  $t = 16$  تعوض :

$$v(t) = 362.78 + 30.914 (t - 15)$$

نحصل علي

$$v(t) = - 100.93 + 30.914 t$$

وهي نفس المعادلة التي تم الحصول عليها بالطريقة المباشرة

### ثانياً: المعادلة التربيعية (quadrahc interpolation)

يفرض أن لدينا النقاط التالية  $(x_0, y_0)$ ,  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$

ارسم كثيرة حدود عبر البيانات في الجدول الذي في المثال السابق .

#### **الحل :**

بملاحظة  $y = f(x)$ ,  $y_0 = f(x_0)$ ,  $y_1 = f(x_1)$ ,  $y_2 = f(x_2)$

نفترض أن المعادلة كثيرة الحدود من الدرجة الثانية تعطى من العلاقة

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

عند  $y = x_0$  يكون لدينا

$$f(x_0) = f_2(x_0) = b_0 + b_1(x_0 - x_0) + b_2(x_0 - x_0)(x_0 - x_1)$$

$$= b_0$$

$$b_0 = f(x_0)$$

عند  $x = x_1$  يكون لدينا

$$f(x_1) = f_2(x_1) = b_0 + b_1(x_1 - x_0) + b_2(x_1 - x_0)(x_1 - x_1)$$

$$f(x_1) = f(x_0) + b_1 (x_1 - x_0)$$

$$\therefore b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

عند  $x = x_2$

$$f(x_2) = f_2(x_2) = b_0 + b_1 (x_2 - x_0) + b_2 (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

عوض عن  $b_0, b_1$

$$\therefore f(x_2) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x_2 - x_0) + b_2 (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

نحصل على :

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1}$$

وبالتالي فإن المعادلة التي من الدرجة الثانية :

$$f_2(x) = b_0 + b_1 (x - x_0) + b_2 (x - x_0)(x - x_1)$$

تصبح بعد التعويض عن الثوابت :

$$f_2(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0) + \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1} (x - x_0)(x - x_1)$$

y ↑

-94-

$x_1, y_1$



## مثال 2:

تعطي سرعة صاروخ رأسياً كما في الجدول السابق

عين سرعة الصاروخ عند  $t = 16$  s مستخدماً معادلة من الدرجة الثانية باستخدام

طريقة نيوتن للفرق المقسوم .

الحل المعادلة التربيعية تكون في الصورة

$$v(t) = b_0 + b_1 (t - t_0) + b_2 (t - t_0)(t - t_1)$$

وحيث أن هذه المعادلة تربيعية أن  $n = 2$  فإننا في حاجة ألي ثلاث نقاط تكون قريبة

من  $t = 16$  وتكون حولها ( أي قبل وبعد  $t = 16$  ) ، هذه النقاط هي

$$t_0 = 10 , v(t_0) = 227.04$$

$$t_1 = 15 , v(t_1) = 362.78$$

$$t_2 = 20, \quad v(t_2) = 517.35$$

وبالتالي يكون :

$$b_0 = v(t_0)$$

$$= 227.04$$

$$b_1 = \frac{v(t_1) - v(t_0)}{t_1 - t_0} = \frac{362.78 - 227.04}{15 - 10} = 27.148$$

$$b_2 = \frac{\frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} - \frac{v(t_1) - v(t_0)}{t_1 - t_0}}{t_2 - t_1} = \frac{\frac{517.35 - 362.78}{20 - 15} - \frac{362.78 - 227.04}{15 - 10}}{20 - 10}$$

$$= \frac{30.914 - 27.148}{10} = 0.37660$$

بالتعويض عن هذه القيم للثوابت في المعادلة تحصل علي :

$$v(t) = b_0 + b_1 (t - t_0) + b_2 (t - t_0)(t - t_1)$$

$$= 227.04 + 27.148 (t - 10) + 0.37660 (t - 15)$$

$$10 \leq t \leq 20$$

$$\text{at } t = 16$$

$$v(16) = 227.04 + 27.148 (16 - 10) + 0.37660 (16 - 10) (16 - 15)$$

$$= 392.19 \text{ m/s}$$

وبفك الأقواس نحصل على :

$$V(16) = 12.05 + 17.733 t + 0.37660 t^2 \quad 10 \leq t \leq 20$$



وهي المعادلة التي حصلنا عليها سابقاً بالطريقة المباشرة .

استنتاج طريقة عامة لاستنتاج المعادلة كثيرة الحدود بواسطة طريقة نيوتن

للفروق المقسمة .

من المعادلة التربيعية بطريقة نيوتن وجد أن الحل يكون من الصورة .

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

حيث تم حساب الثوابت كالآتي :

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

نلاحظ أن هذه الثوابت ما هي إلا فروق منتهية مقسومة ومن هنا جاء تسمية

الطريق بطريقة نيوتن للفروق المقسومة . حيث  $b_0$  ,  $b_1$  ,  $b_2$  هي الفرق الأول

المقسوم ، الفرق الثاني المقسوم ، الفرق الثالث المقسوم علي التوالي .

سوف ترمز للفرق الأول المقسوم كالآتي :

$$f[x_0] = f(x_0)$$

وترمز للفرق الثاني المقسوم كالآتي :

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

والفرق الثالث المقسوم كالآتي :

$$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

حيث تسمى الدوال  $f[x_0]$  ،  $f[x_1, x_0]$  ،  $F[x_2, x_1, x_0]$  بالدوال المقوسة

لمتغيراتها المحصورة داخل الأقواس .

وبكتابة الصورة العامة لمعادلة نيوتن للدرجة الثانية بالدوال المقوسة

$$F_2(x) = f[x_0] + f[x_1, x_0](x - x_0) + f[x_2, x_1, x_0](x - x_0)(x - x_1)$$

وبالتالي تكون الصورة العامة لطريقة نيوتن لعدد  $(n+1)$  من البيانات

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1}), (x_n, y_n)$$

لها الصورة التالية

$$F_n(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + \dots + b_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

حيث تكون الثوابت كالتالى:

$$b_0 = f[x_0]$$

$$b_1 = f[x_1 - x_0]$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0]$$

$$b_{n-1} = f[x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0]$$

$$b_n = f[x_n, x_{(n-1)}, \dots, x_0]$$

بحيث أن الصورة العامة لهذه الثوابت التي يطلق عليها  $m^{\text{th}}$  divided differences هي

هي

$$[b_m = f[x_m, \dots, x_0]] \\ = \frac{f[x_m, \dots, x_1] - f[x_{m-1}, \dots, x_0]}{x_m - x_0}$$

) من التعريف السابق نجد أن الفروق المقسومة ثم حسابها recursively

بالعودة للوراء ( .

**مثال :**

كمثال لعمل كثيرة حدود من الدرجة الثالثة ، نفرض أن لدينا البيانات التالية :

$(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$  and  $(x_3, y_3)$


فإن كثيرة الحدود تكون في الصورة العامة


$$F_3(x) = f[x_0] + f[x_1, x_0](x-x_0) + f[x_2, x_1, x_0](x-x_0)(x-x_1) + f[x_3, x_2, x_1, x_0](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) .$$

يمكن عمل رسم تخطيطي لقيم الثوابت  $b_3, b_2, b_1, b_0$  في حالة كثيرات الحدود من

درجات مختلفة تتراوح ما بين كثيرة حدود من درجة (0) صفر  $x_0$  إلى كثيرة حدود من

الدرجة الثالثة  $x_3$  كما يلي :





### مثال 3:

تعطي السرعة الرأسية لصاروخ كما في الجدول السابق في المثال السابق .عين

قيمة السرعة عند  $t=16s$  مستخدما كثيرة حدود من الدرجة الثالثة باستخدام طريقة

نيوتن للفروق المقسومة .

**الحل:** تعطي معادلة السرعة من الدرجة الثالثة في الصورة التالية :

$$v(t) = b_0 + b_1 (t - t_0) + b_2 (t - t_0)(t - t_1) + b_3 (t - t_0)(t - t_1)(t - t_2)$$

وحيث أننا نريد حساب السرعة عند  $t = 16$  فإننا تختار أربع نقاط للبيانات قريبة من

$t = 16$  وتحيط بها . هذه الأربع نقاط هي :

$$t_0 = 10 , \quad v(t_0) = 227.04$$

$$t_1 = 15 , \quad v(t_1) = 362.78$$

$$t_2 = 20 , \quad v(t_2) = 517.35$$

$$t_3 = 22.5 , \quad v(t_3) = 602.97$$

ثم نأتي لحساب  $b_0, b_1, b_2, b_3$  بدلالة قيم السرعة عند تلك الأزمنة المختلفة .

$$\begin{aligned}
b_0 &= v[ t_0 ] \\
&= v( t_0) \\
&= 227.04
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_1 &= v[ t_1 , t_0 ] \\
&= \frac{v(t_1) - v(t_0)}{t_1 - t_0} \\
&= \frac{362.78 - 227.04}{15 - 10} \\
&= 27.148
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_2 &= v [ t_2, t_1 , t_0 ] \\
&= \frac{v[t_2, t_1] - v[t_1, t_0]}{t_2 - t_0} \\
v[t_2, t_1] &= \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} \\
&= 30.914 \\
v[t_1, t_0] &= 27.148 \\
\therefore b_2 &= 0.37660
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_3 &= \frac{v[t_3, t_2, t_1] - v[t_2, t_1, t_0]}{t_3 - t_0} \\
v[t_3, t_2, t_1] &= \frac{v[t_3, t_2] - v[t_2, t_1]}{t_3 - t_1} \\
v[t_3, t_2] &= \frac{v(t_3) - v(t_2)}{t_3 - t_2} = 34.248 \\
v[t_2, t_1] &= \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = 30.914
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v[t_3, t_2, t_1] &= \frac{v[t_3, t_2] - v[t_2, t_1]}{t_3 - t_1} \\
&= \frac{34.246 - 30.414}{22.5 - 15} = 0.44453 \\
v[t_2, t_1, t_0] &= 0.37660 \\
b_3 = v[t_3, t_2, t_1, t_0] &= \frac{v[t_3, t_2, t_1] - v[t_2, t_1, t_0]}{t_3 - t_0} \\
&= \frac{0.44453 - 0.37660}{22.5 - 10} = 5.4347 * 10^{-3}
\end{aligned}$$

وبالتالي تكون

$$\begin{aligned}
V(t) &= b_0 + b_1(t - t_0) + b_2(t - t_0)(t - t_1) + b_3(t - t_0)(t - t_1)(t - t_2) \\
&= 227.04 + 27.148(t - 10) + 0.37660(t - 10)(t - 15) + 5.437 * 10^{-3} \\
&\quad (t - 10)(t - 15)(t - 20)
\end{aligned}$$

بالتعويض عن  $t = 16$

$$\therefore v(16) = 392.06 \text{ m/s}$$

يمكن كتابة المعاملات في صيغة نيوتن لكثيرات الحدود [ هذه المعاملات هي الفروق

المقسومة ] في صورة جدول كما سبق.

**مثال:** لدالة F سوف يتم استكمالها interpolated علي النقاط  $x_0, x_1, \dots, x_n$

يمكن عمل الجدول التالي:

|       |          |                                     |                                                                         |
|-------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $x_0$ | $f(x_0)$ |                                     |                                                                         |
|       |          | $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ |                                                                         |
|       |          |                                     | $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ |
| $x_1$ | $f(x_1)$ |                                     | $x_2 - x_0$                                                             |
|       |          | $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ |                                                                         |
| $x_2$ | $f(x_2)$ |                                     |                                                                         |

ثم يتم عمل الحدود باستعمال مدخلات القطر الأعلى في الجدول كمعاملات .

**مثال :**

افترض عمل كثيرة حدود للدالة  $f(x) = \tan x$  باستعمال الفروق المقسومة عند

النقاط التالية

$$X_0 = -1.5 \quad x_1 = -0.75 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0.75 \quad x_4 = 1.5$$

$$F(x_0) = -14.1014 , \quad f(x_1) = -0.931596 , \quad f(x_2) = 0 , \quad f(x_3) =$$

$$0.931596 , \quad f(x_4) = 14.1014$$

**يمكن عمل الجدول التالي باستعمال ستة أرقام دقة :**



| X     | F(x)      |          |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|----------|
| - 1.5 | -14.1014  | 13.1698  |          |          |
| -0.75 | -0.931596 |          | -12.2382 |          |
| 0     | 0         | 0.931596 |          | 12.23821 |
| 0.75  | 0.931596  | 0.931596 | 0        |          |
|       |           |          |          | 12.23821 |
|       |           |          | 12.23821 |          |
| 1.5   | 14.01014  | 13.1698  |          |          |

وبالتالي فإن المعادلة تأخذ الصورة

$$\begin{aligned} \text{Tan}(x) &= -14.1014 + 13.1698 (x + 1.5) - 12.2382 (x + 1.5) (x \\ &+ 0.75) + 12.23821 (x + 1.5) (x + 0.75) (x) \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

## Lagrangian interpolation

طريقة لاجرانج هي واحدة من الطرق المستخدمة لعمل كثيرة حدود من الدرجة

n تمر بعدد من النقاط ( n + 1 ) .

تعطي كثيرة الحدود باستخدام طريقة لاجرانج كما يأتي :

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

حيث n في  $f_n(x)$  , تمثل درجة كثيرة الحدود التي تقرب الدالة  $y=f(x)$

لعدد من النقاط ( n + 1 ) في صورة

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

$L_i(x)$  تعطي في الصورة :

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

الرمز  $\prod$  يمثل حاصل ضرب عدد من الحدود مقداره (n) لا يدخل فيها الحدود التي

يتساوي بها  $j, i$  .

سوف يتضح هذا من المثال التالي :

تعطي السرعة الرأسية لصاروخ كدالة في الزمن كما في الجدول :

|          |   |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| T= s     | 0 | 10     | 15     | 20     | 22.5   | 30     |
| V(t) m/s | 0 | 227.04 | 362.78 | 517.35 | 602.97 | 901.67 |

عين قيمة السرعة عند  $t = 16$  s باستخدام كثيرة حدود من الدرجة الأولى بطريقة

لاجرانج :


**الحل:** لعمل كثيرة حدود من الدرجة الأولى ( معادلة خطية) تعطى السرعة من

المعادلة التالية بطريقة لاجرانج :

$$v_1(t) = \sum_{i=0}^1 L_i(t)v(t_i)$$

بالتعويض عن  $i=0$  ,  $i=1$

$$= L_0(t)v(t_0)+L_1(t)v(t_1)$$



التمثيل الخطي

وحيث أننا نريد حساب  $v$  عند  $t = 16s$  نختار نقطتين حول  $t = 16$

وتحيطان بها وهما :

$$t_0 = 15 \quad , \quad v(t_0) = 362.78$$

$$t_1 = 20 \quad , \quad v(t_1) = 517.35$$

في حالة  $i = 0$  تحذف الحد الذي به  $j = 0$  وبالتالي تكون قيمة  $j$  في

هذا المدى من 0 الى 1 هي 1 فقط ومنها يكون

$$\therefore L_0(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq 0}}^1 \frac{t-t_j}{t_0-t_j}$$

$$L_0(t) = \frac{t-t_1}{t_0-t_1}$$

$$L_1(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq 1}}^1 \frac{t-t_j}{t_1-t_j}$$

وبالمثل يكون

في هذه الحالة  $i = 1$  وبالتالي يحذف الحد الذي به  $j = 1$  وبالتالي تكون

قيمة  $j$  في هذا المدى من 0 الى 1 هي 0 فقط ومنها يكون :

$$L_1(t) = \frac{t-t_0}{t_1-t_0}$$

بالتعويض عن  $L_0(t)$  ,  $L_1(t)$  في المعادلة نحصل علي :

$$v(t) = \frac{t-t_1}{t_0-t_1}v(t_0) + \frac{t-t_0}{t_1-t_0}v(t_1)$$

$$= \frac{t-20}{15-20}(362.78) + \frac{t-15}{20-15}(517.35)$$

بالتعويض عن  $t = 16$  تحصل علي :

$$V(16) = 393.7 \text{ m/ s}$$

**مثال 2:**

لنفس البيانات في المثال السابق استنتج معادلة تربيعية بطريقة لاجرانج ومنها


احسب السرعة عند  $t = 16 \text{ s}$

**الحل :**

في هذه الحالة تعطي السرعة من العلاقة :

$$v_2(t) = \sum_{i=0}^2 L_i(t)v(t_i)$$

$$= L_0(t)v(t_0) + L_1(t)v(t_1) + L_2(t)v(t_2)$$



حيث أننا نريد السرعة عند  $t = 16$  s فإننا نختار ثلاث نقاط حول  $t = 16$  وهي

$$t_0 = 10, v(t_0) = 227.04$$

$$t_1 = 15, v(t_1) = 362.78$$

$$t_2 = 20, v(t_2) = 517.35$$

وتحسب  $L_2(t)$ ,  $L_1(t)$ ,  $L_0(t)$  كالتالي :

$$L_0(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 0}}^2 \frac{t-t_j}{t_0-t_j} = \left[ \frac{t-t_1}{t_0-t_1} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_0-t_2} \right]$$

كذلك :

$$L_1(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 1}}^2 \frac{t-t_j}{t_1-t_j} = \left[ \frac{t-t_0}{t_1-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_1-t_2} \right]$$

كذلك :

$$L_2(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 2}}^2 \frac{t-t_j}{t_2-t_j} = \left[ \frac{t-t_0}{t_2-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_1}{t_2-t_1} \right]$$

بالتعويض عن  $L_2(t)$ ,  $L_1(t)$ ,  $L_0(t)$  نحصل علي :

$$v(t) = \left[ \frac{t-t_1}{t_0-t_1} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_0-t_2} \right] v(t_0) + \left[ \frac{t-t_0}{t_1-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_1-t_2} \right] v(t_1) + \left[ \frac{t-t_0}{t_2-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_1}{t_2-t_1} \right] v(t_2)$$

$$\therefore v(16) = \frac{(16-15)(16-20)}{(10-15)(10-20)} (227.04) + \frac{(16-10)(16-20)}{(15-10)(15-20)} (362.78) + \frac{(16-10)(16-15)}{(20-10)(20-15)} (517.35)$$

$$= (-0.08)(227.04) + (0.96)(362.78) + (0.12)(517.35)$$

$$= 392.19 \text{ m/s}$$

**مثال 3 :**

تقس بيانات الجدول السابق منها عين معادلة من الدرجة الثالثة (cubic) ومنها

أحسب السرعة عند  $t = 16 \text{ s}$  بطريقة لاجرانج :

**الحل :**

تعطي معادلة لاجرانج للسرعة من الدرجة الثالثة في الصورة التالية :

$$v(t) = \sum_{i=0}^3 L_i(t)v(t_i)$$

$$= L_0(t)v(t_0) + L_1(t)v(t_1) + L_2(t)v(t_2) + L_3(t)v(t_3)$$

وبالتالي أربع نقاط تحيط بالنقطة  $t = 16$  وهي :

$$t_0 = 10 \quad , \quad v(t_0) = 227.04$$

$$t_1 = 15 \quad , \quad v(t_1) = 362.78$$

$$t_2 = 20 \quad , \quad v(t_2) = 517.35$$

$$t_3 = 22.5 \quad , \quad v(t_3) = 602.97$$

بعد الحصول علي  $v(t_3)$  ,  $v(t_2)$  ,  $v(t_1)$  ,  $v(t_0)$  نريد حساب  $L_3(t)$  ,  $L_2(t)$  ,

وذلك كالتالي :

$$L_0(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq 0}}^3 \frac{t-t_j}{t_0-t_j} = \left[ \frac{t-t_1}{t_0-t_1} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_0-t_2} \right] \left[ \frac{t-t_3}{t_0-t_3} \right]$$

$$L_1(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq 1}}^3 \frac{t-t_j}{t_1-t_j} = \left[ \frac{t-t_0}{t_1-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_1-t_2} \right] \left[ \frac{t-t_3}{t_1-t_3} \right]$$

$$L_2(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq 2}}^3 \frac{t-t_j}{t_2-t_j} = \left[ \frac{t-t_0}{t_2-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_1}{t_2-t_1} \right] \left[ \frac{t-t_3}{t_2-t_3} \right]$$

$$L_3(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq 3}}^3 \frac{t-t_j}{t_3-t_j} = \left[ \frac{t-t_0}{t_3-t_0} \right] \left[ \frac{t-t_1}{t_3-t_1} \right] \left[ \frac{t-t_2}{t_3-t_2} \right]$$

بالتعويض عن هذه القيم في المعادلة الأصل نحصل علي :

$$V(16) = 392.06 \text{ m/s}$$

طريقة شتيرنج للاستدلال



يمكن كتابة متسلسلة تايلور على الصورة التالية:

$$y(x + ah) = y(x) \left[ 1 + ahD + \frac{(ah)^2}{2!} D^2 + \frac{(ah)^3}{3!} D^3 + \dots \right] \dots\dots\dots 1$$

$$= y(x)e^{ahD}$$

من الفروق المركزية وجد ان

$$hD = \mu\delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{30} \dots\dots\dots 2$$

$$(hD)^2 = \delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \frac{\delta^6}{90} \dots\dots\dots 3$$

بالتعويض عن قيمة  $(hD)^2$  و  $(hD)$  فى المعادلة الاولى:

$$\therefore y(x + ah) = y(x) \left[ 1 + \alpha\mu\left(\delta - \frac{\delta^3}{6} + \dots\dots\dots\right) + \frac{\alpha^2}{2!} \left(\delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \dots\dots\dots\right) \right]$$

$$= y(x) \left[ 1 + \alpha\mu\delta + \frac{\alpha^2\delta^2}{2!} + \dots\dots\dots \right]$$

وذلك بأخذ الحد الاول بعد الضرب فى القوسين

$$= y(x) + \alpha\mu\delta y(x) + \frac{\alpha^2\delta^2}{2!} y(x)$$

بالتعويض عن  $y_i = y(x)$

$$\begin{aligned}
&= y_i + \alpha \mu \delta y_i + \frac{\alpha^2 \delta^2}{2!} y_i \\
&= y_i + \alpha (\mu \delta y_i) + \frac{\alpha^2}{2} (\delta^2 y_i)
\end{aligned}$$

وهذه هي صيغة شتيرلنج للاستكمال, ويمكن استعمال الحدين الأوليين من الطرف

الأيمن أو باستعمال الثلاثة حدود.

فإذا استعملنا الحدين الأوليين فقط, تؤول العلاقة إلى الصورة التالية:

$$\begin{aligned}
y(x + \alpha h) &= y_i + \alpha (\mu \delta y_i) \\
&= y_i + \frac{\alpha}{2} (y_r - y_L)
\end{aligned}$$

$$\mu \delta y_i = \frac{1}{2} (y_r - y_L) \quad \text{ونذلك لان}$$

**أما اذا استعملنا الثلاثة حدود فان العلاقة تأخذ الصورة التالية**

$$\begin{aligned}
y(x + \alpha h) &= y_i + \alpha (\mu \delta y_i) + \frac{\alpha^2}{2} (\delta^2 y_i) \\
&= y_i + \frac{\alpha}{2} (y_r - y_i) + \frac{\alpha^2}{2} (y_r - 2y_i + y_L) \\
&= y_i + \frac{\alpha}{2} [y_r - y_L + \alpha (y_r - 2y_i + y_L)] \\
&= y_i + \frac{\alpha}{2} [y_r - y_L + \alpha y_r - 2\alpha y_i + \alpha y_L]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= y_i + \frac{\alpha}{2} [y_r(1 + \alpha) + y_L(\alpha - 1) - 2\alpha y_i] \\
&= y_i + \frac{\alpha}{2} y_r(1 + \alpha) + \frac{\alpha}{2} y_L(\alpha - 1) - \alpha^2 y_i \\
&= \frac{\alpha}{2} (\alpha - 1) y_L + y_i(1 - \alpha^2) + \frac{\alpha}{2} (1 + \alpha) y_r .
\end{aligned}$$

مثال

أوجد قيمة  $\tan 16^\circ$  باستخدام البيانات فى الجدول التالى, مستعملا طريقة شتيرلنج

للاستكمال.

|       |            |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| x     | $10^\circ$ | $15^\circ$ | $20^\circ$ | $25^\circ$ |
| Tan x | 0.1763     | 0.2679     | 0.3640     | 0.4603     |

الحل

$$\therefore \tan 16 = y(x + \alpha h)$$

$$x=15, \quad h=20-15=5, \quad \alpha h=1$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{5} = 0.2$$

حيث h هى مقدار الخطوة التى تزداد بها البيانات,  $\alpha h$  هى القيمة التى تزداد بها

القيمة المطلوبة عن اقرب قيمة معلومة وهى فى هذا المثال  $15^\circ$ .

باستعمال الطريقة الاولى لشتيرنج وهى استعمال حدين فقط:

$$\tan 16 = y_i + \frac{\alpha}{2}(y_r - y_L)$$

حيث  $y_i$  هى قيمة  $\tan$  عند  $15^\circ$ .

$y_r$  هى قيمة  $\tan$  عند  $20^\circ$

$y_L$  هى قيمة  $\tan$  عند  $10^\circ$

$$\tan 16 = 0.2679 + \frac{0.2}{2}(0.3640 - 0.1763) = 0.2866$$

باستعمال الطريقة الثانية لشتيرنج وهى استعمال الثلاثة حدود.

$$\begin{aligned}\tan 16^\circ &= \frac{\alpha}{2}(\alpha - 1)y_L + y_i(1 - \alpha^2) + \frac{\alpha}{2}(1 + \alpha)y_r \\ &= \frac{0.2}{2}(0.2 - 1)(0.1763) + (1 - (0.2)^2)(0.2679) + \frac{0.2}{2}(0.2 + 1)(0.364) = 0.28679\end{aligned}$$

والطريقة الثانية اكثر دقة. وهكذا كلما استعملنا عدد اكثر من الحدود كلما اقتربنا من

القيمة الحقيقية.

## توفيق البيانات Regression

يوجد نوعين من توفيق البيانات Regression

1- linear regression توفيق خطي

2- nonlinear regression توفيق غير خطي

### التوفيق الخطي linear regression

linear regression هو من أشهر موديلات التوفيق regression وفيه يتم وصف

سلوك عدد  $n$  من النقاط  $(x_0, y_0)$  ,  $(x_1, y_1)$  ,  $(x_2, y_2)$  ...  $(x_n, y_n)$

بواسطة موديل خطي يعطي في الصورة

$$y = a_0 + a_1 x \rightarrow \textcircled{6}$$

حيث  $a_0$  ,  $a_1$  هي ثوابت الموديل. لقياس كفاءة الموديل ، أي إلي أية مدي ينجح

الموديل  $y = a_0 + a_1 x$  في وصف سلوك البيانات نحتاج إلي تعيين المتبقي

residual عند كل نقطة وهو يعطى من العلاقة التالية:

$$R = y_i - (a_0 + a_1 x_i)$$

حيث  $i = 1, 2, \dots, n$

$y_i$  هي القيمة الأساسية.

(  $a_0 + a_1 x_i$  ) القيمة المحسوبة بالموديل.

في الحالة المثالية ، عندما يكون الباقي يساوي صفراً لكل النقاط ، فإن كل

النقاط تكون واقعة على الخط ( الموديل ) وبالتالي فإن تقليل البواقي هو الهدف

للحصول على معاملات الموديل الأنسب .

من أشهر الطرق لتقليل البواقي هي طريقة LEAST SQUARES METHOD )

طريقة اقل المربعات ( حيث يتم اختيار قيم ثوابت الموديل  $a_0$  ،  $a_1$  بحيث تعطي أقل

$$\text{قيمة لمجموع مربعات الفروق ، أي تقليل } \sum_{i=1}^n R^2 .$$

لماذا تلجأ إلى تقليل مجموع مربعات الفروق وليس إلى تقليل مجموع الفروق أو

مجموع القيم المطلقة للفروق أو إلى الأخذ في الاعتبار أن متوسط النهائي للفروق

يساوي صفراً دون الأخذ في الاعتبار تقليل الفرق لكل نقطة على حدي .

سوف نناقش ذلك فى المثال التالى:

أفترض أن لدينا البيانات التالية :

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| x | 2 | 3 | 2 | 3 |
| y | 4 | 6 | 6 | 8 |

صف هذه البيانات بموديل ( خط مستقيم ) فى الصورة

$$y=a_0+a_1x$$


أولاً:

نختار أن تقليل مجموع الفروق أى جعل  $\sum_{i=1}^n R_i = 0$  وذلك للحصول على  $a_0$  ,  $a_1$ .

نجد أن الموديل قد يأخذ الصورة

$$Y=4x-4$$

كما فى الشكل التالى :




في هذه الحال يكون مجموع البواقي  $\sum_{i=1}^4 R_i = 0$  كما هو مبين في الجدول التالي :

| x | y | y predicted            | $\zeta = y - y \text{ predicted}$ |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 4 | 4                      | 0                                 |
| 3 | 6 | 8                      | -2                                |
| 2 | 6 | 4                      | 2                                 |
| 3 | 8 | 8                      | 0                                 |
|   |   | $\sum_{i=1}^n R_i = 0$ |                                   |

وبالتالي يكون لدينا أقل خطأ وهو في صورة  $\sum_{i=1}^n R_i = 0$  لكن هذا الشرط لا يعطي قيمة

واحدة لمعاملات الموديل. فإذا أخذنا الموديل في صورة خط مستقيم له المعادلة  $y=6$

كما في الشكل التالي:





يتحقق كذلك أن مجموع الفروق = صفرا  $\sum_{i=1}^n R_i = 0$  ويكون الفروق لكل نقطة كما

بالجدول:

| x | y | y predicted            | $\zeta = y - y \text{ predicted}$ |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 4 | 6                      | -2                                |
| 3 | 6 | 6                      | 0                                 |
| 2 | 6 | 6                      | 0                                 |
| 3 | 8 | 6                      | 2                                 |
|   |   | $\sum_{i=1}^n R_i = 0$ |                                   |

وحيث أن هذا الشرط  $\left[ \sum_{i=1}^n R_i = 0 \right]$  لا يعطي موديل خطي وحيد فإنه لا يمكن

استخدامه لإيجاد قيم المعاملات  $a_0, a_1$ . دعنا الآن نرى لماذا لا يمكن استخدام هذا

الشرط بصورة عامة .

حيث أننا نريد أن تقلل القيمة :

$$\sum_{i=1}^n R_i = \sum_{i=0}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i) \quad 6$$

فإننا نفاضل المعادلة (6) وبالنسبة إلى  $a_0$  وبالنسبة إلى  $a_1$  تحصل على :

$$\frac{\partial \sum_{i=1}^n R_i}{\partial a_0} = -\sum_{i=1}^n 1 = -n \quad 7$$

وكذلك :

$$\frac{\partial \sum_{i=1}^n R_i}{\partial a_1} = -\sum_{i=1}^n x_i = -n\bar{X}$$

حيث  $\bar{X}$  تمثل المتوسط

مساواة هذه المعادلات بالصفر بتطلب أن تكون  $n=0$  وهذا مستحيل لأن

الموديل به حدود . لذلك نقول لا يوجد قيم وحيدة للمعاملات  $a_1, a_0$ .

كذلك في باقي الحالات نجد أن قيم المعاملات لا تكون وحيدة.


نأتي لمناقشة طريقة تقليل مجموع مربعات الفروق Least squares

method

في هذه الحالة نريد تقليل

$$S_r = \sum_{i=1}^n R_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

حيث  $S_r$  مجموع مربعات الفروق :



موديل خطي بين المتغيرين موضعا المتبقي

لإيجاد  $a_1, a_0$  تعمل على تقليل المتبقي  $S_r$  بالنسبة إلى  $a_1, a_0$  . لا يتم ذلك

إلا بجعل التفاضل بالنسبة إلى  $a_1, a_0$  يكون صفرا كالتالي :

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)(-1) = 0 \quad 10$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)(-x_i) = 0 \quad 11$$

بالقسمة على (-2) للمعادلتين تحصل على :

$$-\sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n a_0 + \sum_{i=1}^n a_1 x_i = 0 \quad 12$$

$$-\sum_{i=1}^n y_i x_i + \sum_{i=1}^n a_0 x_i + \sum_{i=1}^n a_1 x_i^2 = 0 \quad 13$$

بملاحظة أن :

$$\sum_{i=1}^n a_0 = a_0 + a_0 + \dots a_0 = na_0$$

بالتعويض في 12 تحصل على :

$$na_0 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \quad 14$$

وكذلك من 13 تحصل على :

$$a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad 15$$

يحل المعادلتين 14,15 للحصول على  $a_1, a_0$  .

من 14 :

$$na_0 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$$

منها

$$a_0 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

بالتعويض عن  $a_0$  في 15

$$\therefore \left[ \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n} \right] \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

بالضرب في  $n$

$$\begin{aligned} & \left( \sum_{i=1}^n y_i - a_1 \sum_{i=1}^n x_i \right) \sum_{i=1}^n x_i + na_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = n \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \therefore & \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i - a_1 \left[ \sum_{i=1}^n x_i \right]^2 + na_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = n \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \therefore & \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i - a_1 \left[ \left[ \sum_{i=1}^n x_i \right]^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] = n \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

$$\therefore a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n x_i y_i}{\left[ \sum_{i=1}^n x_i \right]^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

16

بالتعويض من  $a_1$  في 14 تحصل على  $a_0$  كالتالي :

$$na_0 + \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i}{\left[ \sum_{i=1}^n x_i \right]^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

ي ضرب الطرفين في المقام

$$\begin{aligned} \therefore a_0 n \left[ \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] + \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i &= \left[ \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] \sum_{i=1}^n y_i \\ \therefore a_0 n \left[ \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \right] &= n \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i + \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \sum_{i=1}^n y_i - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i \\ &= n \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned}$$

$$\therefore a_0 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i}{n \left[ \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2 \right]}$$

$$\therefore a_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i}{\left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - n \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

17

يمكن للاختصار وضع :

$$a_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

ث

حي

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

**مثال :**

يعطي المتغير  $y$  بدلالة المتغير  $x$  كما في الجدول التالي أوجد الثوابت  $a_1$  ,

$a_0$  في معادلة التوفيق التالية  $y=a_1x+a_0$

| x | y |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |

**الحل :**

لإيجاد قيم  $a_0$  ,  $a_1$  نقوم بعمل الجدول التالي :

| x | y | X <sup>2</sup> | xy |
|---|---|----------------|----|
| 1 | 3 | 1              | 3  |

|                  |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2                | 5         | 4         | 10        |
| 3                | 7         | 9         | 21        |
| 4                | 9         | 16        | 36        |
| <b>Sum. = 10</b> | <b>24</b> | <b>30</b> | <b>70</b> |

وحيث أن  $n=4$  فإن :

$$a_1 = \frac{n \sum_{i=1}^4 x_i y_i - \sum_{i=1}^4 x_i \sum_{i=1}^4 y_i}{n \sum_{i=1}^4 x_i^2 - \left[ \sum_{i=1}^4 x_i \right]^2}$$

$$= \frac{4(70) - (10)(24)}{4(30) - (10)^2} = \frac{280 - 240}{120 - 100}$$

$$= \frac{40}{20}$$

$$\therefore a_1 = 2$$

$$a_0 = \frac{\sum_{i=1}^4 x_i y_i \sum_{i=1}^4 x_i - \sum_{i=1}^4 x_i^2 \sum_{i=1}^4 y_i}{\left( \sum_{i=1}^4 x_i \right)^2 - n \sum_{i=1}^4 x_i^2} = \frac{(70)(10) - (30)(24)}{(10)^2 - 4(30)}$$

$$= \frac{700 - 720}{100 - 120} = \frac{-20}{-20}$$

$$\therefore a_0 = 1$$

$$y = 2x + 1$$

وتكون المعادلة في الصورة



## □ قياس الأخطاء

### measuring errors

تحدث الأخطاء في أي تحليل عددي أثناء الحسابات وسوف نناقش تلك الأخطاء من

حيث :

1- مصادرها

2- تقديرها وقياسها

3- تقليلها للحد المطلوب

4- انتشارها خلال الحسابات .

## Sources of Errors

### 1- مصادر الأخطاء :

يمكن أن تنتج الأخطاء أثناء حل المشاكل الفيزيائية أو الهندسية من مصادر عدة .

أولاً : يمكن أن ينتج الخطأ عن نظام أو طريقة البرمجة .

ثانياً: يمكن أن ينتج عن اعتماد الموديل الرياضي على اقتراحات غير واقعية .

فمثلاً : يمكن أن يفترض مبرمج الكمبيوتر أن قوة الشد للعربة تتناسب مع سرعتها ،

لكن في الواقع هي تتناسب مع مربع سرعتها. يمكن أن يتسبب ذلك الخطأ في حدوث خطأ كبير في تعيين كفاءة العربة بغض النظر عن دقة المعادلات والطرق العددية المستخدمة في الحل.

ثالثاً: يمكن أن ينتج خطأ أيضاً بسبب وجود أخطاء في البرمجة نفسها أو في قياس الكميات الفيزيائية . لكن عملياً ، عند استخدامنا الطرق العددية لحل المعادلات نريد أن نركز على نوعين من الأخطاء .

1- Round – off error.

1- الخطأ الناتج عن وقف تكرار الأرقام بعد العلامة العشرية .

2- Truncation error.

2- الخطأ الناتج عن الاختصار للحدود الثلاثية .

ما هو الخطأ الناتج عن وقف التكرار

What is round off error ?

يستطيع الكمبيوتر أن يعبر عن الرقم بطريقة تقريبية فقط فمثلاً الرقم  $1/3$  يمكن أن يعبر عنه الكمبيوتر بـ  $0.333333$  وبالتالي يكون الخطأ التكراري في هذه الحالة هو

$$= \frac{1}{3} - 0.333333 = 0.00000033 + 3.3 \times 10^{-7}$$

كذلك يوجد أرقام أخرى لا يمكن التعبير عنها بشكل صحيح وهي  $\pi, \sqrt{2}$

ما هو خطأ الاختصار؟

What is truncation error ?

يعرف خطأ الاختصار بأنه الخطأ الناتج عن اختصار التعبير الرياضي .

على سبيل المثال ، مفكوك ماكلورين للدالة  $e^x$  يعطي في الصورة

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

ولهذه المتسلسلة عدد لانهاى من الحدود ، لكن عند استخدام هذه المتسلسلة لحساب  $e^x$

فإننا نستخدم عدد محدود من تلك الحدود . فإذا استخدمنا ثلاث حدود فقط فإن

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$$

ويكون خطأ الاختصار في هذه الحالة هو

$$\text{truncation error} = e^x - \left( 1 + x + \frac{x^2}{2!} \right) = \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

لكن كيف يمكن التحكم في truncation error في هذا المثال؟

للتحكم في الخطأ الناتج عن الاختصار يمكننا أن نستخدم ( relative

approximation error ) وذلك لمعرفة كم حد مطلوب استخدامه .

فإذا فرضنا أننا نريد حساب  $e^{1.2}$  باستخدام مفكوك ماكلورين maclaurin series فإن

$$e^{1.2} = 1 + 1.2 + \frac{1.2^2}{2!} + \frac{1.2^3}{3!} + \dots$$

بفرض أننا نريد أن يكون الخطأ في الحسابات أقل من 1% بحساب الأخطاء

نجد أن استخدام 6 حدود يجعل relative approximation error أقل من 1% .

أمثلة أخرى على Truncation error

يمكن لـ Truncation error أن يحدث في تعبيرات رياضية أخرى غير المتسلسلات

، فمثلا :

لإيجاد تفاضل دالة ، يمكن حسابه من :

$$f'(x) \cong \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

لكن نحت لا نستطيع استخدام  $\Delta x = 0$  لذلك تختار  $\Delta x$  صغيرة جدا بحيث يكون :

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

لذلك يحدث Truncation error هنا بسبب استخدام قيمة محددة لـ  $\Delta x$  بدلا من

$\Delta x = 0$  .

مثال :

$$\text{لإيجاد } f'(3) \text{ للدالة } f(x) = x^2$$

يمكننا حساب القيمة الحقيقية وذلك بإجراء التفاضل :

$$F(x) = x^2$$

$$\therefore F'(x) = 2x$$

$$= 2 \times 3$$

$$= 6$$

فإذا اخترنا  $\Delta X = 0.2$  وعوضنا في معادلة الفروق :

$$\begin{aligned} f'(3) &= \frac{f(3+0.2) - f(3)}{0.2} \\ &= \frac{f(3.2) - f(3)}{0.2} \\ &= \frac{10.24 - 9}{0.2} \\ &= \frac{1.24}{0.2} \\ &= 6.2 \end{aligned}$$

ويكون خطأ الاختصار هو :

$$\text{Truncation error} = 6 - 6.2 = 0.2$$

هل يمكن أن تقلل الخطأ باختيار قيمة أقل لـ  $\Delta X$ ؟

قد يحدث خطأ اختصار أيضا في التكامل العددي


مثال :

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

الحل المضبوط هو عبارة عن حساب المساحة تحت المنحني، لكن لعمل ذلك،

مطلوب حساب مساحة عدد لانهاى من المستطيلات الصغيرة، وذلك لا يحدث كما في

المثال ويسبب أننا لا يمكننا عمل ذلك فإننا نحصل على Truncation error مثال :



**بطريقة دقيقة وبطريقة ترتيبية :**

الطريقة الدقيقة :


$$\int_3^4 x^2 dx$$

$$\int_3^9 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_3^9$$

$$= \left[ \frac{9^3 - 3^3}{3} \right] = 234$$

الطريقة التقريبية ، إذا رسمنا مستطيلين لتقريب المساحة كما بالشكل ، مستطيلين

متساويين في العرض .



رسم يوضح قيمة تقريبية للمساحة تحت المنحني  $y=x^2$  من  $x=3$  حتى  $x=9$


فإن القيمة التقريبية للمساحة تكون :

$$\begin{aligned}\int_3^9 x^2 dx &= x^2 \Big|_{x=3} (9-3) + x^2 \Big|_{x=6} (9-6) \\ &= (3)^2 3 + (6^2) 3 \\ &= 27 + 108 \\ &= 135\end{aligned}$$

وبالتالي يكون Truncation error هو  $234-135=99$

هل يمكنك تقليل Truncation error باختيار عدد أكبر من المستطيلات كما هو

موضح بالشكل التالي ما هو الخطأ الناتج



رسم للعلاقة  $y=x^2$  يبين المساحة التقريبية تحت المنحني

من  $X=3$  حتى  $X=9$  باستخدام أربع مستطيلات .

الحل :

$$\begin{aligned}\int_3^9 x^2 dx &= (x^2)|_{x=3}^{4.5} + (x^2)|_{4.5}^6 + (x^2)|_6^{7.5} + (x^2)|_{7.5}^9 \\ &= (3)^2 \cdot 1.5 + (4.5)^2 \cdot 1.5 + (6)^2 \cdot 1.5 + (7.5)^2 \cdot 1.5 \\ &= 9 \cdot 1.5 + (20.25) \cdot 1.5 + 36 \cdot 1.5 + (56.25) \cdot 1.5 \\ &= 182.25\end{aligned}$$

ويكون الخطأ الناتج عن التقريب  $234 - 182.25 = 51.75$  وهو أقل مما سبق :

## Quantifying the error

## تقدير الخطأ

أولاً : الخطأ الحقيقي

الخطأ الحقيقي  $E_t$  هو الفرق بين القيمة الحقيقية ( وتسمى كذلك القيمة المضبوطة ) والقيمة التقريبية .

الخطأ الحقيقي = القيمة الحقيقية - القيمة التقريبية .

مثال :

يمكن حساب قيمة تقريبية لتفاضل الدالة  $f(x)$  عند قيمة  $x$  كالتالي :

$$f'(x) \cong \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

أو :



$$f'(x) \cong \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

فإذا كانت  $f(x) = 7e^{0.5x}$  ،  $h = 0.3$  أوجد ما يلي :

1- قيمة تقريبية ل  $f'(2)$

2- القيمة الحقيقية ل  $f'(2)$

3- الخطأ الحقيقي في  $(1)$  .

الحل : 1- قيمة تقريبية ل  $f'(2)$

$$f'(x) \cong \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

for  $x = 2$  and  $h = 0.3$

$$f'(x) = f'(2) \cong \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3}$$

$$= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3}$$

$$= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3}$$

$$= \frac{22.107 - 19.028}{0.3}$$

$$= 10.265$$

$$= 10.265$$

2- القيمة الحقيقية يمكن الحصول عليها بالتفاضل المباشر للدالة عند (2)

$$F(x) = 7e^{0.5x}$$

$$F'(x) = 0.5(7)e^{0.5x}$$

$$= 3.5e^{0.5x}$$

لذلك فإن القيمة الحقيقية ل  $f^1(2)$  تكون :

$$F^1(2)=3.5e^{0.5(2)}$$

$$= 9.5140$$

$$= 9.5140-10.265$$

$$= - 0.75101$$

4- الخطأ الحقيقي = القيمة الحقيقية- القيمة التقريبية

$$E_t = 9.5140-10.265$$

$$= - 0.75101$$

الخطأ الحقيقي لا يوضح ما إذا كان هذا الخطأ كبيراً أم لا فمثلاً إذا اخذت الدالة السابقة الشكل  $F(x)=7*10^{-6}e^{0.5x}$  فإن الخطأ الحقيقي في حساب  $f(2)$  عند نفس العناصر وهى  $x=2$  و  $h=0.3$  سوف يقل ويكون  $-0.75061*10^{-6}$  .

يقودنا ذلك إلى ما يعرف بنسبة الخطأ الحقيقي

**الخطأ الحقيقي النسبي ( نسبة الخطأ الحقيقي)**

**الخطأ الحقيقي النسبي ( نسبة الخطأ الحقيقي) = الخطأ الحقيقي /القيمة الحقيقية**

مثال : إذا كانت  $f(x)=7e^{0.5x}$  و  $h=0.3$  مستخدماً التقريب

$$f^1(x) \cong \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \text{ أوجد نسبة الخطأ الحقيقي عند } x=2$$

من المثال السابق نجد أن الخطأ الحقيقي

$$E_t = 9.5140-10.265$$

$$= - 0.75061$$

وحيث ان القيمة الحقيقية للتفاضل هي 9.5140

وبالتالي تكون نسبة الخطأ الحقيقي هي

$$- 0.0789 = E_t$$

يمكن التعبير عن  $E_t$  (نسبة الخطأ الحقيقي) كنسبة في المئ كما يلي :

$$E_t = -0.0789 \times 100\%$$

$$= -7.89\%$$

## الخطأ التقريبي Approximate Error

يتم حساب الخطأ الحقيقي ونسبة الخطأ الحقيقي كما سبق في حالة واحدة فقط

وهي حالة معرفة القيمة الحقيقية المقاسة . مثال ذلك لو انك تختبر برنامج مع وجود قيم

حقيقية تقارن بها مخرجات البرنامج .

لكن في معظم الأحيان لا تعرف القيمة الحقيقية . كما في حل المعدلات رقمياً نلجأ إلى

التقريب وبالتالي نريد معرفة الخطأ الناتج عن ذلك التقريب .

لذلك تحسب ما يعرف بـ الخطأ التقريبي

الخطأ التقريبي يعرف بأنه الفرق بين التقريب الحالي والتقريب السابق ويرمز له  $E_a$

Approximate Error = Present Approximation - Past

Approximation .

مثال : يعطي تفاضل دالة  $F(x)$  عند قيمة محددة  $X$  تقريبا بالعلاقة :

$$f1(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

فإذا كانت  $f(x) = 7e^{0.5x}$  وعند  $x=2$  أحسب

a-  $f^1(2)$  using  $h = 0.3$

b-  $f^1(2)$  using  $h = 0.15$

c- Approximate error for the value  $-f^1(2)$  for part (b)

الحل

( a ) التعبير التقريبي لتفاضل دالة هو :

$$f1(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

for  $x = 2$  and  $h = 0.3$

$$f1(z) = \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3}$$

$$= \frac{7 e^{0.5(2.3)} - 7 e^{0.5(2)}}{0.3}$$

$$= 10.265$$

(b) كرر الخطوات في a لكن عند  $h = 0.15$  ، تكون :

$$f1(2) = \frac{f(2.15) - f(2)}{0.15}$$

$$= \frac{7 e^{0.5(2.15)} - 7 e^{0.5(2)}}{0.15}$$

$$= 9.8799$$

(C) يكون الخطأ التقريبي  $E_a$  هو :

$E_a = \text{Present Approximation} - \text{Past Approximation}$

$$= 9.8799 - 10.265 = -0.38474$$

نجد أن الخطأ التقريبي لا يبين مدى سوء الخطأ . فمثلا ، الخطأ التقريبي

$$E_a = 0.38300 \text{ قد يبدو صغيرا ، لكن اذا اصحبت الدالة هي } 10^{-6}e$$

$$f(x) = 7 \times 0.5^x \text{ فإن الخطأ التقريبي لحساب } f^1(2) \text{ عند } h = 0.15 \text{ سوف يكون } 10^{-6}$$

$$E_a = -0.38474 \times 10^{-6} \text{ هذه القيمة للخطأ التقريبي أصغر . حتى لو أن المسألتين متشابهين}$$

في القيمة التي تم الحساب عندها  $x=2$  وقيمة  $h=0.15$  و  $h=0.3$  .

يقودنا ذلك إلى تعريف ما يسمى بـ

الخطأ التقريبي النسبي relative Approximate Error

Relative Approximate Error is denoted by  $E_a$  is defied as the ratio between the Approximate Error and the present Approximate .

الخطأ التقريبي

$$\frac{\text{الخطأ التقريبي النسبي}}{\text{التقريب الحالي}} =$$

التقريب الحالي

مثال يمكن حساب تفاضل دالة  $f(x)$  عند قيمة محددة  $\times$  تقريبا من العلاقة :

$$f^1(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

فإذا كانت  $f(x)=7e^{0.5x}$  أوجد الخطأ التقريبي النسبي لحساب  $f^1(2)$  باستخدام قيم  $h=0.15, h=0.3$ .

الحل : من المثال السابق وجدنا أن :

$$F1(2)=10.263 \text{ عند } h=0.3$$

وكذلك

$$F1(2)= 9.8800 \text{ عند } h= 0.15$$

الخطأ التقريبي  $E_a = \text{present approximate} - \text{previous Approximate}$  يكون

$$= 9.8800-10.265$$

$$= -0.385$$

وبالتالي فإن الخطأ التقريبي النسبي يكون : = الخطأ التقريبي / التقريب الحالي -

$$0.385/9.8800$$

$$\epsilon_a = -0.0389$$

يمكن كذلك التعبير عن الخطأ التقريبي النسبي كنسبة مئوية

$$\epsilon_a \% = -3.89\%$$

كذلك يمكن حساب القيمة المطلقة للخطأ التقريبي النسبي

$$\epsilon_a = 3.89\%$$

4- انتشار الخطأ Propagation of error

إذا أجريت الحسابات على أرقام ليست مضبوطة (بها أخطاء) فإن النتيجة الأخيرة سوف يكون بها خطأ . سوف نناقش هنا كيفية انتشار الخطأ في كل رقم وحيد عبر الحسابات ولنأخذ لذلك بعض الأمثلة .

مثال : أوجد حدود الخطأ عند جمع رقمين  $X$  و  $Y$  حيث:

$$X = 1.5 \pm 0.05$$

$$y = 3.4 \pm 0.04$$

بالنظر إلى الرقمين المطلوب جمعهما نجد أن أكبر قيمة ممكنة لهما هي

$$X = 1.55$$

$$Y = 3.44$$

وبالتالي فإن أكبر قيمة محتملة لمجموعهما هي :

$$X + y = 1.55 + 3.44 = 4.99$$

وكذلك تكون أقل قيمة محتملة للرقمين هما

$$X = 1.45, Y = 3.36$$

وتكون أقل قيمة لمجموعهما هي

$$X + Y = 1.45 + 3.36$$

$$= 4.81$$

وبالتالي يكون حد الخطأ لمجموعها هو

$$4.81 \leq X + Y \leq 4.99$$

يمكن إيجاد حد الخطأ للعمليات الحسابية الأخرى  $X-Y$ ,  $X/Y$ ,  $X*Y$  بنفس الطريقة

كيفية انتشار الخطأ في الدوال :

يفرض أن  $f$  دالة في عدة متغيرات  $(X_3, X_2, X_1)$  فإن أقصى خطأ محتمل في الدالة  $f$

يحسب من العلاقة :

$$\Delta f \approx \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \right|$$

مثال: الشد على عنصر طولي لمساحة المقطع تعطي من العلاقة :  $\epsilon = F/h^2 E$

حيث :

$F$  = القوة المؤثرة على عنصر الطول بالنوتين  $N$

$H$  = طول أو عرض مساحة المقطع بالمتر  $M$

$E$  = معامل ينج modulus بالباسكال  $Pa$

فإذا كانت

$$F = 72 \pm 0.9 \text{ N}$$

$$H = 4 \pm 0.1 \text{ mm}$$

$$E = 70 \pm 1.5 \text{ GPa}$$

فأوجد أقصى خطأ محتمل في الشد المقاس .

الحل :

يتم أولاً حسلب القيمة الصحيحة للشد أولاً وذلك بالتعويض في القانون بالجزء الصحيح

للمتغيرات :



$$\begin{aligned}\therefore \epsilon &= \frac{72}{(4 \times 10^{-3})^2 (70 \times 10^9)} \\ &= 64.286 \times 10^{-6} \quad Nm^{-2} Pa^{-1} \\ &= 64.286 \mu\end{aligned}$$

ثم يتم حساب أقصى خطأ من العلاقة :

$$\begin{aligned}\Delta \epsilon &= \left| \frac{\partial \epsilon}{\partial f} \Delta f \right| + \left| \frac{\partial \epsilon}{\partial h} \Delta h \right| + \left| \frac{\partial \epsilon}{\partial E} \Delta E \right| \\ \therefore \frac{\partial \epsilon}{\partial f} &= \frac{1}{h^2 E} \\ \frac{\partial \epsilon}{\partial h} &= -\frac{2f}{h^3 E} \\ \frac{\partial \epsilon}{\partial E} &= -\frac{F}{h^2 E^2} \\ \therefore \Delta \epsilon &= \left| \frac{1}{h^2 E} \Delta f \right| + \left| \frac{2F}{h^3 E} \Delta h \right| + \left| \frac{F}{h^2 E^2} \Delta E \right| \\ &= \left| \frac{1}{(4 \times 10^{-3})^2 (70 \times 10^9)} \times 0.9 \right| + \\ &\quad \left| \frac{2 \times 72}{(4 \times 10^{-3})^3 (70 \times 10^9)} \times 0.0001 \right| + \\ &\quad \left| \frac{72}{(4 \times 10^{-3})^2 (70 \times 10^9)^2} \times 1.5 \times 10^9 \right| \\ &= 5.3955 \times 10^{-6} \\ &= 5.3955 \mu\end{aligned}$$

وبالتالي تكون  $\epsilon = 64.286 \mu \pm 5.3955 \mu$

مما يدل على أن الشد الطولي تكون حدوده ما بين  $(58.8905 \mu, 69.6815 \mu)$

الخطأ الناتج من طرح قيم شبة متساوية قد يكون كبيرا جدا ، يمكن أثبات ذلك بنظرية

انتشار الخطاء .

مثال: بفرض

$$Z = x - y$$

$$\begin{aligned}\therefore |\Delta Z| &= \left| \frac{\partial Z}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial Z}{\partial y} \Delta y \right| \\ &= |(1)\Delta x| + |(-1)\Delta y|\end{aligned}$$

وبأخذ القيم المطلقة

$$= |\Delta x| + |\Delta y|$$

وبالتالي فإن التغير النسبي المطلق يكون :

$$\left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{|x - y|} \rightarrow *$$

فإذا كانت  $x$  ،  $y$  قريبة من بعضها البعض فإن المقام يصبح صغير جداً بالنسبة للبسط

وبالتالي يتفاقم الخطأ .

مثال :

$$X = 2 \pm 0.001$$

$$Y = 2.003 \pm 0.001$$

$$\therefore \left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|0.001| + |0.001|}{2 - 2.003}$$

$$= 0.6667$$

$$= 66.67\%$$

والحمد لله رب العالمين ،،،

كلية العلوم  
قسم: الفيزياء

توصيف مقرر دراسي  
للعام الاكاديمي 2015/2014

| 1- بيانات المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| الفرقة / المستوى: الثالث                                                                                                                                                                                                                                                         | اسم المقرر: استخدام الحاسب الالى فى الفيزياء (i) | الرمز الكودي<br>351 ف     |
| نظري ( 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد الوحدات الدراسية<br>عملي ( 3 )               | التخصص:<br>الفيزياء       |
| يهدف هذا المقرر بنهايه الفصل الدراسي الي :<br>4- ان يكون الطالب قادرا على جمع وتحليل وتقديم البيانات باستخدام الأشكال والتقنيات الملائمة من خلال استخدام الحاسب فى الحصول على نقطة بينية ونقطة طرفية وعلى انسب تمثيل للقياسات الفيزيائية بطريقة المربعات الصغرى وبالذقة المطلوبة |                                                  | 2- هدف المقرر:            |
| 3- المستهدف من تدريس المقرر                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                           |
| بنهايه الفصل الدراسي يكون الطالب قادرا علي ان :<br>أ1- يتعرف علي الفروق الامامية والخلفية والمتوسطة<br>أ2- يذكر طرق الحصول على نقطة بينية عدديا<br>أ2- يذكر طرق الحصول على انسب تمثيل للقياسات الفيزيائية                                                                        |                                                  | أ المعلومات<br>والمفاهيم: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>ب - المهارات<br/>الذهنية:</p> <p>بنايه الفصل الدراسي يكون الطالب قادر علي ان :<br/> 1- يفرق بين الفروق الامامية والفروق الخلفية.<br/> 1- يفرق بين الفروق المتوسطة والفروق الامامية .<br/> 1- يقارن بين انواع الاستنتاج المختلفة لنقطة بينية.<br/> 1- يميز الطرق المختلفة لحساب قيمة عدم التاكيد في القراءات .<br/> 5- يستنتج طريقة المربعات الصغرى</p> |  |
| <p>ج - المهارات<br/>المهنية<br/>الخاصة بالمقرر:</p> <p>بنايه الفصل الدراسي يكون الطالب قادر علي ان :<br/> 5- يستخدم طريقة لاجرانج لحساب نقطة بينية.<br/> 5- يستخدم طريقة نيوتن وطريقة شتيرننج لحساب نقطة بينية.<br/> 6- يستخدم طريقة المربعات الصغرى للحصول على افضل تمثيل بياني للقياسات الفيزيائية</p>                                                  |  |
| <p>د - المهارات<br/>العامة:</p> <p>بنايه الفصل الدراسي يكون الطالب قادر علي :<br/> 4- التواصل الجيد من خلال المناقشات داخل قاعة المحاضرات.</p>                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>4- محتوى<br/>المقرر:</p> <p>الطرق العددية لحساب نقطة بينية <b>interpolation</b><br/> ونقطة طرفية لنتائج عملية - الطرق العددية للتمثيل<br/> الدالي <b>Extrapolation</b> لنتائج عملية <b>Data</b><br/> <b>.fitting</b></p>                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| المحاضرات<br>المناقشات<br>الدروس العملية<br>حل مسائل وتمارين                                                        | 5- اساليب التعليم<br>والتعلم                                   |
|                                                                                                                     | 6- اساليب التعليم<br>والتعلم للطلاب<br>ذوي القدرات<br>المحدودة |
| 7- تقويم الطلاب :                                                                                                   |                                                                |
| امتحانات اعمال سنة<br>امتحان شفوي<br>امتحان العملي<br>امتحان نهاية العام                                            | أ- الاساليب<br>المستخدمة                                       |
| أعمال سنه : الأسبوع ال 8<br>أعمال سنه : الأسبوع ال 14<br>امتحان عملي : الأسبوع ال 15<br>امتحان نظري : الأسبوع ال 16 | ب - التوقيت                                                    |
| أعمال سنه : 10%<br>شفوي: 10%<br>امتحان عملي : 20%<br>امتحان نظري : 60%                                              | ج - توزيع<br>الدرجات                                           |
| 8- قائمة الكتب الدراسية والمراجع                                                                                    |                                                                |
| مذكرات القسم                                                                                                        | أ- مذكرات                                                      |

|                                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>krylov,nikolai.sergeevich. works on the foundations of statistical physics/ princeton university press ,</b> | <b>ب - كتب ملزمة</b>                     |
|                                                                                                                 | <b>ج - كتب مقترحة</b>                    |
| <b>لا يوجد</b>                                                                                                  | <b>د - دوريات علمية او نشرات ... الخ</b> |

منسق المقرر: د/خلف الله عمر قاسم  
 رئيس مجلس القسم: د/خالد بن الوليد عبد الفتاح  
 التوقيع: التاريخ: 2015/7/1