


علوم بиولوجية (علم الحيوان) 1



للفرقة الأولى عام أحياء و الفرقة الأولى أساسى علوم

كلية التربية بالغردقة (2022/2023)

خلية و انسجة و فسيولوجي

إعداد/ الدكتورة زينب عبدالخالق

رؤية الكلية

تسعى الكلية الى مساعدة الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال أن تكون واحدة من الكليات المتميزة و المنافسة داخلياً و خارجياً في التعليم و خدمة المجتمع و البحث العلمي من خلال تحقيق مستوى رفيع من الأداء و تقديم خريج متميز يقابل الاحتياجات المتعددة لسوق العمل المحلي و العالمي.

رسالة الكلية

تهدف كلية التربية بالغردقة الى التميز من خلال :

- اعداد المربيين و المعلمين المتخصصين و القادة في مختلف التخصصات التربوية.
- تنمية القدرات المهنية و العلمية للعاملين في ميدان التربية و التعليم بتعريفهم بالاتجاهات التربوية الحديثة.
- اجراء البحث و الدراسات في التخصصات التربوية المختلفة بالكلية.
- نشر الفكر التربوي الحديث و اسهاماته لحل مشكلات البيئة و المجتمع.
- تبادل الخبرات و المعلومات مع الهيئات و المؤسسات التعليمية و الثقافية.
- تنمية جوانب شخصية الطلاب و رعاية الموهوبين و المبدعين.

الفهرس

| الصفحة | الموضوع |
|--------|-----------------------------------|
| 4 | مقدمة |
| 6 | باب الأول (الخلية و مكوناتها) |
| 7 | الخلية |
| 30 | انقسام الخلية |
| 43 | باب الثاني (أنسجة الجسم) |
| 45 | النسيج الطلائي |
| 57 | النسيج الضام |
| 83 | النسيج العضلي |
| 87 | النسيج العصبي |
| 92 | باب الثالث (أجهزة الجسم المختلفة) |
| 93 | الجهاز العضلي |
| 111 | الجهاز الهضمي |
| 134 | الجهاز الدوري |
| 154 | الجهاز التنفسـي |
| 168 | الجهاز الإخراجـي |
| 179 | الجهاز العصبي |
| 203 | الجهاز الهرمونـي |
| 230 | المراجع |

مقدمة

علم الحيوان

هو العلم الذى يتضمن دراسة شكل و عالم الحيوان Zoology بنىاء ووظائف الحيوان و طرق تكاثره و انتقال صفاتة الوراثية فى الاجيال المتعاقبة ، كما يتضمن دراسة مختلف العلاقات بين الانواع الحديثة منه و الانواع البائد، و بينها و بين البيئة المحيطة بها. ويعرف العلم الذى يتضمن نفس النواهى فى النبات بعلم النبات Botany .

و يشكل علم الحيوان والنبات معا ما يعرف بعلم الحياة أو البيولوجى Biology.

و يتضمن علم الحيوان بصورة عامة الافرع الآتية:
علم الشكل الظاهرى أو المورفولوجي Morphology
علم الانسجة أو الهستولوجى Histology
علم وظائف الاعضاء أو الفسيولوجى Physiology
علم الاجنة أو الامبريبولوجى Embryology

علم الوراثة Genetics

علم البيئة أو الايكولوجى Ecology

علم التصنيف Taxonomy

علم الاحافير أو الاحياء البائدة Paleontology

Parasitology و هناك افرع اخرى

Cytochemistry Protozoology ”.

و غيرها. “Histochemistry”

الباب الأول

الخلية

اولاً: الخلية The Cell

هى وحدة البناء و التركيب للكائنات الحية لها العديد من الأشكال، وهى عبارة عن كتلة بروتوبلازمية حية يحيط بها غشاء خلوى وبها نواه.

دور العلماء في اكتشاف الخلية

- 1- العالم الانجليزي (روبرت هوك)**
صنع لنفسه ميكروسكوباً في القرن 17م
فحص بعض الأنسجة النباتية كالفلين الذي يغطي سوق الأشجار، فوجدها تتكون من فراغات تشبه قرص شمع نحل العسل، وسمى كل منها خلية. أول من أطلق لفظ الخلية..
- (2 - العالم الهولندي (ليفهوك روبرت هوك)**
صنع لنفسه ميكروسكوباً قوة تكبيره أكبر من ميكروскоп
فحص بعض الأنسجة الحيوانية المختلفة ، أظهر نفس نتائج على لكن هوك الحيوان..
- (3- عالم النبات الألماني (شليدين)**
قام بفحص التركيب التشريحي للنبات، واستنتج أن " جميع الأنسجة النباتية تتكون من كتل منتظمة من الخلايا ويعتبر شليدين مؤسس النظرية الخلوية (التي تدعى إلى أن الخلية هي الوحدة البنائية الرئيسية لكل الكائنات الحية)

4- عالم الحيوان (شوان)

توصل إلى أن الأنسجة الحيوانية تتكون من خلايا (يشبه نفس النتائج التي توصل إليها العالم شليدين بالنسبة لأنسجة النبات)

5- العالم الألماني (فيرشو)

أكَدَ على أن الخلية هي وحدة الوظيفة، بالإضافة إلى أنها وحدة البناء في الكائن الحي. أن الخلايا الجديدة لا تنشأ إلا من خلايا موجودة بالفعل من قبل (أي أن الحيوان نشا من حيوان والنبات نشا من نبات)

() عالم النبات براون-6


هو عالم نبات تمكَنَ فِي القرن 19 م | من رؤية جسم كروي الشكل بوضوح فِي وسط الخلية سمَّاه النواة، ويُعتبر هو أول من أكتشف النواة.

النواة تحوي المادة الوراثية التي تنقل خصائص معينة من الخلية الأم (عند انقسامها) إلى الخلايا الجديدة.

النظرية الخلوية

أدت الأفكار التي توصل إليها كل من العلماء شليدين وشوأن وفيرشو إلى بلورة النظرية الخلوية التي تتلخص فيما يلي:

- *-يتكون جسم الكائنات الحية من خلية واحدة أو من عدة خلايا.
- *-الخلايا متشابهة في تركيبها وفي مكوناتها الأساسية. ومختلفة في الشكل لاختلاف وظائفها.
- *-جميع الخلايا تقوم بأنشطة تبقى على حياتها وحياة الكائن الحي بأكمله.
- *-جميع الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا سابقة لها عن طريق الانقسام.



1-النوية 2- النواه 3- الريبوسوم 4- حويصل

5- شبكة اندوبلازمية خشنہ 6- جهاز جولجي 7- غشاء
الخلية

8- شبكة اندوبلازمية ناعمة 9- ميتوكوندريا 10- فجوة


11- سیتوبلازم 12-اللیسوسوم 13- السنتریول (الجسم
المرکزی)

تركيب الخلية

غشاء الخلية أو الغشاء البلازمي .

تحاط الخلية الحيوانية من الخارج بغشاء رقيق مرن يتراوح سماكه بين 7,5-10 نانومتر ويشتمل على 55% بروتينات و 25% فوسفوليبيدات و 13% كوليستيرول، 4% ليبيدات أخرى هذا بالإضافة إلى 3% مواد كربوهيدراتية مرتبطة بالبروتينات والليبيدات من الخارج

ليبيدات غشاء الخلية



إن التركيب الأساسي لغشاء الخلية هو طبقتان من الليبيدات ويتخللها بعض من جزيئات البروتين . ومعظم

الليبيات فى أغشية الخلايا عبارة عن جزيئات من الفوسفوليبيديات وكولستيرول ، وجزء من هذه الجزيئات يذوب فى الماء بينما يذوب الجزء الآخر منها فى الدهون وفي مذيبات الدهون وتعتبر طبقتا الليبيات فى الغشاء الخلوي حاجزاً يعمل على عدم نفاذية المواد التى تذوب فى الماء مثل الأيونات والجلوكوز والبولينا وغيرها ، ومن ناحية أخرى فإن المواد التى تذوب فى الدهن مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والكحول تستطيع اختراق هذا الجزء من الغشاء بسهولة .

بروتينات غشاء الخليه

إن غشاء الخليه يشتمل على جزيئات بروتينية كبيرة الحجم ، وهناك نوعان من البروتينات : النوع الأول يسمى البروتينات المندمجة حيث يمتد معظمها خلال الغشاء من الخارج ، فى حين أن البعض الآخر يخترق فقط جزءاً من الغشاء ، والنوع الثانى يطلق عليه اسم البروتينات السطحية (الطرفية) لكونه موجوداً فقط على السطح الداخلى للغشاء .

وكمثال من البروتينات المندمجة تكون قنوات (أوتقوب) تسمح بمرور المواد الذائبة فى الماء وخاصة الأيونات والتى يسهل انتشارها من وإلى الخليه ، كما ان لبعض من البروتينات المندمجة وظيفه الناقل للمساعدة فى مرور المواد خالل أغشية الخلايا وخاصة المواد التى لا تذوب فى الدهون وحجمها أكبر من الفتحات

الموجودة في الغشاء . هذا بالإضافة إلى أن بعض البروتينات السطحية غالبا ما تكون موجودة على السطح الداخلي للغشاء وعادة تكون مرتبطة بالبروتينات المندمجة ووظيفتها الأساسية أنزيمية .

كربوهيدرات غشاء الخلية

من الملاحظ أن أغشية الخلايا تحتوى على كميات قليلة من الجزيئات الكربوهيدراتية والتى تتكون من سلسل قصيرة من السكريات الأحادية وهى تكون مرتبطة فى الغشاء مع البروتينات وتسمى الجليكوبروتينات أو مع الليبيدات وتسمى الجليكوليبيدات ومعظم هذه الجزيئات تحمل شحنات سالبة ولها دور فى ارتباط الخلايا مع بعضها ، كما أن بعض هذه الجزيئات يلعب دورا فى التفاعلات المناعية .

لكى تبقى أية خلية حية يجب أن يستمر المواد المختلفة بين الخلية ومحيطها الخارجى المعروف بأسم السائل بين الخلوي والذى يطلق عليه عادة سائل خارج الخلية وتوقف هذا التبادل معناه موت الخلية . ويتم انتقال المواد المختلفة من وإلى الخلية عبر الغشاء البلازمى المحيط بالخلية والذى يتحكم بشكل فعال فى هذا التبادل . وتعتمد خواص نفاذية الغشاء على تركيب الغشاء نفسه من جهة وعلى خواص المواد النافذة من جهة أخرى وبصفة عامة يمكن وصف غشاء الخلية بأنه غشاء اختيارى بمعنى أنه يسمح بمرور مواد معينة وبدرجات مختلفة ولا يسمح بمرور مواد أخرى . حيث إن الوظيفة الأساسية للغشاء الخلوي هى تنظيم مرور المواد بين الخلية والوسط الذى

يحيط بها . و هنا تجدر الاشارة إلى بعض النقاط الرئيسية حول علاقـة الخلـية بالـمحـيط الـخارـجي من حيث تركـيز المـواد .

في أغلـب الأـحيـان لا تـسـاوـى تركـيزـيـة مـادـة دـاخـلـ الخلـية مع تركـيزـها خـارـجـ الخلـية .

يوجـد تـبـادـل مـسـتـمر بـيـنـ الخلـية وـما حـولـها بـتـناـولـ مـعـظـمـ المـوـادـ وـلـكـنـ الخلـيـةـ تـبـقـىـ فـىـ حـالـةـ اـتـرـازـ دـيـنـامـيـكـ طـوـالـ الـوقـتـ وـيـفـقـدـ هـذـاـ اـتـرـازـ بـسـرـعـةـ بـعـدـ مـوـتـ الخلـيـةـ .

قد تـتـغـيـرـ خـواـصـ نـفـاذـيـةـ الغـشـاءـ مـنـ وـقـتـ لـآـخـرـ إـمـاـ تـحـتـ ظـرـوفـ فـسيـولـوـجـيـةـ مـعـيـنةـ أوـ لـأـسـبـابـ مـرـضـيـةـ .

إنـ الغـشـاءـ الـبـلـازـمـيـ الذـىـ يـحـيـطـ بـالـخـلـيـةـ شـدـيدـ النـفـاذـيـةـ للـمـاءـ بـيـنـماـ نـفـاذـيـةـ الغـشـاءـ لـمـوـادـ المـذـابـةـ لـهـاـ درـجـاتـ مـتـفـاـوـتـةـ .ـ فـبـعـضـ الـجـزـيـئـاتـ تـسـتـطـيـعـ أـنـ تـخـتـرـقـ غـشـاءـ الـخـلـيـةـ بـسـهـوـلـةـ كـبـيرـةـ ،ـ فـىـ حـيـنـ أـنـ بـعـضـ الـمـوـادـ الـأـخـرـىـ لـاـ تـسـتـطـيـعـ الـعـبـورـ خـلـالـهـ إـطـلاـقـاـ .ـ وـأـهـمـ الـعـوـاـمـلـ الـمـحـدـدـةـ نـفـاذـيـةـ الغـشـاءـ لـمـوـادـ المـذـابـةـ هـىـ :

قابلـيـةـ ذـوبـانـ المـادـةـ فـىـ مـذـبـيـاتـ الـدـهـونـ .ـ الـوزـنـ الـجـزـيـئـيـ لـلـمـادـةـ .ـ

الـشـحـنـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ عـلـىـ الجـزـئـيـةـ أوـ الـأـيـونـ .ـ وـلـوـتـحـدـثـاـ عـنـ طـرـقـ اـنـتـقـالـ الـمـوـادـ خـلـاـيـاـ أـغـشـيـةـ الـخـلـاـيـاـ نـجـدـ أـنـ هـنـاكـ ثـلـاثـ طـرـقـ

رـئـيـسـيـةـ هـىـ :

الـإـنـتـشـارـ

الـنـقـلـ النـشـطـ

الابتلاع و الطرد الخلوي

1-الانتشار

الانتشار يعنى انتقال الجزيئات والأيونات من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل بدون استهلاك الطاقة . ويوجد ثلات طرق الانتشار هى :

(أ)الانتشار البسيط

وهذا يعنى انتقال الجزيئات من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل بدون استخدام ناقل بروتينى وأيضا بدون استهلاك طاقة ، حيث يتم الانتشار إما عن طريق الفتحات الموجودة فى الغشاء الخلوي ، وذلك للمواد القابلة للذوبان فى الماء ويشترط أن يكون حجم هذه الجزيئات أصغر من قطر الفتحات على الغشاء وهذا في حالة ذوبان هذه الجزيئات في الدهون مثل الهرمونات الاستيرودية ولقد وجد أن هناك علاقة طردية واضحة بين قابلية ذوبان المادة في مذيبات الدهون وسهولة انتشارها من خلال أغشية الخلايا .

(ب) الانتشار المسير

الانتشار المسير هو انتقال الجزيئات التي لا تذوب في الدهون وأيضا لا يستطيع المرور من خلال فتحات الغشاء ؛ ولذا تحتاج إلى مساعدة ناقل بروتينى يكون ضمن بروتينات الغشاء لكي ييسر هذه الجزيئات ذهابا وإيابا عبر الغشاء الخلوي وذلك طبقا لحاجة الخلية . ومن هنا يشترط وجود مكان لارتباط الجزيئ

على الناقل ، وب مجرد أن يتم الارتباط بين الجزء والناقل البروتيني يحدث تغير في شكل الناقل البروتيني وعندئذ ينتقل الجزء إلى الناحية الأخرى من الغشاء ؛ ولذا يترك الناقل الذي يعود شكله إلى الوضع الأول لكي يلتقط جزيئات أخرى . ومثال ذلك انتقال جزيئات الفراكتوز من خارج الخلية إلى داخلها.

(ج) الأسموزية

الأسموزية هي حالة خاصة من انتشار مرتبطة بمرور الماء عبر الغشاء البلازمى الذى هو شديد القاذية للماء من خلال الثقوب الموجود فيه . ودراسة نفاذية غشاء الخلية ثبت أن هناك باستمرار تدفقاً للماء إلى خارج الخلية ولكن فى معظم الأحيان يتساوى تماماً التدفق نحو الداخل مع التدفق نحو الخارج بحيث إن صافى تدفق الماء يكون صفرآ . ومعنى هذا أن الخلية فى الحالات الطبيعية فى اتزان مائى مع الوسط المحيط بها ، لكن إذا تعرضت الخلايا إلى محلول أكثر تركيزاً من محتوياتها فإنها تفقد كمية من الماء فتنكمش وتصاب بالجفاف . وبالعكس عندما تتعرض الخلايا إلى محلول أقل تركيزاً من محتوياتها فإنها تكتسب كمية من الماء وتتنفس وقد تنفجر . والقوة التى تدفع الماء إلى الانتقال تسمى الضغط الأسموزى وكلما زاد الفرق فى

التركيز بين داخل وخارج الخلية زاد الضغط الأسموزي . والخلايا في الحالات الطبيعية تكون محاطة في الجسم بالسائل البيئي الذي يكون متساوياً أسموزياً مع الخلايا ، وبالتالي فإنها لا تكتسب الماء أو تفقد بكميات ملحوظة .

النقل النشط

يمكن تعريف النقل النشط بأنه انتقال الجزيئات والأيونات من التركيز الأقل إلى التركيز الأعلى أي ما يسمى الأنتقال عكس فرق التركيز وذلك عن طريق ارتباط المواد المنقولة بالبروتين الناقل الموجود على غشاء الخلية باستخدام مصدر للطاقة وهو جزيئات الأدينوزين ثلاثي الفوسفات

ويوجد نوعان من النقل النشط هما :

أ-النقل النشط الأساسي

ب-النقل النشط الثانوى

أ-النقل النشط الأساسي

ومن أمثلة هذا النوع من النقل النشط انتقال ايونات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد وبعض

السكريات الأحادية الأمينية ، حيث إن أي مادة من هذه المواد يتم انتقالها بسهولة من التركيز الأقل إلى التركيز الأعلى في وجود الناقل المناسب لها على غشاء الخلية . وفيما يلى شرح تفصيلي لانتقال أيونى الصوديوم والبوتاسيوم عكس فرق التركيز ، وهذا ما يعرف باسم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم

من المعروف أن تركيز الصوديوم خارج الخلايا أعلى من تركيز داخل الخلايا والعكس بالنسبة للبوتاسيوم حيث يكون تركيزه داخل الخلايا أعلى من تركيزه خارج الخلية عند التعرض لمؤثر ما يحدث العكس حيث ينتقل الصوديوم إلى خارج الخلية وفي نفس الوقت يندفع البوتاسيوم من الخارج إلى الداخل ، وذلك عكس فرق التركيز بالنسبة لكل أيون على حدة ، وتوجد هذه الآلية في كل خلايا الجسم .

الابتلاء وطرد الخلوي

الالتئام الخلوي
Endocytosis

دخول الأجسام الكبيرة والمواد الصلبة إلى داخل الخلية بتكوين انغماد بالغشاء البلازمي يتحول تدريجياً إلى فجوة : ويشمل البلعمة والشرب الخلوي.

الإخراج الخلوي Exocytosis طرح المواد خارج الخلية بتكوين أكياس خاصة تتحد مع الغشاء البلازمي وقدف محتوياتها خارج الخلية.

النواه :

النوه تعتبر مركز التحكم أو السيطرة فى الخلية وتظهر النواه كجسم كروى قائم ، لكن شكل النواه يحدد الشكل العام للخلية فهى كروية الشكل بالخلايا المستديرة ، وبضاويبة الشكل فى الخلايا المستطيلة أو غير منتظمة كما فى انوية كريات الدم البيضاء ، وتتوسط النواه عادة الخلية فى الخلايا الحيوانية كلها تبدو جانبية الموضع فى خلايا العضلات الهيكيلية وتعتبر النواه أكبر عضيد بالخلية ويمكن مشاهدتها بسهوله خاصة عند إضافة الصبغات المناسبة كصبغة اليود ويختلف عدد الانوية

(النواه فى الخلية) لكنها نواه واحده فى الاحوال العاديه . ويمكن وجود أكثر من نواه داخل الخلية كما فى الألياف العضلية فى وقد تفقد الخلية نوتها فى أحد مراحل تطورها كما فى كريات الدم الحمراء لمعظم الثدييات بما فيها الإنسان وتعتبر النواه عادة أكبر العضيات الخلوية فى الخلية وتحتوى على الحامض النووي وهو المادة الوراثية التى تنظم تركيب ووظائف الخلية والنواه الخلية وهى مركز السيطرة والتحكم فى الخلية حيث أن الموجود فى النواه يحتوى على التعليمات اللازمه لكل وظائف الخلية وكل الخلايا تحتوى على نفس الموجود بالخلايا الاخرى ، لكن كل خلية تستخدم جزء فقط من هذا ال DNA تبعاً لوظائفها البيولوجية وهذا هو السبب اختلاف وظائف الخلايا فالخلية العضلية تستخدم جزء من ال DNA (المعلومات الوراثية) مختلفه مثلاً عن الجزء من DNA الذى تستخدمه الخلية الكبدية مثلاً ويحدث هذا التبديل الانتقائى لجزء من المادة الوراثية DNA فى الخلية خلال مرحلة تشكيل الخلايا .

وتكون النواه من أربعة أجزاء هي:

الغلاف النووي :- هو غلاف يحيط بالنواه يقوم بحفظ محتوياتها ويعزل محتويات النواه عن السيتوبلازم ويوجد بالغلاف النووي ثقب صغيرة جداً تسمى الثغور النووية وهذه الثقب تسمح بالإتصال بين محتويات النواه والسيتوبلازم . ومن ثم فهى تعمل على تنظيم حركة المواد والأيونات بين النواه والسيتوبلازم حيث تسمح للمواد بالدخول من وإلى النواه . وتحاط النواه بغشاء مزدوج عبارة عن غشائين غشاء داخلى وأخر خارجى . ويتصل الغشاء النووي بالغشاء الخلوي عن طريق قنوات وممرات الشبكة الإندوبلازمية.

السائل النووي :- ويكون من مواد عضوية وبروتينات وسكريات وإنزيمات مكونة مادة شبة سائلة تملأ النواه وتتغمر فيها كل محتويات النواه وتنفصل بالسيتوبلازم عن طريق الثقب الموجودة بالغلاف النووي .

النوية :- توجد نوية أو أكثر داخل النواه وهى كروية الشكل صغيرة وتحتوى على نسبة عالية من الحامض النووي RNA والبروتينات وبالتالي فهى ذات علاقة أكيدة بتكوين الريبيوسومات . وهذه الريبيوسومات لازمه لتكوين البروتينات فى الخلية والنويات عبارة عن

عصيات مؤقتة توجد في أنوية الخلايا في الفترات ما بين انقسام الخلايا ومظهرها صغير كاجسام كثيفه تحت الميكروскоп الالكتروني (الصورة المجهرية الالكترونية) والنووية عبارة عن مناطق من RNA والناتج عن الناتج النووي تسمى RNA الريبوسومي لأنه يتحد مع البروتينات خاصة لتكوين الريبوسومات والريبوسومات عبارة عن عصيات خلوية لا تحاط بجدار وظاهر حبيبات صغيرة داكنة في الصور المجهرية الإلكترونية ، وتلعب دور هام في تخليق البروتين ويكون الريبوزوم من واحدين يحتوى كل منها على RNA وبروتين وتدخل هذه الوحدات إلى السيتوبلازم عن طريق الثغور في غشاء النواه .

الشبكة الكروماتينية

الشبكة الكروماتينية هي عبارة عن خيوط رفيعة متشابكة مع بعضها البعض وتبدو كشبكة أحياناً. والخيوط عبارة عن الكروموسومات وت تكون مادة DNA، ويمكن مشاهدتها بوضوح تحت عدسة المجهر خاصة في حالة انقسام الخلية وحيث تقوم بدور

رئيسي في إقسام الخلية ، وداخل الخلية توجد الكروموسومات وهي عددها ثابت بالنسبة للنوع الواحد فهى 46 كروموسوم في الخلايا الجسمية للإنسان و 40 كروموسوم للفأر. ومما يتضح أن النواه هي مركز السيطرة على الخلية وترجع أهميتها إلى وجود المعلومات الوراثية كاملة في الحامض النووي DNA الموجود بداخلها حيث كل جزء فيه عبارة عن جين مسؤول عن صفة من صفات الكائن الحي كما يقوم ينقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء ومن خلية لأخر. كما أنها تعطى أوامر بإنتاج بروتينات تركيبية لازمه لبناء الخلية وأخرى وظيفية وهي الهرمونات والإنزيمات وهي لازمة لقيام الخلية بوظائفها.

السيتوبلازم :

وهو المادة المحصورة بين غشاء الخلية والنواه وهو عبارة عن مادة بروتوبلازمية تنغمر فيها النواه والأجزاء الأخرى (العضيات) وهي الميتوكوندريا – الشبكة الاندوبلازمية وأجسام جولجي والرايبوزمات والليسوسومات والستريولات ويوجد في السيتوبلازم أيضا تراكيب خلوية غير حية توجد في شكل

حبّيات إفرازية أو حويصلات إفرازية أو حبيبات مخزونة مثل الجليكوجين وحبّيات دهنية وصبغات.

العضيات

١-الميتوكوندريا

إن كل خلية من خلايا الجسم تحوى مئات الميتوكوندريا والتي تعد مصانع توليد طاقة الخلايا حيث تزود الخلايا (وبالتالى الأنسجة والأعضاء والجسم ككل) بالطاقة التي تحتاج إليها لتأديب وظائفها. ويطلق عادة على الميتوكوندريا بيوت الطاقة الخاصة بالخلية وهي على شكل خيوط رفيعة بيضاوية أو كروية وتوجد داخل سيتوبلازم كل الخلايا حية وتحتوى على غشاءين أحدهما خارجى والأخر داخلى ذو ثنياً أو بروزات وهذا الغشاء يحيطان فراغين: الفراغ الأول يقع بين الغشاءين والفراغ الثانى يكون بين الغشاء الداخلى حيث تخترقه البروزات. وتحتوى الميتوكوندريا على أكثر من 70 أنزيمًا ومساعد أنزيم بالإضافة إلى فيتامينات ومعادن ضرورية للوظائف التي تقوم بها الميتوكوندريا وخاصة الأنزيمات التنفسية وذلك للمساعدة فى عمليات الأكسدة وانطلاق الطاقة داخل الخلايا.

ويوجد فى كل واحدة من الميتوكوندريا كثيرا من الجزيئات الحامض النووى الذى أوكسى ريبوزى (الدنا) والتى تضم عددا من الجينات لها علاقة بتوليد الطاقة . وتورث طفرات جينات الميتوكوندريا من قبل الأم فقط . وعلى ذلك فقد اتضح أن الميتوكوندريا فى الحيونات كافة تحتوى على جيناتها الخاصة بها . ومن هنا فإن باحثى الطب الشرعى قد توصلوا إلى طريقة مقارنة شديدة الدقة للاستفادة منها فى تحديد هوية أشلاء الجنود الذين فدوا المعارك وأيضا المفقودون حوادث الطائرات وغيرها . هذا بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان التهم فى ارتكاب جريمة ما مذنبا أم لا . ويجرى العلماء الاختبار بمقارنتهم تسلسلات أزواج القواعد النتروجينية فى جزيئات الدنا الموجودة فى الميتوكوندريا . وما زال من الأفضل إجراء المقارنة بجزيئات الدنا الموجودة داخل نواة الخلية فى حالة توافر كمية كافية منه ؛ ذلك لأنه يساعد على إقامة أوجه تماثل أو تقاوٍت واضحة ؛ ولكن فى كثير من الحالات تفترق الأنسجة التاحية إلى الحامض النووى الموجود داخل أنوية الخلايا لكي يصلح للتحليل (مثل خصلة شعر أو العظام الصلبة وكذلك الأسنان) بينما هذه الأنسجة تحوى كميات وفيرة من الدنا فى الميتوكوندريا .

2- جهاز جولجي :

لقد أوضحت الدراسات باستخدام المجهر الإلكتروني أن جهاز جولجي عبارة عن أغشية ملساء الأسطح تكون انبباب أو تجاويف مستديرة متصلة بها العديد من الحويصلات ، ويوجد في معظم خلايا الجسم ويلعب دورا هاما في أيض الخلية ، والدور الرئيسي للجهاز جولجي يظهر بوضوح في الخلايا التي لها وظيفة إفرازية حيث يقوم بتجميع وتغليف وأيضا تخزين النواتج الإفرازية على شكل حويصلات لحين انطلاقها . فمثلا يتم تصنيع البروتينات في الشبكة الإندوبلازمية الخشنة والتي تنتقل إلى جهاز جولجي حيث يتم تجميعها وتغليفها داخل أغشية لتكوين حويصلات إفرازية .

3- الشبكة الندوبلازمية:

تظهر الشبكة الندوبلازمية على هيئة أغشية رقيقة وتكاد تملأ المسافة من السيتوبلازم بين غشاء الخلية وغلاف النواه . ويوجد نوعان من الشبكة الإندوبلازمية : الشبكة الإندوبلازمية المحببة (الخشنة) وغير الخشنة أو الملساء

-الشبكة الأندوبلازمية المحببة (الخشنة)

تحتوى أغشية الشبكة الأندوبلازمية الخشنة على الريبوسومات وال التى تتكون من الحامض النووي الريبيوزى (الرنا) والبروتينات. ووظيفة هذا النوع من الشبكة الأندوبلازمية هى تصنيع وعزل المواد المفرزة وخاصة البروتينات ؛ لذا فهو يلعب دورا هاما فى نمو وتنمية الخلايا.

الشبكة الأندوبلازمية غير المحببة (الملساء)

أغشية هذا النوع لا تحتوى على الريبوسومات وأهميتها داخل الخلايا تمكن فى اشتراكه فى إنتاج الستيرويدات والفوسفوليبيدات وله وظائف مختلفة أخرى فى بعض الخلايا مثل التمثيل الغذائى للمواد الكربوهيدرات وتوصيل الأشارات العصبية فى العضلات.

4-الليسوسومات

هى عبارة عن التركيب دائرة مغلقة بأغشية وتحتوى على إنزيمات محللة (هاضمة) ووظيفتها الرئيسية مرتبطة بالهضم داخل الخلية أو ما تعرف باسم الهضم داخل السيتوبلازم . ومن

الواضح أن إنزيمات الليوسومات يتم تصنيعها في الشبكة الأندوبلازمية الخشنة وبالتالي تنتقل إلى جهاز جولي حيث يتم تحويرها وتغليفها إلى حويصلات الليوسومات.

بـ-المحتويات الخلوية

يقصد بالمحتويات الخلوية المشتملات داخل السيتوبلازم والتي عادة ما تكون غير دائمة الوجود داخل الخلية وهي على هيئة تجمعيات لجزيئات ناتجة من الأيض كالليبيدات والبروتينات والكربوهيدرات ، وأحيانا تكون على هيئة أصباغ ، وعلى ذلك فتلk المحتويات إما أن تكون على هيئة حبيبات إفرازية وهي تكثر في الخلايا الغدية أو حبيبات لتخزين الدهون والجليكوجين كالموجودة في خلايا الكبد ، أو حبيبات صبغية كالموجودة في الخلايا الصبغية.

جـ- الهيكل الخلوي: يوجد داخل كل خلية الجسم تراكيب غير محاطة بأغشية وليس لها دور مباشر في عمليات التمثيل الغذائي وهي :الجسم المركزي ، والأنبيوبات الدقيقة والخيوط الدقيقة.

1-الجسم المركبى :

هو جسم بيضاوى يقع قريبا من النواة فى جميع الخلايا التى لها القرة على الانقسام ولا يوجد فى خلايا التى لا تنقسم مثل الخلايا اللعابية وكرويات الدم الحمراء. ويحتوى الجسم المركبى دورا هاما ففى عملية انقسام الخلية حيث يكون الخيوط المغزالية أثناء الانقسام .

2-الأنيوبات الدقيقة :

يوجد داخل سيتوبلازم معظم خلايا الجسم بعض التراكيب أنبوبية الشكل وتسمى لذلك الأننيوبات الدقيقة والتى تلعب دورا هاما فى تدعيم الخلية من الداخل وأيضا فى نقل الجزيئات وبعض العضيات داخل الخلية.

3-الخيوط الدقيقة :

الخيوط الدقيقة هى تركيب لها المقدرة على الانقباض والانبساط؛ ولذا تؤدى إلى التغير فى الشكل الخلايا وحركتها وهى لا توجد فى كل أنواع الخلايا ولكن توجد فى كل أنواع الألياف العضلية والمعروفة باسم خيوط الأكتين والميوسين.

انقسام الخلية

إن المظهر الأساسي لانقسام الخلية هو تضاعف مادة الجينات على الكروموسومات (الحامض النووي - الدنا) وهذا التضاعف يتم بعملية تعرف باسم التناسخ (التضاعف) وبعد هذه العملية سوف يكون على كل كرموسوم ضعف العدد من العوامل الوراثية نتيجة تناسخ جزء الدنا أى سوف يتحول كل كرموسومات إلى كروماتيدن . وعندما يتم انقسام الكروماتيدات يتكون ضعف العدد الأصلي من الكروموسومات وبذلك يسهل انقسام الخلية . وهناك نوعان من انقسام الخلية هما الانقسام غير المباشر والانقسام الاختزالي .

الانقسام غير المباشر (الميتوzioni)

يتم هذا النوع من الانقسام بين الخلايا الجسدية ويتميز بالتضاعف الدقيق للمادة الوراثية بظاهرة التناسخ ، كما ينقسم السيتوبلازم إلى نصفين متساوين ومن هنا فإن أهمية الانقسام غير المباشر هو انقسام غير المباشر هو انقسام المادة الوراثية المستنسخة عن المادة الوراثية الأصلية وبذلك تتكون خلitan

متطابقان تماما ، وبكل واحدة منهما نفس العدد الأصلى من الكروموسومات (أى العدد الزوجى من الكروموسومات)


و قبل أن تدخل الخلية فى عملية الانقسام وهى الفتره ما بين انقسامين (مرحلة بینية) تكون مادة الكروماتين موزعة داخل النواة مكونة الشبكة الكروماتينية . و تتم عملية الانقسام غير المباشر على أربع مراحل هي :

1-المرحلة التمهيدية


2-المرحلة الاستوائية

3-المرحلة الانفصالية

4-المرحلة النهاية



Meiosis الانقسام المنصف



١-المرحلة التمهيدية:

تبدأ هذه المرحلة بتحول الشبكة الكروماتينية إلى خيوط والتي ما تلبث أن تتفصل عن بعضها مكونة الكروسومات والتي تظهر بوضوح داخل النواة على هيئة تراكيب تشبه العصى . بعد ذلك تتضاعف كمية المادة الوراثية بعملية التنا杈 معنى هذا أن المرحلة التمهيدية تبدأ بظهور كل كروموسوم مكونا من نصفين من الكروماتيدات يرتبطان معا في نقطة محددة تسمى السنترومير (النقطة المركزية) . وخلال هذا تحدث تغيرات واضحة في السيتوبلازم خيوط مغزلية ، حيث ينقسم الجسم المركزي إلى إثنين ثم يتوجه كل نصف إلى طرف من الخلية . ثم تظهر في السيتوبلازم خيوط مغزلية ، حيث تكون مرتبطة بالجسمين المركزيين وتتجه إلى منتصف الخلية مكونة تركيبا يشبه النجمة يسمى الإستر . ثم تبدأ النوية في الأختفاء تدريجيا حيث يتصل محتوياتها بأحد الكروماتيدات، وأخيرا يبدأ الغلاف النووي في التحلل والأختفاء .

2-المرحلة الاستوائية :

فى هذه المرحلة تتحرك كل الكروموسومات (أزواج الكروماتيدات) إلى منتصف الخلية حيث تصطف على الخط المنصف للخلية المعروف باسم القرص الاستوائي ، ويتسع الجهاز المغزلى ليحتل الجزء الأكبر من الخلية وتكون الكروموسومات مرتبطة بواسطة السنطروميرات إلى الخيوط الغزلية ، والفتررة الزمنية لهذه المرحلة القصيرة .

3-المرحلة الأنفصالية

خلال هذه المرحلة يتم انقسام أو انشقاق كل كروموسوم إلى كروماتيدين ، ومن هنا تتكون مجموعتان من الكروماتيدات أو ما تسمى بالكروموسومات البنود حيث تتحرك كل مجموعة من هذه الكروموسومات إلى أحد طرفي الخلية ؛ وهذا يعني أن مجموعتين متشابهتين تماماً من الكروموسومات تجمعتا في قطبى الخلية ؛ ولذا فإن كل خلية صغيرة ناتجة ، سوف تحتوى على نفس العدد الأصلى من الكروموسومات . وهذا له أهمية كبيرة فى الحفاظ على المادة الوراثية فى كل خلية جديدة تتكون من الانقسام.

4-المرحلة النهائية :

فى هذه المرحلة النهائية من عملية الانقسام تختفى الخيوط المغزلية وتصبح الكروموسومات طويلة ورفيعة ، ثم يبدأ ظهور الغشاء النوى حول كل مجموعة من الكروموسومات ويعاد بناء النوية داخل كل نواة جديدة . وفي تلك الأثناء ينقسم السيتوبلازم إلى جزئين متساوين حيث يبدأ ظهور تخصير بين النواتين عند الخط النصف للخلية الأم ، ومن هنا تكون قد انقسمت الخلية الأم إلى خلتين ينفصلان عن بعضهما ، وكل خلية منها لها نفس العدد الزوجى من الكروموسومات ، ونفس كمية المادة الوراثية الموجودة فـة الخلية الأم . وعلى ذلك يمكن القول أن المرحلة النهائية تعتبر حالة عكسية للمرحلة التمهيدية ، وهنا تصل الخليتان الجديدان إلى المرحلة أو الطور المسمى ما بين الانقسام (الطور البينى) وفيه تزداد أنشطة الخلايا إلى الدرجة القصوى حيث تتعدى وتكبر لتصبح بعد فترة وجيزة شبيهة بالخلية الأم هنا يمكن أن تدخل في مراحل الانقسام.

الأنقسام الاختزالي (الميوزى)

هذا النوع من الانقسام يحدث في الخلايا التناصالية عند تكوين الحيوانات المنوية في الخصية والبويضات في المبيض. وأهم ما يميزه هو اختزال العدد الأصلي (الثنائي) من الكروموسومات إلى نصف العدد . وعندما يتم الأخصاب تتحد نواة الحيوان المنوى مع نواة البويضة فيتكون الزيجوت الذي تحتوى نوأته على العدد الزوجى من الكروموسومات ؛ولذا فإن أهمية الانقسام الاختزالي تمكن في اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف حتى يمكن المحافظة على العدد الأصلى في خلايا كل نوع من الكائنات ، معنى ذلك أن هذا النوع من الانقسام يحفظ عدد الكروموسومات ثابتًا في النوع الواحد لتكون دائمًا مخلوقات تشبه الآبوبين .

والانقسام الاختزالي يتم على مرحلتين

الانقسام الاختزالي الاول

وأهم ما يميز هذه المرحلة هو عبور أو انتقال بعض الصفات الوراثية بين الكروموسومات المتشابهه مع اختزال عدد من الكروموسومات إلى النصف.

الانقسام الاختزالي الثاني

ويمكن اعتباره انقساما غير مباشر ، غير أن الخلية التي تبدأ هذه المرحلة تكون محتوية على نصف العدد الاصلى من الكروموسومات .

الانقسام الاختزالي الاول (الميوزى الاول)

ويشمل المرحلة التمهيدية الاولى والمرحلة الاستوائية الاولى والمرحلة الانفصالية الاولى والمرحلة النهاية الاولى .

المرحلة التمهيدية الاولى

هذه المرحلة معقدة للغاية وفيها يظهر العدد الزوجي للكروموسومات وكل كروموسوم يتكون من زوج من الكروماتيدات المتماثلة.

تنقارب الكروموسومات المتشابهة بعضها إلى بعض حيث إن هذه الكروموسومات المتشابهة تكون متساوية في الحجم والشكل وأيضا فيما تحمله من صفات وراثية ثم تتشابك وتلتاف حول بعضها ومن هنا تكون ما يعرف باسم وحدات الكروموسومات التكافئة

-وبعد إتمام تقابل جينات كل كروموسوم مع جينات الكروموسوم المتشابه تقصر الكروموسومات وتغلظ في السمك ويظهر بوضوح أن كل وحدة من الكروموسومات المتكافئة تتكون من أربع كروماتيدات؛ ولذا يطلق عليها اسم رباعيات

عندئذ تلتصق خيوط الكروماتيدات الاربعة في عدة مناطق تسمى بنقاط التشابك وعندها يتم تبادل الجينات وتعرف هذه العملية بالعبور ، وعندئذ يكون قد حدث تغير أو تعديل أو

تبديل في بعض الجينات لاثنين من الكروماتيدات الاربعة ، والاثنان الآخران لا يحدث بهما أي تغيير . بعد إتمام عملية العبور تتفصل الكروموسومات المتشابهه وتبدأ النوية في الاختفاء ويدوّب الغلاف النووي وت تكون والخيوط المغزلية.

المرحلة الاستوانية الاولى

تبدأ الكروموسومات التشابهه في ترتيب نفسها في منتصف الخلية فيما يعرف باسم القرص الاستوائي وتشابك مع الخيوط المغزلية بواسطة السنتروميرات.

المرحلة الانفصالية الاولى

في هذه المرحلة يتحرك كل كروموسوم من الكروموسومين المتشابهين إلى قطب من أقطاب الخلية. وهنا تجدر الاشارة إلى عدم انقسام السنترومير حيث ما زال كل كروموسوم يتكون من كروماتيدين.

المرحلة النهاية الاولى

عندئذ تتجمع الكروموسومات عند قطب الخلية ويختصر السيتوبلازم لتنقسم الخلية الاصلية إلى خلتين ، وكل واحدة

منهما تحتوى على نصف العدد الاصلى من الكروموسومات
والتي تحاط بغلاف النواة .

الانقسام الاختزالى الثانى

يمكن أن يبدأ هذا الانقسام بعد الانقسام الاختزالى الاول المباشر بدون مرور الخلية فى المرحلة ما بين الانقسامين ، وينقسم إلى المرحلة التمهيدية الثانية والمرحلة الاستوائية الثانية والمرحلة الانفصالية الثانية والمرحلة النهاية الثانية .

المرحلة التمهيدية الثانية والمرحلة الاستوائية الثانية

كل خلية من الخلايا الناتجة من الانقسام الاختزالى الاول والتي تحتوى نصف عدد الكروموسومات تبدأ في الانقسام بالطريقة غير المباشر حيث تظهر الخيوط المغزيلية وتستنسخ جزيئات الدنا المكونة للجينات ثم يختفى غلاف النواة وترتب الكروموسومات في القرص الاستوائي ، وهذا يبدأ انقسام السنتميرات لأول مرة في الانقسام الاختزالى حيث تتفصل الكروماتيدات عن بعضها ، وهذه الكروماتيدات تكون مختلفة في بعض الاجزاء نتيجة حدوث عملية العبور والتي اشرنا إليها في المرحلة التمهيدية الاولى

المرحلة الانفصالية الثانية والنهائية الثانية

تتحرك الكروماتيدات النتماثلة والمختلفة في بعض الجينات إلى قضبى الخلية وينقسم السيتوبلازم وينتج عن ذلك خلتين كل واحدة منهما تحتوى على نصف العدد الأصلى من الكروموسومات والذى يحاط بغلاف النواء .

وعلى ذلك فالمحصلة النهائية بعد مرحلتي الانقسام الاختزالي هى تكوين أربع خلايا كل واحدة تحتوى على نصف عدد الكروموسومات الموجودة فى الخلية الأم التى بدأت الانقسام الاختزالي.

الباب الثاني

أنسجة الجسم

ثانياً: الأنسجة

عند تخصيب البويضة الناضجة بحيوان منوى تكون الخلية المخصبة والتى تعرف باسم الزيجوت . وينقسم هذا الزيجوت انقسامات عديدة لتكوين مجموعة من الخلايا تتميز إلى ثلاثة طبقات جرثومية (منبته) وهى : الإكتودرم وهو الطبقة الخارجية للجنين ، والميزودرم وهو (الطبقة الوسطى) والاندودرم وهو الطبقة الداخلية ومن هذه الطبقات الثلاث يبدأ تكون أنسجة الجسم المختلفة .

ويعرف النسيج بأنه مجموعة من الخلايا المتشابهة تتجمع لتؤدى وظيفة عامة . وتختلف أنسجة الجسم عن بعضها البعض فى أمور كثيرة منها الشكل والتركيب والحجم وكمية المادة الموجودة بين الخلايا ، وأيضاً النشأة من الطبقات المنبته ، وعادة تقسم أنسجة الجسم إلى أربعة أنواع رئيسية - هى:-

► **الأنسجة الطلائية** وتنشأ من ثلاثة طبقات الجرثومية .

- الأنسجة الضامة وتنشأ من طبقة الميزودرم.
- الأنسجة العضلية وتنشأ من طبقة الميزودرم.
- الأنسجة العصبية وتنشأ من طبقة الإكتودرم.

يطلق اسم النسيج الطلائى على كل الأغشية الخلوية المبطنة لل التجاويف أو المغلف للأسطح .

الأنسجة الطلائية

الخصائص العامة لأنسجة الطلائية

تنشأ الأنسجة الطلائية إما من طبقة الإكتودرم أو الميزودرم أو الإندورم .

تؤدى الأنسجة الطلائية العديد من الوظائف مثل الحماية والامتصاص والافرازات.

تتميز خلايا النسيج الطلائى بأنها متراسمة ومتمسكة مع بعضها ومن هنا فإن المادة الموجودة بين الخلايا تكون قليلة جدا.

يرتكز النسيج الطلائى عادة غشاء قاعدى

لا يتخل النسيج الطلائى أوعية دموية، ولكن تصله المادة الغذائية والأكسجين بطريقة الانتشار من الطبقة التى تقع تحته.

تتميز الأنسجة الطلائى بأنها تتجدد دائما حيث إنها معرضة باستمرار للتلف.

أنواع الأنسجة الطلائى

تنقسم الأنسجة الطلائى إما طبقا لشكل وترتيب الخلايا أو طبقا للوظائف التى تؤديها . على ذلك يمكن تقسيمها إلى نوعين هما : الأنسجة الطلائى السطحية والأنسجة الطلائى الغدية .

أولاً: الأنسجة الطلائى السطحية

تقسم هذه الأنسجة طبقا لشكل الخلايا وعدد الطبقات المكونة للنسيج إلى نوعين (أ) الأنسجة الطلائى البسيطة (ب) الأنسجة الطلائى المركبة (المصففة - الطبقية)

الأنسجة الطلائى البسيطة

يتكون هذا النوع من الأنسجة الطلائى من صف واحد من الخلايا وعادة ما ترتبط هذه الأنسجة الطلائى البسيطة

بوظيفى الامتصاص أو الافراز ولا تؤدى دورا هاما فى الحماية وتنقسم هذه الأنسجة طبقا لشكل الخلايا المكونة للنسيج إلى:-

النسيج الطلائى الحرشفى البسيط

يتميز هذا النسيج بأن خلاياه تكون سداسية الشكل وتحتوى كل خلية على نواة مركبة كبيرة ، ويوجد هذا النوع فى المناطق التى تحدث فيها عملية انتشار عملية ترشيح حيث يبطن الأوعية الدموية والليمفية وأيضاً الحويصلات الهوائية للرئتين كما يوجد كغطاء لمعظم أجزاء القناة الهضمية .

النسيج الطلائى المكعب البسيط

خلايا هذا النوع تكون مكعبة الشكل والنواة مستديرة وتقع في منتصف كل خلية . ويوجد هذا النسيج في كثير من الغدد وفي شبکية العين وأيضا في الطبقة المبنية في المبيض .

النسيج الطلائى العمادى البسيط

تكون الخلايا في هذا النوع مستطيلة الشكل وترتكز عمودية على الغشاء القاعدي، وأنوية الخلايا توجد

قريبة من القاعدة . ويوجد هذا النوع مبطنا لقنوات بعض الغدد وبعض أجزاء القناة الهضمية مثل المعدة والأمعاء .

النسيج الطلائي العمادي البسيط المهدب

هذا النسيج يشبه النسيج الطلائي العمادي إلا أن سطح الخلايا الخارجية تحمل أهدابا وهذه الأهداب تكون متحركة ؛لذا تسبب حدوث تيار للسوائل أو الجزيئات الدقيقة المجاورة لسطح النسيج . وهذا النوع يوجد في تجويف الأنف والشعب الهوائية وقناة البيض وفي الرحم أيضا .

النسيج العمادي المصفف الكاذب :-

هذا النوع من الأنسجة الطلائية يمكن اعتباره أحد أنواع الأنسجة الطلائية البسيطة ؛ لأن جميع خلايا ترتكز على الغشاء القاعدي ، إلا أن أنوية هذه الخلايا تبدو مرتبة في أكثر من صف واحد ومن هنا تم تسميتها مصفف كاذب . وينتشر هذا النوع في القنوات الإخراجية الكبيرة وفي أجزاء من مجرى البول الذكري .

النسيج العمادى المصطف الكاذب المهدب

يشبه هذا النوع السابق ذكره إلا أن الأسطح الحرارة للخلايا تكون مزودة بأهداب . ويوجد هذا النوع مبطنا للمرات التنفسية الكبيرة وأيضا في أجزاء من الجهاز التناسلي الذكري.

بـ-الأنسجة الطلائية المراكبة (المصففةــالطبقية).

هذه الأنسجة طبقاً لشكل خلايا الطبقة العليا إلى:
فـي أكثر من طبقة ووظيفتها الأساسية هي الحماية وتقسم
هذه الأنسجة تكون خلاياها مرتبة

نسیج طلائی حرشفی مرکب :-

يتكون هذا النوع من الأنسجة من عدة طبقات من الخلايا مرتبة بعضها فوق بعض . والطبقة السفلی تكون مرتكزة على الغشاء القاعدي وعادة ما تكون عmadية أو مكعبية الشكل وذات أنوية كبيرة وتسمى طبقة مليحی . وتعرف أيضا بالطبقة المولدة لأنها سريعة الانقسام لسهولة وصول الغذاء إليها من طبقة النسيج الضام الموجود أسفل الغشاء القاعدي ؛ لذا تنشأ فوقها الطبقة المتوسطة التي تدفع لتكوين الطبقة العليا والتي تكون خلاياها معرضة لاحتكاك الدائم بالوسط المحيط بها

، ومن هنا تموت ويحل محلها طبقة أخرى من الداخل .
ويبيطن هذا النوع من الأنسجة الطلائية تجويف الفم
والبلعوم والمرئ والمهبل .

نسيج طلائي حرشفى مركب قرنى
يعتبر هذا النوع حالة خاصة من النوع السابق حيث
تموت خلايا السطح الخارجى للنسيج وتتحول إلى طبقة
قرنية؛ ولذا تعرف باسم عملية تكوين الكيراتين وهذا
يعنى تكوين طبقة سميكة غير خلوية تعرف باسم الطبقة
القرنية، والتى تتكون من مادة بروتينية تسمى الكيراتين
وأفضل مثال لذلك هو بشرة الجلد فى الإنسان .

نسيج طلائى مركب مكعب

يتكون عادة هذا النسيج من طبقتين أو ثلاث من الخلايا
ويوجد فى قنوات الغدد ذات الأفراز الخارجى مثل
الغدد العرقية و الغدد اللعابية .

نسيج طلائى مركب عمادى

يتميز هذا النوع بأن الخلايا الطبقة السطحية مستطيلة
الشكل وهو موجود فى مناطق معينة فى الجسم مثل
الحنجرة وبعض القنوات الإخراجية .

نسيج طلائى مركب عمادى مهدب

يُشبّه النسيج السابق إلا أن أسطح خلايا الطبقة الخارجية (العليا) مزودة بأهداب ويبطن هذا النسيج الوعاء الناقل في الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان .

نسيج طلائى انتقالى

هذا النوع من الأنسجة الطلائية المركبة يوجد لمجابهة التمدد أو الانبساط حيث إن خلاياه لها القدرة على تعديل شكلها طبقاً للضغط الواقع عليها ؛ ولذا يوجد هذا النسيج في جدار المثانة البولية حيث يتمدد عندما تكون المثانة مملوءة بالبول وينبسط عند تفريغ المثانة .

تقسيم الأنسجة الطلائية حسب الوظيفة

الأنسجة الطلائية الغذية

تخصّصت هذه الأنسجة الطلائية لوظيفة محددة وهي عملية الإفرازات ولذا تعرف هذه التراكيب باسم الغدد وتنشأ الغدد في الجنين بواسطة عملية انتماد لصف الخلايا الطلائية في النسيج الضام الموجود تحتها .

وتوجد طريقتان لتقسيم الغدد : الطريقة الأولى تعتمد على عدد الخلايا المكون للغدة، ومن هنا تقسم الغدد إلى:

غدد وحيدة الخلية:

حيث تتكون الغدة من خلية واحدة مثل الخلية الكأسية التي توجد بين الخلايا النسيج الطلائي المبطن للقصبة الهوائية والقناة الهضمية وهذه الخلايا تقوم بإفراز مادة المخاط.

غدد عديدة الخلايا :

وهذه الغدة تتكون عدد كبير من الخلايا وتنقسم هذه الغدد بالطريقة الثانية وذلك واعتماد على المادة الكيميائية التي تفرزها الغدة وأيضاً طبقاً لوجود أو عدم وجود قناة للغدة؛ ولذلك يوجد نوعان من الغدد عديد الخلايا ، غدد ذات إفراز خارجي وغدد ذات إفراز داخلي .

غدد ذات إفراز خارجي

وتعرف أيضاً باسم الغدد القنوية وهذه الغدد لها قنوات تحمل الإفراز إلى الخارج جسم الغدة مثل الغدد العرقية التي تقوم بإفراز العرق ، والغدد الهضمية التي تقوم بإفراز العصارات الهاضمية المحتوية على الإنزيمات وتنقسم الغدد ذات الإفراز الخارجي نوعين :

غدد بسيطة

و هذه الغدد تتميز بأن قنواتها غير متفرعة و طبقا لشكل
الغدة يمكن تمييز أكثر من نوع :

الغدد الأنبوية البسيطة

وهذا النوع من الغدد يكون أنبوبى الشكل ، وللгазة قناة
واحدة ومن أمثلتها الغدد المعدية فى الثدييات .

الغدد الأنبوية البسيطة المتلوية

و جسم الغدة فى هذه الحالة يكون أنبوبى الشكل و ملتوي ،
و من أمثلة الغدد العرقية فى الجلد الثدييات .

الغدد الأنبوية البسيطة المتفرعة

فى هذا النوع يتكون جسم الغدة من عدة
أجزاء ولكن جميعها تفتح فى قناة واحد
غير متفرعة ومن أمثلة هذا النوع الغدد المعدية
فى الصدفعة .

الغدد الحويصلية البسيطة

توجد هذه الغدد فى شكل حويصلات أو جيوب دائرية
و من أمثلتها الغدد الموجودة فى جلد الصدف.

الغدد الحويصلية البسيطة المتفرعة

فى هذا النوع تتكون الغدة من عدة حويصلات ولكن تصب جميعها فى قناة واحدة مثل الغدد الدهنية فى الجلد .

الغدد مركبة

هذه الغدد تتميز باحتواها على عدة قنوات متفرعة ويوجد من هذه الغدد عدة أنواع طبقاً لشكل جسم الغدة والذى يشبه من حيث الشكل أنواع الغدة البسيطة التى سبق ذكرها .

الغدد الأنبوية المركبة

يتميز هذا النوع بأن قناعة الغدة متفرعة وجسم الغدة أنبوى الشكل وأفضل مثال لذلك الكلية .

الغدد الحويصلية المركبة

يتكون جسم الغدة هنا من أجزاء عديدة دائيرية أو حويصلية الشكل والتى تصب إفرازاتها فى أفرع عديدة من القنوات ويعتبر البنكرياس مثلاً جيداً لهذا النوع .

الغدد الحويصلية الأنبوية المركبة

يكون جسم الغدة من عدة أجزاء بعضها أنبوني الشكل والبعض الآخر حويصلي ، وتنجمع إفرازات هذه الأجزاء في قنوات متفرغة ، ومن أمثلة هذا النوع الغدد الـاللعابية.

غدد ذات إفراز داخلي لاقنوية (صماء)

وتطلق عليها هذه التسمية لأن إفرازاتها تنقل مباشرة إلى الدم حيث لا توجد قنوات لهذه الغدد ومن هذا تسمى أيضا الغدد الـالاقنوية كما تعرف أيضا باسم الغدد الصماء وإفرازاتها تسمى بالهرمونات وهي تؤدي وظائف هامة وعديدة في الجسم ، وعلى ذلك فالغدد الصماء تلعب دورا أساسيا في المحافظة على الـالاتزان الداخلي.

وظائف الأنسجة الطلائية

• الحماية

تعتبر الحماية من أهم وظائف الأنسجة الطلائية ، فالبشرة تحمى الجسم ، حيث تعتبر غطاء للجسم ، الطلائية المبطنة للفم تؤدى دورا في الحماية من أي

إصابات نتيجة الاحتكاك، كما تلعب الطبقة الطلائية المبطنة للمثانة البولية دوراً في الحماية من المواد اللاحراجية عالية التركيز الموجودة في البول.

• الانتقال

يتم انتقال عديد من المواد مثل المخاط وجزيئات أخرى بواسطة أسطح الأنسجة الطلائية ويلاحظ هذا القنوات التنفسية حيث تتم عملية الانتقال بواسطة الأنسجة الطلائية.

• الإخراج

عديد من خلايا الأنسجة الطلائية يكون لها في إخراج مواد مختلفة خارج الجسم مثل خروج البول وثاني أكسيد الكربون وأيضاً العرق.

الإفراز (طلائية غدية)

كما أشرنا سابقاً الأنسجة الطلائية المكونة للغدد تؤدي دوراً هاماً في الإفراز سواء الغدد ذات الإفراز الخارجي التي تفرز الإنزيمات، أو الإفراز الداخلي التي تقوم بإفراز الهرمونات.

الامتصاص (طلائية بطانية)

على سبيل المثال فإن امتصاص نواتج الهضم من فراغ القناة الهضمية يتم عن طريق النسيج الطلائى المبطن للأمعاء ، وأيضا عملية إعادة الامتصاص فى الكلية تتم من خلال نسيج طلائى.

الاستقبال الحسي (طلائية حسية)

يوجد عديد من خلايا النسيج الطلائى فى أعضاء الحس مثل العين والانف وأيضا براعم التذوق فى اللسان وهذه تعمل على استقبال المؤثرات الخارجية من الوسط المحيط بالكائن.

التكاثر (طلائية منبطة)

عملية إنتاج الجاميات (الامشاج) سواء الحيوانات التووية في الخصية أو البوopies في المبيض يكون منشؤها أنسجة طلائية في المناسل(الخصية والمبيض).

الأنسجة الضامة

تنشأ الأنسجة الضامة من طبقة الميزودرم والوظيفة الأساسية لهذه الأنسجة هي ربط أنسجة وأعضاء الجسم ببعضها البعض ولذا فهي لاتتوجد على السطح الخارجي . وتخلف الأنسجة

الضامة عن الأنسجة الطلائية في احتوائها على مادة وفيرة بين الخلايا والمعروفة باسم المادة بين الخلوية والتى تحتوى على ألياف . ويطلق على الخلايا والمادة بين الخلوية مع الألياف اسم عناصر النسيج الضام . وتتفاوت نسب هذه العناصر طبقاً لنوع النسيج . أيضاً من خصائص النسيج الضام أن خلايا قليلة ومساعدة ؛ لذا فهو غنى بالأوعية الدموية . وتقسم الأنسجة الضامة إلى :

- الأنسجة الضامة الأصلية .


- الأنسجة الضامة الهيكلية .

الأنسجة الضامة الوعائية .

أولاً: الأنسجة الضامة الأصلية :

هذه الأنسجة تلعب دوراً هاماً في الجسم حيث تدخل في تركيب معظم أعضاء الجسم وتظهر فيها بوضوح عناصر الأنسجة الضامة التي سبق ذكرها وهي الخلايا والمادة الموجودة بينها

والتي باسم المادة الخلالية والألياف .



أنواع خلايا الأنسجة الضامة :

الخلايا الليفية .

هى أكثر الخلايا شيوعا فى الأنسجة الضامة ، وهى خلايا كبيرة الحجم ومتفرعة ووظيفتها الأساسية تكون وإفراز الألياف التى يتميز النسيج الضام بوجودها فى المادة.

الخلايا الأكولة .

هذه الخلايا كبيرة الحجم ومنها ما هو ثابت ومنها ما هو متجول وهى تحتوى على ليبوسومات تقوم بهضم

المواد التي تلتهمها هذه الخلايا ، ومن هنا فهى ضمن خلايا الجهاز المناعى فى الجسم حيث تقوم بمحاجمة المواد الغريبة فى النسيج وتلتهمها وتهضمها .
الخلايا الدهنية.

أنوية هذه الخلايا تكون قريبة من السطح الخارجى للخلية بسبب وجود المواد الدهنية داخلها وذلك على حساب السيتوبلازم الموجود بكميات قليلة .
الخلايا الصاربة .

توجد هذه الخلايا على امتداد الأوعية الدموية وتقوم بإفراز مادة مانعة للتجلط شبيهة بالهيبارين إن ت肯 ممائلة له .

كريات الدم البيضاء :

يوجد في الأنسجة الضامنة أنواع عديدة من كريات الدم البيضاء ولكن الأكثر شيوعا هي كريات البيضاء الليمفية حيث تؤدى هذه الخلايا دورا هاما في المناعة ووقاية الجسم من الأمراض.

الخلايا البلازمية :

هذا النوع من الخلايا نادر الوجود في الأنسجة الضامنة ولكن يوجد في الأغشية المصلية وأيضا في الأنسجة

الليمفية وعموماً فإن هذه الخلايا تنتشر في الأماكن المصابة بالالتهابات .
الخلايا الصبغية .

تسمى هذه الخلايا أيضاً حاملات الألوان أو حاملات الصبغ وهي توجد في مناطق مختلفة من الجسم وخاصة تحت الجلد وفي العين ومن هنا فهي مصدر تلون الجزء الموجود فيه .

الياف النسيج الضام

يوجد نوعان من الياف النسيج الضام بين الخلايا وهما :
الألياف البيضاء (أو ألياف الكولاجين)
الألياف الإيلاستين (الألياف المرنة)

الألياف البيضاء

وتعرف أيضاً بألياف الكولاجين حيث إنها تتركب كيميائياً من مادة الكولاجين البروتينية ، وهذه الألياف تكون النوع الأساسي من الياف النسيج الضام حيث توجد في معظم الأنسجة المدعمة ، وطبقاً لوجودها في الجسم تصنف إلى عدة أنواع :
النوع الأول من ألياف الكولاجين
ويوجد هذا النوع في أدمة الجلد والأوتار والأربطة

النوع الثاني من ألياف الكولاجين:-

ويحتوى هذا النوع على لبيفات دقيقة ويوجد فى الغضروف الزجاجى.

ج- النوع الثالث من ألياف الكولاجين

هذه النوع يكون الألياف المعروفة باسم ألياف الريتكوليدين أو الألياف الشبكية وكانت تصنف هذه الألياف كنوع مستقل عن ألياف الكولاجين ، وذلك بسبب قابلية ارتباطها بأملاح الفضة . وعادة ما توجد هذه الألياف في صورة شبكة مدعمة للنسيج الموجودة فيه مثل الكبد ونخاع العظم ولأعضاء الليمفية .

د- النوع الرابع من ألياف الكولاجين .

هذه الألياف توجد على هيئة تركيب شبكي ولا توجد في صورة لبيفات وهي أحد المكونات الأساسية للأغشية القاعدة.

ألياف الإيلاستين .

ألياف الإيلاستين تشبه المطاط حيث إنها مرنة ومن هنا فهى تعرف أيضا باسم الألياف المرنة ، وهى أقل سمكا من الألياف البيضاء وتتفرع وتشابك كما هو الحال في

الجلد وقد يبلغ قطرها من 10-11 ميكرونا في بعض أنواع الأربطة.

المادة بين الخلوية

تحتوى الأنسجة الضامة الأصلية على كمية من المادة بين الخلوية والتى توجد فى صورة غروية وتحتوى على كمية كبيرة من الماء الذى يساعد على انتشار الغازات والمواد الغذائية من الأوعية الدموية إلى خلايا النسيج . والمادة الخلالية المنتشرة بين الخلايا فى الأنسجة الضامة تتراكب كيميائيا من جزيئات عديدات التسکر المخاطية .

الأنسجة الضامة الأصلية

النسيج الضام الفجوي

هذا النسيج أكثر الأنسجة الضامة انتشاراً في الجسم ويتميز بأن له درجة كبيرة من المرونة وعادة ما يربط بين العديد من الأنسجة الأخرى ، وأيضاً بين الأعضاء المختلفة . هذا بالإضافة إلى وجودة في منطقة الأدمة في الجلد وبين العضلات ؛ ولذا فيمكن دراسته معملياً في قطاعات عديدة مأخوذة في

أعضاء مختلفة وكذلك في تحضيرات لنسيج تحت الجلد وأيضاً
المساريفا .

النسيج الضام المخاطي

يوجد هذا النسيج في الحبل السري وهو يحتوى على خلايا ليفية كبيرة نجمية الشكل مع عدد قليل من الخلايا الأكولة ، والمادة الخالية تكون رقيقة وتحتوى على شبكة من ألياف بيضاء دقيقة .

النسيج الضام الدهنى

يشتمل هذا النسيج على خلايا دهنية كثيرة . تتميز الخلية الدهنية بامتلائها بالدهن على حساب السيتوبلازم ؛ ولذا تكون النواه صغيره وتقع بالقرب من السطح الخارجى للخلية . وفي جسم الإنسان يوجد هذا النسيج فى الأماكن التى يتراكم فيها الدهن مثل انسجة تحت الجلد ، وفي نخاع العظم وحول الكلىتين . ويلعب هذا النسيج دوراً هاماً كطبقة عازلة لمنع فقدان أو اكتساب الحرارة الزائدة .

وهنا تجدر الإشارة إلى وجود نوع خاص من النسيج الضام الدهنى يسمى النسيج الضام الدهنى البنى وهذا

النوع شائع الوجود في الحيوانات الثديية التي تقوم بعملية البيات الشتوى ، وفي الإنسان يوجد هذا النسيج الدهنى في الجنين وفي مرحلة الطفولة . ويتميز هذا النسيج بأنه غنى بالشعيرات الدموية ويحتوى أيضاً على صبغ هو الذي يسبب اكتساب هذا النسيج اللون البني .

النسيج الضام الشبكي

يتميز هذا النوع من الأنسجة الضامة بوجود العديد من الألياف الشبكية والتي تكون متصلة بالخلايا النجمية ؛ ولذا يبدو النسيج في الشكل الشبكي . ويكون هذا النسيج الطبقة المحيطة للأعضاء الليمفية ونخاع العظم وأيضاً الكبد والطحال .

الأنسجة الضامة الهيكيلية (الغضاريف والعظم)

الغضاريف

مما سبق يمكن تعريف الغضاريف بأنها أنسجة ضامة هيكيلية ضمن الأنواع المتخصصة حيث توجد في حالة صلبة ولكنها تميز بمرونتها . والغضاريف تكون الجزء الأكبر من الهيكل في أجنة الحيوانات الفقارية وباكتمال نمو الجنين تحول معظم أجزاء الهيكل

الغضروفية إلى عظام ما عدا بعض الأجزاء التي تظل غضروفية مثل الحلقات الغضروفية في القصبة الهوائية وصوان الأذن والأنف وأيضاً الأقراص الموجودة بين الفقرات ، وفي الالتحام العانى ، وفي الحزام الحوضى . ويتركب الغضروف من الخلايا الغضروفية الناضجة والتي توجد مضمورة في المادة بين الخلوية وهذه المادة تحتوى أيضاً على ألياف ويعرفان معًا باسم المادة الخلالية .

نشأة ونمو الغضروف

ينشأ الغضروف مثل كل أنواع الأخرى من الأنسجة الضامة من النسيج الميزنكيمي حيث تجتمع هذه الخلايا في مجموعات وتبدأ في تكوين المادة بين الخلوية الخاصة بالغضروف وعندئذ يطلق على هذه الخلايا اسم الخلايا البنائية للغضروف والتي تبدأ في تكوين الليفيات البيضاء وباستمرار انقسام هذه الخلايا يزداد نمو الغضروف ثم تحاط كل خلية أو مجموعة من الخلايا بغلاف أو محفظة من المادة بين الخلوية ، وهنا يطلق عليها اسم الخلية الغضروفية الناضجة . وعادة ما يحاط الغضروف بطبقة من النسيج الضام الكثيف غير مننظم والتي تعرف باسم غلاف

الغضروف ، وتمتاز هذه الطبقة باحتوائها على أوعية دموية وهى التى تقوم بامداد الخلايا الغضروفية بالاكسجين والعناصر الغذائية بواسطة الانتشار .

وتقى عملية نمو الغضروف بطريقتين : الأولى تعرف باسم النمو من داخل الغضروف ، وهذا يحدث من خلال انقسام خلايا الغضروف الناضجة الصغيرة والتى ما زال لها المقدرة على الانقسام ، أما الطريقة الثانية فتعرف من باسم النمو من خارج الغضروف ، حيث يتم نمو الغضروف بالإضافة طبقات جديدة من الخارج وذلك بانقسام خلايا النسيج الضام الذى يكون غلاف الغضروف ثم تتحول هذه الخلايا إلى خلايا بانية للغضروف التى تساعده فى تكوين غضروف جديد .


وتقسم الغضاريف طبقاً لتركيب ونوع الألياف الموجودة فى المادة بين الخلوية إلى ثلات أنواع .

الغضروف الزجاجي

الغضروف المرن

الغضروف الليفى

الغضروف الزجاجي (الشفاف) :




الغضروف الشفاف

ويطلق عليه هذا الاسم لأن الألياف البيضاء التي توجد في المادة بين الخلوية تكون قليلة نوعاً ما وفي نفس الوقت تكون شفافة وغير مرئية بالعين المجردة . وهذا النوع من الغضروف يكون الهيكل العظمى للجنين ، ثم يتحول معظمه إلى عظام أثناء مراحل التطور الجنيني .

ويظل الغضروف الزجاجي موجوداً في جسم الحيوان البالغ في نهايات العديد من العظام الطويلة كما يوجد في الأنف وفي الحنجرة وفي الحلقات الغضروفية المدعاة للقصبة الهوائية هذا بالإضافة إلى وجودة في نهايات الضلوع عند اتصالها بعظمة القص في العظام الصدرى

الغضروف



المرن



يوجد هذا النوع من الغضاريف في الأماكن التي تحتاج إلى التدعيم والمرونة في نفس الوقت ، وهو يشبه الغضروف الزجاجي إلى أنه يحتوى على ألياف صفراء لكي تعطية مرنة أكبر . ويوجد الغضروف المرن في صيوان الأذن وفي الغضروف المدعم لفتحة المزمار الذي يعرف باسم لسان المزمار (الفتحة الموصولة للقصبة الهوائية) .

الليفي

الغضروف



الغضروف الليفي

يتميز هذا النوع من الغضاريف بوجود حزم عديدة ومكثفة من الألياف البيضاء ؛ ولذا فعدد الخلايا يكون

أقل مما هو موجود في النوعين السابقين . ويوجد الغضروف الليفي في اللتحام العانى الموجود في الحزام الوضى وفي القرacs بين فقرات العمود الفقري وكما هو معروف عندما يتآكل أو يتمزق أحد هذه الأقرacs فإنه يضغط على العصب الشوكى القريب منه ، وهذه الحالة تسبب آلاماً شديدة قد تكون في العنق أو الظهر ، أو في أحد الأطراف ، وذلك تبعاً للعصب المضغوط عليه وبالتالي تبعاً لاماكن القرص المصاب .

التغيرات التي تؤدى إلى تدهور حالة الغضروف

مع التقدم في العمر يبدأ الغضروف في فقد الشفافية ويقل عدد الخلايا وتنقص المادة بين الخلويات وتزيد ترسيبات المادة الزلالية بين الخلايا . ومن أهم مظاهر تدهور الغضروف هي عملية التكلس وتحدث نتيجة ترسيب فوسفات وكرbones الكالسيوم في المادة بين الخلويات ومن هنا يصبح الغضروف أكثر صلابة وتقل بدرجة كبيرة عملية انتشار الاكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا وهذا يؤيدى إلى موت معظمها .

العظم :

العظم صورة أخرى من الأنسجة الضامة الهيكيلية والتى توجد فى حالة صلبة وهى تكون معظم الهيكل فى الحيوانات الفقارية العليا . ونسيج العظم يشتمل على الخلايا العظمية والمادة المنتشرة بين الخلايا والتى تتميز باحتواها على ألياف الكولاجين البيضاء وهذه الألياف الكولاجين البيضاء . وهذه الألياف تمثل المحتوى العضوى فى تركيب العظم حيث توجد بنسبة 35% تقريبا من وزن العظام . أما المحتوى غير العضوى فيمثل تقريبا من وزن العظام . أما المحتوى غير العضوى فيتمثل تقريبا من وزن العظام . ويترسب فى المادة بين الخلوية فيعطي العظام قوتها وصلابتها . ولأملاح غير العضوى فى العظم تشمل فوسفات الكالسيوم(حوالى 85% من وزن المادة غير العضوية) وكربونات الكالسيوم (10%) وكميات ضئيلة من فلورايد الكالسيوم وفلورايد الماغنيسيوم.

- الشكل العام للعظم :

بحص عظام الجسم بالعين المجردة يمكن تمييز نوعين من العظام هما: العظم الإسفنجي ، والعظم الكثيف .

ويتميز العظم الإسفنجي باحتوائه على فراغات واسعة توجد بين حواجز عظمية متشابكة وهذه الفراغات تحتوى على نخاع العظم، بينما يبدو الثقوب أو الفراغات التي يحتوى العظم .

وكل عظام الجسم ما عدا أسطح التمفصل تكون محاطة بنسج ضام كثيف غير منتظم يعرف باسم غلاف العظم الخارجى (حول عظمي – السمحاق الخارجى) ويوجد أيضا نسيج مشابة يبطن فراغات وتجاويف نخاع العظم يسمى غلاف العظم الداخلى (السمحاق الداخلى).

وعند فحص العظم باستخدام المجهر الضوئي فإن أهم مظاهر تركيب العظم هي أن المادة بين الخلوية تكون مرتبة في طبقات تعرف باسم الصفائح العظمية ، كذلك فإن الخلايا العظمية تقع داخل تجاويف صغيرة تعرف باسم المحافظ أو الفجوات. وكل خلية عظمية زوائد عديدة تمتد في قنوات دقيقة إلى الصفائح العظمية المجاورة . وتؤدى هذه القنوات وظيفة هامة لخلايا العظم حيث تعتبر طريقة لتوصيل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا ، كما تعمل أيضاً كطريق عكسي لمرور نواتج الهم من الخلايا إلى الأوردة الموجودة في القنوات الوسطية المختبرفة نسيج العظم .

تصنيف العظام :

يوجد في الجسم عدة من العظام تصنف على حسب الشكل إلى :-

العظم القصيرة :

هذه العظام عادة ما تكون مكعبية الشكل وتحتوي على عظام إسفنجية مغطاة بالعظم الكثيف ومن أمثلتها عظام رسغ اليد ورسغ القدم أو الكاحل .

العظم المقطعة

تتميز هذه العظام بأنها رقيقة وتكون من طبقتين من العظم الكثيف تحصاران بينهما طبقة من العظم الإسفنجي ومن أمثلتها عظام الضلوع .

العظم الطويلة

هذه المجموعة تشمل على العظام التي تكون أسطوانية الشكل إلى حد ما وتكون العظام الطويلة من ساق العظمة وعادة تكون من عظم كثيف بحيط وكل من طرف العظمة (كرودوس العظمة) يحتوى على عظم إسفنجي مغطى بعظم كثيف .

العظام غير المنتظمة

هذه العظام غير منتظمة الشكل وتحتوى عن أشكال العظام التى سبق ذكرها وتحتوى أيضا على عظم إسفنجي مغطى بعظام كثيف، ومن أمثلتها العظام التى تكون الفقرات وعديد من عظام الجمجمة .

خلايا العظم

يوجد فى الأنسجة العظمية ثلاثة أنواع من الخلايا وهى المعروفة باسم :

الخلايا البنائية للعظم

الخلايا العظمية الناضجة

الخلايا الهدامة للعظم

الخلايا البنائية للعظم

هذه الخلايا تكون مرتبطة بتكوين نسيج العظم ؛ ولذلك توجد عادة على أسطح العظام حيث تترسب المادة بين الخلوية للعظم ، وهذه الخلايا تختلف فى الشكل حيث يكون بعضها مكعبا والبعض الآخر هرميا ، وعادة ما تحتوى على نواة كبيرة والسيتو بلازم به حبيبات دقيقة تكون مرتبطة بتكوين وترسيب المادة بين الخلوية .

الخلايا العظمية الناضجة

كما أشرنا سابقاً فإن هذه الخلايا تكون مغلفة داخل
محافظ أو فجوات وكل خلية زوائد عديدة تمتد في
قنوات دقيقة تساعد على تبادل المواد بين الخلايا وتيار
الدم الذي يغذي نسيج العظم.

الخلايا الهدامة للعظام

وهي خلايا كبيرة الحجم متعددة الأنواع توجد مرتبطة
بسطح العظم . والخلايا الهدامة مرتبطة بتحلل العظم
وامتصاص فعند انخفاض تركيز الكالسيوم في الدم
يزداد إفراز هرمون الغدة الجاردرقية والذي ينشط
الخلايا الهدامة للعظم التي تعمل على هدم العظم ، مما
يؤدي إلى تحلل أملاح الكالسيوم وارتفاع مستوى
أيوناته في الدم ، ومتى يصل تركيز الكالسيوم في الدم
إلى المعدل الطبيعي تصبح الخلايا الهدامة للعظم غير
نشطة ويخفى تأثيرها .

التركيب البنائي للعظام .

غلاف العظم الخارجي

غلاف العظم أو ما يعرف باسم النسيج لعظام عبارة عن
نسيج ضام كثيف غير منظم يغطي معظم العظام فيما
عدا أسطح التمفصل . وهذه الطبقة من النسيج الضام


تحتوى على أوعية دموية تساعده فى إمداد خلايا العظم بالعناصر الغذائية والأكسجين .

العظم الكثيف

الصفائح حول العظم الخارجى والداخلى

وهي عبارة عن مجموعة من الصفائح العظمية المتوازية تقع تحت كل من غلاف العظم الخارجى وأيضا النسيج المحيط بالعظم الداخلى ويمتد من هذه الصفائح قنوات فولكمان التى تخترق وتتصل بالقنوات الهافرسية . وهذه القنوات الأخيرة تحتوى على أوعية دموية وليمفية وأعصاب وهى قنوات مركبة داخل ما

يعرف باسم المجاميع الهافرسية .



المجاميع الهافرسية:

هذه المجاميع الهافرسية توجد فقط فى العظم الكثيف وكل مجموعة هافرسية تتكون من قناة هافرسية فى.

المنتصف محاطه بعدد من الصفائح متحدة المركز وهذه الصفائح تتكون من المادة العظمية البينية (عدها من 15-8 صفيفحة) والخلايا العظمية ، والتى تترتب فى دواير بين هذه الصفائح . وكما سبق ذكره فإن الخلايا العظمية لها زوائد عديدة تمتد فى قنوات دقيقة وتعمل على اتصال الخلايا بالقنوات الهافرسية المركزية . أيضا توجد قنوات تعمل أيضا على اتصال القنوات الهافرسية مع بعضها وتسمى وصلات بين هافرسية ومن هنا يكون نسيج العظم وحدة واحدة .

ج- الصفائح البينية

هي مجاميع من الصفائح تملأ الفراغات بين المجاميع الهافرسية .

العظم الإسفنجي

العظم الإسفنجي بسيط التركيب مقارنة بالعظم الكثيف ، وهو عبارة عن حواجز عظيمة تحتوى على عدد من الصفائح العظمية وتتغمس فيها الخلايا داخل المحافظ وتكون متصلة مع بعضها بالقنوات الدقيقة كما يملا الفراغات فى العظم الإسفنجي نخاع العظم .

غلاف العظم الداخلى

هذا عبارة عن طبقة رقيقة تبطن فراغات نخاع العظم وهو يشبه غلاف العظم الخارجى فى كونه نسيجا ضاما كثيفا غير منظم.

الأنسجة الضامة الوعائية :

يقصد بالأنسجة الوعائية تلك الأنسجة التى تنشأ من الميزودرم وحيث إن المادة بين الخلوية موجودة فى صورة سائلة ؛ لذا فلا بد من احتواء داخل أوعية ، وعلى ذلك تعتبر هذه الأنسجة أحد أنواع الأنسجة الضامة التخصصة وهى تشتمل على الدم والليمف.

الدم :

يكون الدم حوالى 7% من وزن الجسم ويتألف من: خلايا الدم والتى تعرف أيضا باسم العناصر المكونة وهى تمثل حوالى 45% من حجم الدم .

السائل خارج الخلايا والذى يعرف باسم بلازما الدم ويمثل حوالى 55% من حجم الدم .

خلايا الدم (العناصر المكونة)

يشتمل الدم على ثلاثة خلايا هي :

1-كريات الدم الحمراء وتسمى أيضا خلايا الدم الحمراء

هي خلايا قرصية مقرفة الوجهين ، لا تحتوي الخلايا البالغة منها على أنوية، تحتوي على مادة الهيموجلوبين حمراء اللون، يوجد في 1 مل من الدم 3-4.5 مليون كررة دم حمراء في الإناث، بينما 3 مليون كررة دم في الذكور يحوي من 5-5.5 مليون كررة دم حمراء.

تعيش في الغالب 120 يوم ثم تتحطم في الطحال.

2-خلايا الدم البيضاء وهي خلايا غير منتظمة الشكل ، تحتوي على أنوية ، حركتها أمبية، 3 مليون يحتوي على 7-5 آلاف خلية ، تزداد في حالة المرض (الالتهابات) منها أنواع مختلفة .

الخلايا الغير محببة : السيتوبلازم بها رائق غير محبب وتنقسم إلى الكريات الكبيرة (و هذه كبيرة الحجم و النواه فيها تأخذ شكل الكلية أو حدوة الحصان) و الكريات الليمفية (و هذه


صغريرة الحجم و النواه كبيرة مستديرة تشغل معظم الخلية

الخلايا المحببة: و السيتوبلازم فيها محبب وتنقسم فيها حسب
الى قابليتها للصبغات

المحبة للحمض ويصبح فيها السيتوبلازم بالصبغات الحامضية

المحبة للفاdueة ويصبح فيها السيتوبلازم بالصبغات القاعدة

المتعلدة و تأخذ فيها الخلايا الصبغات الحامضية و القاعدية و
هي اكثرا الخلايا البيضاء عددا



Plaquettes **sanguines** **الدموية** **الصفائح**

أجسام صغيرة ، عديمة اللون ، تنتج عن تفتقن نوع من الخلايا الموجودة في نخاع العظام تعرف بالخلايا الكبيرة . تلعب الصفائح دورا هاما في تجلط الدم عند الإصابة بالجروح .

أجسام صغيرة ، عديمة اللون ، تنتج عن تفتقن نوع من الخلايا الموجودة في نخاع العظام تعرف بالخلايا الكبيرة . تلعب الصفائح دورا هاما في تجلط الدم عند الإصابة بالجروح .

4- البلازم :

سائل يشكل 55% من الدم يتكون من :

- أ- ماء 90% ب- مواد أخرى 10%
- أيونات الأملاح المعدنية مواد عضوية (كربيوهيدرات ، بروتينات، دهون و فيتامينات) بعض الغازات المذابة مثل ثاني أكسيد الكربون.

تشمل العضلات الجسمية التي تقوم بالحركة ويكون من وحدات تسمى الخلايا أو الألياف العضلية Muscle Fibers والليفة العضلية طولها بين 60-100 ميكرون وهي تتكون من طبقة الميزودرم ولها القدرة على الانقباض والانبساط ولذلك فإن السيتوبلازم متور إلى خيوط تسمى ليفات عضلية Myofibrils تجري موازية للمحور الطولي للليفة العضلية وهي غنية بمادة الميوسين Myosin أما بقية السيتوبلازم فيعرف بالساركوبلازم Sarcoplasm والنواة بيضاوية الشكل وتحاط الليفة من الخارج بغشاء العضلي Sarcolemma وهناك 3 أنواع من الأنسجة العضلية تختلف في المكان والشكل والوظيفة:

أ- الأنسجة العضلية الملساء

ب- الأنسجة العضلية المخططة

ج- الأنسجة العضلية القلبية

العضلات الغير مخططة (المساء) اللاارادية

Unstriated (Smooth) Involuntary Muscles

:

وهي موجودة في الأماكن التي لا تخضع للإرادة ولا يمكن التحكم في حركتها مثل جدران القناة الهضمية والأعضاء التناسلية والأوعية الدموية وتكون ألياف مغزلية الشكل مدبية الطرفين تحتوى على عدد كبير من الليفبات العضلية وكمية قليلة من الساركوبلازم والنواة بيضاوية في الوسط ويختلف طول هذه الألياف في الأماكن المختلفة فمثلاً يبلغ طولها 20 ميكرون في الأوعية الدموية وتصل إلى 200 ميكرون في جدار الأمعاء و500 ميكرون في جدار رحم الأنثى الحامل وقد توجد الألياف منفردة كما في الجلد أو شبكة كما في الأعضاء التنفسية أو طبقات عضلية سميكة كما في القناة الهضمية فتوجد طبقة طولية للخارج تجرى أليافها موازية لقناة وطبقة دائرة للداخل تجرى ألياف موازية لمحيط القناة ويعمل انقباض العضلات الطولية على قصر وغلظ القناة بينما انقباض العضلات الدائرية يعمل على طولها ورفعها وبذلك تتم الحركة الدودية للأمعاء .


لتساعد على مرور الغذاء

العضلات المخططة (الهيكالية) الارادية **(Skeletal Voluntary Muscles)**:

وهي عضلات ارادية تخضع لارادة الحيوان مثل عضلات الأطراف والرأس والفكوك ، وهي تكون الجزء الأكبر مما يسمى بـ **Sarcolemma** بلحم الحيوان والليفة العضلية في هذه الحالة أسطوانية يغلفها من الخارج غشاء رقيق يسمى الصفيحة المحامية و يوجد في كل ليف عدد من الأوتوية بيضاوية الشكل موازية لمحور الليفة ويعرف هذا التركيب المحتوى على أوتوية كثيرة بدون حاجز خلوي بينها بالمدمج الخلوي **Syntaxium** والليفة العضلية المخططة تحتوى على عدد من الليفقات العضلية التي تترکب من مادتين متباولتين بانتظام أحدهما داكنة اللون والأخرى باهتة ويسمى الجزء الداكن بأشرطة **A** والجزء الباهت بأشرطة **Z** أو بذلك تبدو الليفة مميزة إلى أشرطة معتمة وأشرطة مضيئة **Dark and light Bands** بالتبادل ويخترق المنطقة الداكنة خط ياهر يعرف بخط هانس **Hanes's Membrane** كما يخترق المنطقة الباهتة خط داكن يعرف بغشاء **Krause Membrane** ويرمز له بالرمز **Z** وهو متصل بالسلوكولينما ويفصل الليفة بما فيها من ليففات إلى أجزاء تعرف بالقطع **Sarcmeres** العضلية




عضلات ملساء



عضلة مخططة هيكالية

العضلات القلبية Cardiac Muscles

وهي موجودة في القلب فقط وتظهر في القطاع الطولى متفرعة ومتصلة ببعضها لتكون تركيبا شبكيا وتحاط الليفه بغشاء الساركوليما وبها الأشرطة المعتمة والمضيئة ولكنها أقل وخصوصا عن العضلات المخططة وتوجد بها أنوية بيضاوية الشكل في وسط الليفه وتظهر داخل الألياف أقراص عرضية داكنة هي الأقراص البينية Intercalates Disc وتنميز العضلات القلبية بانقباضاتها المنتظمة لتعطى نبضات القلب كذلك فهي متصلة بتقعرات عصبية سمبثاوية حيث تعمل هذه التقعرات على تنظيم انقباضات القلب وليس لهذه الألياف القدرة على التجدد أو التضخم.




النسيج العصبي

ويكون هنا النسيج من خلايا تحورت بطريقة معينة تمكناها من استقبال المؤثرات الحسية والعصبية Stimuli الخارجية والداخلية ونقلها بين أجزاء الجسم المختلفة .

وتنشأ هذه الأنسجة من طبقة الإكتودرم لتكون نوعين من الخلايا هما :

1- خلايا إكتودرمية تتميز إلى خلايا عصبية جنинية تعرف بأمهات الخلايا العصبية Reareroblasts التي تتحول تدريجياً إلى خلايا عصبية Neurons مكتملة النمو .

خلايا إكتودرمية تتميز إلى خلايا أسفنجية Spongio التي تتحول إلى خلايا الغراء العصبي Blasts التي تحمى الخلايا العصبية وتربطها Neuroglia بعضها ببعض .



• الخلية العصبية Neuron:

وهي تتكون من جسم الخلية Cyton الذى يختلف فى الحجم والشكل من خلية إلى أخرى فقد يكون مستديراً أو بيضاوياً أو مغزلياً أو نجمى الشكل ويحتوى على نواة مستديرة بها كمية قليلة من المادة الكروماتينية بداخلها نواة واحدة أو أكثر وتحاط النواة بالسيتوبلازم الذى يحتوى بالإضافة إلى المحتويات السيتوبلازمية العادمة مثل جهاز جولجي والميتوكوندريا والليسوسومات على تركيب آخر خاص بالخلايا العصبية فقط مثل أجسام نسل والليفيات العصبية .

وأجسام نسل Nissl Bodies عبارة عن حبيبات غير منتظمة الشكل ومختلفة الحجم وهى توجد أيضاً في الزوائد الشجيرية

ولكنها لا توجد في المحور وهي أجسام غنية بحامض الريبيونيكليك .

الأحماض النووية وبها نسبة عالية من الحديد وتلعب هذه الأجسام دوراً أساسياً في قيام الخلية العصبية بوظائفها وتخفي عند إجهاد الحيوان وتظهر مرة أخرى في فترة الراحة .

أما الليفافات العصبية Neuro Fibrils فهي عبارة عن خيوط رفيعة مقاطعة تكون تركيباً شبكيّاً وتمتد خيوطها في المحور والزوائد الشجيرية وهي التي تنتقل خلالها المؤثرات الحسية والعصبية في جسم الخلية والخلية العصبية البالغة لا تحتوي على الجسم المركزي لأنها فقدت القدرة على الانقسام ويتفرع من جسم الخلية نوعين من الزوائد :

أ- عدد من الزوائد الصغيرة المتفرعة تعرف بالزوائد الشجيرية Dendrites تستقبل المؤثرات وتنقلها إلى جسم الخلية .

ب- زائدة واحدة طويلة هي المحور Axon وهي تمتد من جسم الخلية وتنقل المؤثرات العصبية خارج الجسم وهي تنتهي بتفرعات صغيرة تعرف بالتفروعات الانتهائية Nerve

وتجتمع محور الخلايا العصبية مع بعضها لتكون Ending Nerves . الأعصاب .

وتوجد أجسام الخلايا العصبية في بعض الأعضاء العصبية كالمخ والنخاع الشوكي والعقد العصبية وتخرج الأعصاب من هذه الأعضاء لتمتد إلى أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة وتنظم الخلايا العصبية بطريقة خاصة بحيث تقم نهايات التفرعات الانتهائية لمحور إحدى الخلايا قريبة من الزوائد الشجيرية للخلية المجاورة وذلك يسمح بمرور السيالات العصبية من خلية أخرى

• أنواع الخلايا العصبية :

تصنف الخلايا تبعاً للزوائد المتصلة بها إلى :

١- الخلايا العصبية وحيدة القطب **Unipolar Nerve**

Cell:

وتتصل بها زائدة واحدة فقط تمثل محور الخلية
ويوجد هذا النوع في الفقرات البدانية .

٢- الخلية العصبية ذات القطبين **Bipolar Nerve**

Cell :

وتتصل بها زائدين أحدهما زائدة الشجيرية
والأخر محور الخلية وتوجد في الأطوار
الجنبية وفي شبكة العين .

٣- الخلية العصبية عديدة الأقطاب **Multipolar Nerve**

Cell :

وهي النوع الشائع في الجهاز العصبي لها محور واحد وعدة
زوائد شجيرية .

أجهزة الجسم المختلفة

الباب الثالث

الجهاز العضلي

أنواع العضلات

(١) العضلات الهيكلية:

سميت بهذا الاسم نظراً لاتصالها بالهيكل العظمي، وكذلك فإنها تسمى بالعضلات الإرادية، وذلك نتيجة لخضوعها لسيطرة وإرادة الإنسان، ويعرف هذا النوع من العضلات المخططة؛ نظراً لظهورها بهذا الشكل تحت الميكروскоп.

(٢) العضلات الملساء:

غير خاضعة لسيطرتنا أي عضلات غير إرادية وغير مخططة تدخل في تكوين الجزء العضلي في الأوعية الدموية والقناة الهضمية، وتتميز العضلات الملساء بأن خلاياها مغزلية الشكل، ويتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي (السمباثاوي والبارسمباثاوي).

(٣) عضلة القلب:

غير خاضعة لإرادتنا وغير إرادية وتتميز بالقدرة على الانقباض والتوصيل للتيار الكهربائي، وكذا على الانقباض الذاتي، وت الخاضعة لسيطرة الجهاز العصبي الذاتي، وهي تتكون من عضلات متشعبية ومتتشابكة بعضها مع بعض. ونشاط

عضلة القلب ذاتي ببدأ في العقدة الجيب أذنية الموجودة في الأذنين الأيمن، والتغذية العصبية للقلب، والجهاز العصبي الذي يعمل على تنظيم هذا النشاط.

العضلات الهيكلية

عضلات إرادية متصلة بالهيكل العظمي وعددتها ٤٣٤ عضلة في الإنسان، وعلى هذا النوع من العضلات يقع العبء الرئيسي في النشاط الرياضي، والحركة والاتزان، وهذا الأداء العضلي يحدث عن طريق تفاعل الجهاز العضلي بأجهزة الجسم المختلفة، فالطاقة الكيميائية اللازمة لإنتاج العمل الميكانيكي تأتي عن طريق الهضم والتمثيل الغذائي، ثم تأتي أجهزة نقل خاصة لتحمل المواد الغذائية إلى العضلات، والفضلات إلى أعضاء الإخراج، ثم يأتي الأكسجين اللازم للاحتراق؛ نتيجة للترابط الوظيفي بين الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، وإخراج الفضلات الزائدة والغازية، يعتمد على السعة والقدرة الوظيفية لأجهزة الإخراج، مثل الجهاز البولي والجلد والرئتين. كل هذه العمليات تننظم وترتبط عن طريق الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء.

الخصائص التكوينية الأساسية للعضلة:

ت تكون العضلة من مجموعة من الخلايا (الألياف) العضلية، والخلية العضلية أو الليفية العضلية هي أصغر وحدة تركيبية وظيفية في العضلة الهيكالية، وهي طويلة ويختلف طولها في الأجزاء المختلفة من الجسم، ففي بعض الأماكن يكون طولها عدة سنتيمترات، وأحياناً يصل طولها إلى ٣٠ سم، كذلك يتراوح قطرها بين ٥٠ - ١٠٠ ميكرون.

- وت تكون العضلة من عدة أنواع من الأنسجة كغيرها

من الأعضاء، ولكن العنصر الغالب من الأنسجة فيها هو النسيج العضلي، بالطبع ويوجد بين مجموعة النسيج العضلي هذه نسيج ضام، وشبكة من الشعيرات الدموية والأعصاب. تكون كل مجموعة من النسيج العضلي حزمة عضلية التي تكون بدورها العضلة، ويختلف عدد وحجم الحزم العضلية تبعاً لحجم العضلة، لكل عضلة طرفان أحدهما المنشأ: وهو الأكثر ثباتاً، والثاني الاندماج وهو الأكثر حرمة أثناء انقباض العضلة.

- يتحول النسيج العضلي عند طرفي العضلة إلى نسيج ليفي يسمى وتر العضلة، يتصل بالعظم ويعمل على توصيل القوة الميكانيكية من العضلات إلى المفاصل والظامان.
- تتشكل العضلات من العظام وتندعم إليها بواسطة الأوتار.
- يختلف شكل العضلة العام تبعاً لاتصالها بالعظم، ف تكون مستطيلة أو مربعة أو مسطحة، وربما تكون ذات رأسين أو أكثر.
- تتكمش العضلة عند الانقباض ويقل طولها، فتعمل على تقوية الاندفاع إلى المنشأ، وذلك يحدث الحركة عند المفاصل.

التركيب المجهرى للليفه العضلية:

تظهر الليفة العضلية تحت الميكروскоп (المجهر) المعتمد مخططة تخطيطاً منتظماً ناتجة لتوالي الحزم المضيئة (الباهنة) التي تتكون من مادة الاكتين والحزم المعتمة التي تتكون من مادة الميوسين، ويمكن ملاحظة قوية تحت الميكروскоп العادي أن نرى خطأ قاتماً خالل الحزمة

المضيئه يعرف بخط زد، ومنطقة مضيئه في الحزمة المعتمة تعرف بحزمة اتش.

الاتصالات العصبية بالعضلة الهيكليه:

هناك ثلاثة أنواع من الأعصاب تربط العضلة الهيكليه بالجهاز العصبي هي:

١ - الأعصاب الحسية:

تنقل الإحساس من العضلة إلى الجهاز العصبي.

٢ - الأعصاب المحركة:

تنقل الأوامر والإشارات من الجهاز العصبي إلى العضلة لكي تقبض، وكل مجموعة من الألياف العضلية تتصل بفرع من العصب المحرك، ويسمى هذا الفرع ومجموعة الألياف العضلية التي تحكم فيها بالوحدة المحركة.

٣ - الأعصاب اللامارادية:

وهي التي تحكم في اتساع وضيق الأوعية الدموية المغذية للعضلة، وتلعب دوراً هاماً في قوة وسرعة انقباض العضلة.

خصائص العضلات

١- القدرة على الامتداد:

وهي تلك القدرة التي تمكن العضلة من التمدد بين المنشأ والاندماج، ويلاحظ أن هذه الصفة أوضح في الصغار من الكبار، وزيادة قدرة العضلة على الامتداد تقل من حدوث التمزق العضلي، ونتيجة لذلك يلاحظ حدوث التمزق العضلي في الكبار أكثر من الصغار.

٢- المرونة:

وهي صفة من صفات العضلات التي تمكنها من العودة بشكلها، وحجمها الطبيعي بسرعة بعد زوال المؤثر المسبب لامتداد العضلة بين المنشأ والاندماج.

٣- الاتقباض:

وهي الصفة التي تمكن العضلة من الاستجابة للمؤثرات المختلفة حتى تستطيع القيام بعمل معين، وتعمل كل وحدة حركية كوحدة مستقلة تخضع في عملها لقانون الكل أو العدم،

ويعتمد قوة الانقباض العضلي على عدد الوحدات الحركية المشاركة فيه، فكلما زادت عدد الوحدات، كلما زادت قوة الانقباض.

وظائف العضلات

أولاً: وظائف العضلات الهيكلية:

١ - الحركة:

تعمل العضلات الهيكلية بتعاون وثيق مع بعضها البعض، ومن بقية أعضاء الجسم وأجهزته، حتى يتمكن الإنسان من أداء الحركة المطلوبة بكفاءة ودقة.

٢ - حفظ واتزان الجسم:

العضلات الهيكلية هي العامل الأساسي في حفظ واتزان الجسم أثناء الحركة وأثناء السكون، وذلك عن طريق النغمة العضلية الدائمة.

٣ - المحافظة على درجة حرارة الجسم:

من وظائف العضلات الهيكلية إنتاج الطاقة الحرارية التي تساعد في المحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة، وعن طريق تغيير قوة النغمة العضلية الدائمة.

٤ - رجوع الدم للقلب:

تعمل العضلات الهيكيلية كمضخات طرفية، وبذلك تساعد رجوع الدم للقلب من الأوردة؛ حيث يؤدي انقباض العضلات الهيكيلية على الضغط على الأوردة ودفع الدم في اتجاه القلب.

٥- عضلات هيكيلية لها وظائف خاصة:

مثل دور الحجاب الحاجز في عملية التنفس، ودور العضلات الهيكيلية المكونة للبوابات الخارجية للمثانة البولية، والمستقيم في عملية التبول والتبرز.

ثانياً: عضلة القلب:

تعمل عضلة القلب كمضخة ماصة كبasa، ويستقبل الدم من الأوردة أثناء انبساطها، وتدفع الدم في الشريانين أثناء انقباضها.

ثالثاً: العضلات الملساء:

تقوم العضلات الملساء بوظائف متعددة تبعاً للمكان الموجودة فيه، وعلى سبيل المثال:

أ- تقوم العضلات الملساء الموجودة في الأوعية الدموية، بتتنظيم المقاومة الطرفية التي تساعد في المحافظة على ضغط الدم.

بـ- تقوم العضلات الملساء الموجودة في الجهاز الهضمي بتنظيم عملية الهضم والامتصاص؛ حيث تقوم العضلات الملساء الموجودة في الجهاز التنفسي بتنظيم دخول وخروج الهواء للجهاز التنفسي.

ميكانيكية الانقباض العضلي:

يحدث الانقباض العضلي نتيجة لانزلاق الحزم المضيئة (حزم الاكتين) على الحزم المعتنة (حزم الميوسين)، وذلك نتيجة لوصول الإشارة العصبية التي تحول الطاقة الكهروكيميائية إلى طاقة ميكانيكية تمكن العضلة من تأدية عمل ميكانيكي، وتعتبر مادة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات هو المنبع المباشر للطاقة، وكذلك فإن الجسم يعمل باستمرار على إعادة تكوين مادة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات عن طريق اتحاد مادة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات، ويلاحظ أيضاً أن الارتخاء العضلي يحتاج أيضاً للطاقة، ومادة التربونيين الذي يفصل الاكتين والميوسين.

أنواع الانقباض العضلي:

أ- الانقباض متشابه التوتر:

هو الانقباض الذي تقصر فيه العضلة ولا يزيد توترها، وتنكم العضلة خلاله من تأدية عمل خارجي مثل قذف كرة بالقدم.

ب- الانقباض متشابه الطول:

وهو الانقباض الذي لا يصاحبه تغير في الطول بحيث لا تقصر العضلة، ولكن يزيد التوتر فيها، ولا يؤدي عمل خارجي بواسطة هذا النوع من الانقباض مثل الضغط على الحائط.

فرق الجهد الغشائي أثناء الراحة:

يختلف التركيب الأيوني على جانبي جدار الخلية بحيث يكون تركيز الأيونات الموجبة على السطح الخارجي أكثر من تركيز الأيونات السالبة، بينما يحدث العكس على السطح الداخلي مما يخلق فرقاً في الجهد الكهربائي بين المسطحين أثناء الراحة موجباً في الخارج وسالباً في الداخل، وهذا ما يسمى بـ "فرق الجهد الغشائي أثناء الراحة" ونجد على السطح الخارجي تركيزاً عالياً لأيونات الصوديوم التي لا يسمح لها الجدار بال النفاذ إلى الداخل، كما يوجد على السطح الداخلي تركيزاً عالياً لأيونات البوتاسيوم، ولكي يحتفظ جدار الخلية بفرق التركيز ثابتاً بين المسطح الخارجي والداخلي، فإنه يبذل طاقة لدفع الصوديوم للخارج، والبوتاسيوم للداخل، ويبلغ فرق الجهد الكهربائي بين خارج وداخل الخلية العصبية حوالي ٧٠ ملي فولت الموجب في الخارج والسلب في الداخل، ويلاحظ أن السطح الخارجي لجدار الخلية العضلية أثناء الراحة موجباً لوجود كثرة من شحنات الصوديوم الموجبة، والسطح الداخلي يكون سالباً لوجود كثرة من شحنات البروتين السالبة.

الاستثارة:

يؤدي وصول الإثارة العصبية إلى نهايات المحور عند نقطة التشابك العصبي (وهي نقطة الاتصال بين خلتين عصبيتين) إلى انفجار بعض الحويصلات الموجودة في نهاية المحور، وتخرج منها مادة الاستيل كولين (الناقل الكيميائي) التي تذهب إلى مستقبلات خاصة على جدار الخلية العصبية التالية مسببة انطلاق أيونات الكالسيوم من الثقوب الموجودة في الجدار، فتنتج زيادة في اتساع هذه الثقوب مما يؤدي إلى دخول مادة الصوديوم الموجبة، فيصبح السطح الخارجي سالباً والداخلي موجباً؛ أي ينعكس فرق الجهد الكهربائي أثناء الراحة ويزول الاستقطاب، ثم تخرج أيونات البوتاسيوم؛ حيث يتكون ما يسمى بالشوكة الكهربائية التي تستغرق وقتها يترافق بين ١٥ - ١٠٠ ملي ثانية، ثم ما تلت مضخة الصوديوم النشطة أن تتولى طرد الصوديوم، ويستعيد العشاء فرق جده الأول (- ٧٠ ملي فولت) أثناء الراحة.

وقد لا يصل انخفاض الاستقطاب إلى حد كاف ويفشل في إيجاد الإثارة العصبية في منطقة التشابك العصبي. وهذا ما

يسمى بحالة استئارة موضعية. وقد تراكم وتتجمع لتحول إلى إثارة عصبية.

انتقال الإشارة العصبية من المحور إلى العضلة:

يتفرع المحور العصبي للخلية العصبية الحركية إلى عدة فروع يغذي كل فرع منها عدداً من الألياف العضلية، ويسمى موضع الاتصال هذا بالصفحة النهائية الحركية، ويطلق على المحور العصبي والألياف العضلية التي يغذيها وحدة حركية تتبع في تشغيلها قاعدة الاستجابة القصوى عند إثارتها بمؤثر كاف أو عدم الاستجابة على الإطلاق عند إثارتها بمؤثر غير كاف (قانون الكل أو العدم).

خواص انتقال الإشارة العصبية من المحور إلى العضلة:

- 1- هذا الانتقال يأخذ وقتاً نتيجة إفراز مادة الأستيل كولين من النباتات العصبية للمحور وتجمعها، ثم تأثيرها على المستقبلات الموجودة في الصفحة النهائية الحركية.

- ٢ هذا الانتقال يأخذ طريقاً واحداً من المحور للعضلة وليس العكس.
- ٣ الصفيحة النهائية الحركية تتعرض للتعب أسرع من المحور أو العضلة.
- ٤ يتأثر انتقال الإشارة من المحور إلى العضلة بالعديد من الأدوية والعقاقير.

التعب أو الإرهاق العضلي:

ينشأ الإرهاق العضلي بعد فترة طويلة من المجهود العضلي الثقيل، الذي يشكل عبئاً على الجهاز الدوري والتنفسى، فضلاً عن الجهاز العصبى والعضلى، ويختلف الشعور بالإرهاق من شخص لآخر.

ومن أهم أسباب الإرهاق العضلى:

١- أسباب فرعية:

أ- أسباب خاصة بالأعصاب الحسية: وينتج الإرهاق العضلى في هذه الحالة من تراكم حمض اللاكتيك أثر

الانقباض الطويل للعضلة في غياب الأكسجين؛ مما يؤدي لاستئثارة المستقبلات الحسية على أطراف الأعصاب الحسية.

بـ- أسباب خاصة بالألياف العضلية: وينتج الإرهاق العضلي في هذه الحالة؛ نتيجة نفاذ مواد الطاقة بالعضلة أثر المجهود الشاق وتتابع الانقباض والانبساط.

٢- أسباب مركبة:

أـ- قد يكون سبب الإرهاق هو استنفاد مادة الاستيل كولين المفرزة في نقط التشابك العصبي.

بـ- وقد يكون السبب هو قصور في وظائف الخلايا العصبية الحركية؛ نتيجة الإرهاق العام، ويمكن تلافي هذا عن طريق توفير فترات راحة أثناء الإعداد الرياضي.

الألم العضلي:


هو الإحساس بالألم الشديد في العضلات وزيادة في توئرها؛ نتيجة التعرض لمجهود شاق لم تؤهل هذه العضلات لمنته من قبل، وتصل هذه الأعراض ذروتها بعد ١٢ - ٢٤ ساعة، وتتلاشى تدريجياً في ٤ - ٦ أيام.

وبسبب هذه الحالة هو تهتك في النسيج العضلي خاصة عند مناطق اتصاله بالعظام، وقد تكون هذه الحالة نتيجة خروج مادة الهيباتامين التي تحدث ألمًا مصحوبًا بتورم. وهذه الحالة تحدث غالباً للناشئين أو اللاعبين القدامى في أول الموسم الرياضي، وعادة ما تكون هذه العضلات أكثر قوية بعد الشفاء.

الجهاز الهضمي في الإنسان

The Human Digestive system

هناك عمليات طبيعية و كيميائية يتم بها هضم الغذاء الذي يتناوله الإنسان و لا يوضح هذه العمليات يجب ان نتعرف معها على أجزاء الجهاز المعدى المعاوى و الذى يتكون من أ- القناه المعدية المعاوية - ب- الأعضاء الغدية.



القناه المعدية المغوية Gastrointestinal Tract (GIT)

و تشمل الفم ، البلعوم ، المرئ ، المعدة ، الامعاء الدقيقة ،
الامعاء الغليظة و المستقيم (الرسم هنا)

الفم The Mouth و الهدم الميكانيكى للغذاء : الفم يتكون من الفكين و الاسنان و هو تكوين معقد يقوم بهدم الغذاء ميكانيكيا و بدرجة أقل كيميائيا ، و هو بداية القناه الهضمية و فيه يبدأ الهضم بمضغ الطعام فالاسنان الحادة من الامام تشرح الغذاء و تقطعه فى حين ان الضروس تقوم بطحن الغذاء و تحوله الى قطع صغيرة يسهل بلعها . و أثناء طحن الغذاء فى الفم يضاف اليه اللعاب الذى تفرزه ثلات أزواج من الغدد اللعابية وهى غدد خارجية الافراز توجد بالتجويف الفمى و تصب افرازاتها فى الفم عن طريق قنوات . و ينبع افراز اللعاب بواسطة رائحة الغذاء و الشعور به و طعم الغذاء و أحيانا التفكير فيه ، أما وظائف اللعاب فهى :

احتواه على المخاط الذى يعمل على ترطيب و لزوجة قطع الغذاء الصغيرة فيجعلها سهلة البلع .

قتل بعض انواع البكتيريا عن طريق ما يحتويه من
انزيمات أو أجسام مضادة.

يسبب ترطيب الفمو بالتالى المساعده على الكلام.
يحتوى اللعاب على انزيم الأميليز و الذى يقوم بالهضم
الجزئى للسكريات العديده.

اذابة بعض المواد و المساعده على تنزقها، فالجزئيات
الذائبة من الأكل تستطيع التفاعل مع المستقبلات
الكيميائية بالأدمى مما يعطى الاحساس بطعم الغذاء.

يعمل اللعاب على تنظيم و تطهير الأسنان حيث يزيل
البكتيريا و بقايا الطعام.

و المعروف أن هناك ايقاع بيولوجي فى افراز اللعاب
فافراز اللعاب ينقص بدرجة كبيرة اثناء النوم وبالنالى
فإن البكتيريا تتراكم على سطح الاسنان و تقوم بهضم
الجزئيات الصغيرة المتبقية من الطعام حيث تنتج بعض
الروائح الكريهه و التى تظهر عند الاستيقاظ.

اللسان Tongue : يلعب اللسان دور هام في بلع الطعام
بعد مضغه و بالإضافة الى انه يساعد على الكلام فهو
يحتوى ايضا على مستقبلات التذوق او براعم التذوق و
الموجوده على السطح العلوي من اللسان . و براعم

التذوق هذه تنشط بواسطة أربعة أنواع أساسية من النكهات و هي : الحلو ، اللازع ، الحاذق (الملحى) والمر و عملية خلط أكثر من نكهة من هذه النكهات بجانب الروائح التي تصاحب كل نكهة على حده يعطى الأغذية تشكيلاً متنوعاً من التذوق .

البلعوم Pharynx و الحركة الدودية في المريء Esophagus : البلعوم و المريء ليس لهم دور في عملية الهضم و لكنهم عبارة عن طريق لتوصيل الغذاء إلى المعدة ، و يقوم لسان المزمار Epiglottis بمنع الغذاء المار من البلعوم إلى المريء من دخول القصبة الهوائية Trachea أثناء عملية البلع.

المعدة Stomach

تشبه الكيس و هي عضو عضلي قابل للتمدد وتقوم بعدة وظائف أهمها :

تخزين و اسالة الغذاء
يحدث بها هضم جزئي للغذاء

تنقل محتوياتها إلى الأمعاء الدقيقة بعد جعلها في شكل خلطة شبه سائلة تسمى الكيموس

ويتم هذا النقل في نبضات محددة تتناسب مع عملية الهضم والامتصاص بالأمعاء الدقيقة. و المعدة تقع في الجانب اليسير من التجويف الصدرى حيث يقوم بحمايتها جزئيا القفص الصدرى. و يوجد عند اتصال المعدة بالمرئ صمام وظيفي يسمى الصمام المعدى المرئي وهو ناتج عن زيادة بسيطة في سمك الجدار العضلى للمعدة عند اتصالها بالمرئ وفائدى هذا الصمام هو منع الغذاء بعد دخول الحامض الموجود بالمعدة من العودة إلى أعلى حيث يسبب هذا تهيج للمرئ وحرقان في فم المعدة . و عند وصول الغذاء إلى الجزء السلفي من المرئ يفتح هذا الصمام ليسمح للغذاء بالدخول إلى المعدة ثم يقل في الحال ليمنع نفاذ الحامض المعدى HCL إلى المرئ والغدد المبطنة للمعدة تقوم بإفراز حمض الهيدرو كلوريك المعدى بالإضافة إلى سائل مائي لتحويل الغذاء إلى عجينة ومجموعة إنزيمات هاضمة للبروتين تسمى في مجملها بالبسبين

وتفرز انزيمات البيسين فى صورة غير نشطة تسمى
ببسينوجين و يقوم حمض الهيدروكلوريك بتحويلها الى
الصورة النشطة ببسين.

 ببسينوجين (صورة غير نشطة) ببسين (صورة نشطة)

والوظيفة الاساسية لحمض الهيدروكلوريك هي :
اذابة أجزاء الغذاء عن طريق عمله على تغيير تأين
الجزيئات المستقطبة خصوصاً البرونينات .

يعمل على تكسير النسيج الضام الخارج خلوي والذى
يشكل الهيكل التركيبى لأنسجة الغذاء (يقوم بإسالة
الغذاء) .

ينشط الحامض المعدى ببسينوجين والذى يفرز فى
صورة غير نشطة يحوله إلى انزيم ببسين النشط .
يقلل من التأثير الضار للعديد من الميكروبات التى تصل
إلى المعدة مع الغذاء .

يعمل على تجبن اللبن فى المعدة مما يعطى فرصة
لإنزيم البيسين لهضم جزء من بروتينين اللبن .

الهضم في منطقة الأمعاء :

تنقل المادة الغذائية مختلط بالعصارة المعدية من المعدة إلى الأمعاء بفعل انقباض العضلات الملساء الموجودة في جدار المعدة . ومن المعروف أن الحركة الرئيسية لجدرة المعدة هي الحركة الدودية . وعلى ذلك فعند وصول المادة الغذائية إلى الجزء الأول من الأمعاء والمعروف باسم الإثنى عشر يختلط بنوعين من العصارة هما العصارة البنكرياسية والتي يقوم بإفرازها البنكرياس والعصارة الصفراوية والمعروفة باسم الصفراء والتي تصل إلى الإثنى عشر من الكبد الذي يقوم بتصنيعها أو من الحصولة المرارية التي تقوم بتخزينها . ويطلق على المادة الغذائية عند اختلاطها بهذه العصارات الإثنى عشر اسم الكيموس . وعند اختلاط الكيموس بالعصارة البنكرياسية والصفراء يتم معادلة حموضة المعدة نتيجة احتواء كلتا العصاراتين على نسبة عالية من مادة البيكربونات وهذا يساعد على اتمام عملية هضم الغذاء في منطقة الأمعاء ، حيث أن جميع الإنزيمات التي تعمل في منطقة الأمعاء ذات رقم

هيدروجيني يقترب من الوسط المتعادل أو قليل القاعدية وسوف يكمل عمليات الهضم في الأمعاء العصارة المعوية والتي تفرز من غدد الأمعاء نفسها .

العصارة البنكرياسية

تعتبر العصارة البنكرياسية من أهم العصارات الهاضمة لاحتواءها على إنزيمات تساعده في هضم المركبات العضوية الرئيسية الموجودة في الغذاء وهي المواد الكربوهيدراتية والبروتينات والدهون ، هذا بالإضافة إلى احتوائها على مادة البيكربونات والتي أشرنا إلى وظيفتها من قبل . وانزيمات العصارة البنكرياسية هي :

انزيم الترسبين يفرز هذا الانزيم في صورة غير نشطة تسمى تربيسنوجين والذي يتحول إلى الصورة النشطة تربسين في الأمعاء بواسطة انزيم يسمى الانتيروكينيز يفرز من غدد الأمعاء ، هذا بالإضافة إلى أن التربسين النشط يقوم

بتنشيط التربسينوجين وهذا يعرف باسم التنشيط الذاتي ، و انزيم التربسين يكمل هضم البروتينات الذى بدأ فى المعدة بواسطة انزيم البيرسين.

انزيم الكيموتروبسين

هذا الانزيم يفرز ايضا فى صورة غير نشطة ويسمى كيموتروسبينوجين و الذى يتتحول الى الصورة النشطة بواسطة انزيم التربسين ، وهذا الانزيم يساعد فى هضم البروتينات (يكمل عمل كلا من البيرسين و التربسين).

انزيم الكربوكسى ببتيديز

يساعد هذا الانزيم فى هضم البروتينات بتكسير الروابط الببتيدية الطرفية القريبة من مجموعة الكربوكسيل وذلك فى أى سلسلة ببتيدية فى جزئ البروتين .

انزيم الأميليز البنكرياسي

يكمل هذا الإنزيم هضم النشا الذى بدأ فى الفم عن طريق الأميليزاللعابى .

إنزيم الليبيز البنكرياسي

يقوم هذا الإنزيم بهضم المادة الدهنية إلى أحماض دهنية وجليسيرول وذلك بعد تحويلها إلى مستحلب بواسطة الصفراة التى تأتى من الكبد أو الحوصلة المرارية .

إنزيم الكوليسترون إستر هيدروليز

يفرز هذا الإنزيم في صورة نشطة ويعمل على تحويل مركبات إسترات الكوليسترون إلى كوليسترون وأحماض دهنية وهذا الإنزيم يؤثر أيضاً في روابط الإستر لمركبات ثلاثي الجلسريدات وينتج عن ذلك الأحماض الدهنية والجلسيرون.

إنزيم الفسفوليبيز

يفرز هذا الإنزيم في صورة غير نشطة ويقوم إنزيم التربسين على تنشيطه حيث يؤثر الإنزيم النشط في تحويل الفسفوليبيديات إلى الليسولسيثين وأحماض دهنية

العصارة الصفراوية

يقوم الكبد بتصنيع وإفراز العصارة الصفراوية والتي تعرف باسم الصفراء والتي تحتزن في الحويصلة المرارية والكبد يعتبر أكبر غدة قنوية في الجسم ويوجد تحت الحاجب الحاجز مباشرة . وت تكون المادة العضوية في الصفراء من حوالي 50% أحماض و 2% أصابع مثل البيليريبين و 40% كوليسترون و 40% فوسفوليبيديات هذا بالإضافة إلى احتواء الصفراء على الماء والإلكترونات . ويعمل الكبد على ربط

أحماض الصراء بالحامض الأميني الجليسين أو التورين
لتكون أملاح الصراء .

- يساعد افراز الصراء على امتصاص الدهون
و الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون
- يمنع حوادث عملية التخمر البكتيري في
الامعاء
- افراز الصراء يعمل على تنبيه الحركة
الدودية في القناة الهضمية
- تخرج كمية معينة من أملاح البيكربونات مع
افراز الصراء فترفع من درجة الاس
الهيدروجيني لها.

العصارة المغوية

تفرز غدة الأمعاء الدقيقة عصارة مغوية تحتوى على مادة
البيكربونات والتى تساعده فى معادلة حموضة المعدة بالإضافة
لوجود إنزيمات هاضمة وهى جزء من أغشية الخملات للأمعاء
الدقيقة ومن هذه الإنزيمات :

إنزيم الأنتيروكاينيز .. الذى يساعد فى تحويل الترسبينوجين غير النشط إلى إنزيم الترسبين النشط .
مجموعة من الإنزيمات التى تساعد فى هضم البروتينات منها :

إنزيم الأمينوببتيديز .. والذى يعمل على تكسير الرابطة الببتيدية الطرفية والقريبة من مجموعة الأمين NH_2 - وذلك فى سلسلة قصيرة من الببتيدات .

إنزيم ثنائى الببتيديز والذى يعمل على تكسير الرابطة الببتيدية التى تربط بين اثنين من الأحماض الأمينية فى مركب ثنائى الببتيد .

إنزيمات هضم ثانيات التسکر المعروفة باسم السكريديز الثنائية والتى تعمل على تكسير ثانيات التكسير إلى أحadiات التكسير مثل :

إنزيم السكريوزوالذى يحول السكروز إلى جلوكوز وفراكتوز .

إنزيم اللاكتيز والذى يحول اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز .

إنزيم المالتيز والذى يحول المالتوز إلى جلوكوز .

إنزيم التريهالايز والذى يحول التريهالوز إلى جلوكوز .

ملحوظة : السكر الثنائى التريهالوز هو سكر ناتج من ارتباط جزيئين من الجلوكوز بين ذرتى الكربون رقم (1) فى كل جزئ ومن أهم مصادر الخميرة والفطريات.

انزيم الليبيز المعاوى : و هذا يعمل على تحلل الدهون الى أحماض دهنية و جلسرين ، و عمله يمثل المرحلة النهاية فى هضم الدهون.

الامتصاص

تمتص معظم نواتج الهضم فى الأمعاء الدقيقة حيث توجد الخمالات والتى تزيد من مساحة السطح فى منطقة الأمعاء حيث تنتقل المواد الغذائية بعد هضمها من تجويف الأمعاء إلى الدورة الدموية :

امتصاص المواد الكربوهيدراتية

تمتص المواد الكربوهيدراتية فى الصورة البسيطة المعروفة باسم احاديات السكر (جلوكوز ، فراكتوز ، جالاكتوز) حيث يتمتص كل من الجلوكوز والجالاكتوز بالنقل النشط الثانوى ، ولذا فالصوديوم يمر من تجويف الأمعاء إلى خلايا الأمعاء عن طريق النقل

المشترك وينتقل الجالاكتوز بواسطته بينما ينتقل الفراكتوز بطريقة مخالفة حيث يصل إلى الخلايا الطلائية في منطقة الأمعاء بواسطة الانتشار الميسر .

امتصاص البروتينات

ان عملية امتصاص البروتينات تكون في صورة أحماض أمينية وأيضاً في صورة ثنائية وثلاثي البتيدات فالأحماض الأمينية تنتقل من تجويف الأمعاء إلى الخلايا الطلائية بواسطة النقل النشط الثانوي، بينما ثنائية وثلاثي البتيدات فتنتقل أولاً إلى الخلايا الطلائية المبطنة للأمعاء بنفس الطريقة ولكن متى أن وصلت إلى خلايا الأمعاء فإنه يتم هضمها إلى أحماض أمينية عن طريق إنزيمات البتيديزات الموجودة في سيتوبلازم خلايا الأمعاء .

امتصاص الليبيادات

تمتص نواتج هضم الليبيادات بواسطة الانتشار البسيط من خلال أغشية الخلايا الطلائية للأمعاء . وفي داخل هذه الخلايا يعاد اتحاد الكوليستيرول بالأحماض الدهنية لتكوين إستر الكوليستيرول ، وأحاديات الجلسريدات ترتبط مع الأحماض الدهنية لتكوين ثلاثي

الجلسيدات وكذلك يرتبط الليسولسيثين بالأحماض الدهنية لتكوين الفوسفوليبيدات هذه المركبات تتحدد مع الليبوبروتين لتكوين جزيئات الكيلوميكرون والتي بدورها تمر من خلايا الأمعاء إلى الأوعية الليمفية ثم تصل إلى الدم عن طريق القناة الليمفية الصدرية.

امتصاص الفيتامينات

كما ذكرنا سابقاً عند دراسة الفيتامينات أن بعضها يذوب في الدهون وهي فيتامين أ ، د ، ه ، ك ، والبعض الآخر يذوب في الماء وهي فيتامينات المجموعة ب وفيتامين ج وهذه تمتص في الماء بسرعة ما عدا فيتامين ب 12 ، فمع أنه يذوب في الماء إلا أن وزنة الجزيئي كبير جدًا، لذا يحتاج امتصاصه لوجود العامل الداخلي والذي يفرز من الخلايا الجدارية في المعدة حيث يتحدد كل من العامل الداخلي وفيتامين ب 12 ليكونا مركباً قابلاً للامتصاص في خلايا الأمعاء الدقيقة ، ثم يتحرر الفيتامين مرة أخرى داخل الخلايا وينقل إلى الدم . أما الفيتامينات التي تذوب في الدهون فإن امتصاصها يتم بسهولة من خلال أغشية خلايا

الأمعاء ولكن يقل هذا الامتصاص إذا كان هناك خلل في امتصاص الدهون أو نقص في إفراز عصارة الصفراء ، ولهذا قد يؤدي انسداد القناة المرارية (قناة الصفراء) إلى ظهور أعراض نقص هذه المجموعة من الفيتامينات .

امتصاص الماء والمعادن

إن معظم امتصاص الماء يتم في الأمعاء الدقيقة إلا أنه يمكن امتصاص حزء صغير من الماء في المعدة ، وأيضاً فإن الخلايا الطلائية للقولون لها القدرة على امتصاص الماء . ويفترض أن حركة الماء تتم من تجويف القناة الهضمية إلى الخلايا وذلك لكي لا يكون هناك فرق في الضغط الأسموزي فعند امتصاص الأمعاء للمواد الذائبة الناتجة من عمليات الهضم ينشأ فرق في الضغط الأسموزي ، وهذا يؤدي إلى انتقال الماء إلى داخل خلايا الأمعاء . أما المعادن فإنها تمتلك إما بالانتشار البسيط أو الانتشار الميسر أي تتم الحركة مع فرق التركيز ، هذا بالإضافة إلى أن النقل النشط يلعب دوراً هاماً في امتصاص معظم المعادن في منطقة الأمعاء . وهناك حالات خاصة لامتصاص بعض المعادن مثل امتصاص الكالسيوم الذي يعتمد على وجود

فيتامين (د) حيث إنه من المعروف أن امتصاص الكالسيوم يقل كثيراً في غياب هذا الفيتامين .

الأيض (التمثيل الغذائي)

بعد إتمام عمليات الهضم والامتصاص وإنتقال نواتج الهضم إلى الدم تبدأ الاستفادة من هذه المواد داخل خلايا الجسم وهذا هو المقصود بعمليات الأيض . فالمواد التي تصل إلى خلايا الجسم قد تخزن لحين الحاجة إليها أو يستفاد بها في تكوين بروتوبلازم جديد أي لتكوين خلايا وأنسجة جديدة ، وذلك أثناء عمليات النمو أو لتعويض الأنسجة التي تبلى ، وهذا جزء من عمليات الأيض يسمى عمليات البناء وقد تستفيد الخلايا من نواتج الهضم للحصول على الطاقة أي يتم أكسدة هذه المواد لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لكل الأنشطة والعمليات الفسيولوجية وهذا ما يعرف باسم عمليات الهدم ، ومن هنا يمكن تعريف الأيض بأنه جميع العمليات الكيميائية التي تحدث أو تتم داخل خلايا الجسم .

أولاً: أيض المواد الكربوهيدراتية

بعد هضم النشا وغيرها من المواد الكربوهيدراتية المعقدة تنتج أحadiات التسکر مثل الجلوكوز والفراكتوز والجالاكتوز والتى يتم امتصاصها فى الأمعاء الدقيقة حيث تصل إلى خلايا الكبد عن طريق الوريد الكبدي البابي ومنه إلى الدورة الدموية العامة . ومن الثابت أنه لا يمكن امتصاص أى جزيئات من عديدات أو ثنائيات التسکر قبل هضمها إلى أحadiات التسکر . ومن هنا فإن أحadiات التسکر تمر في العديد من العمليات التي يمكن تلخيصها كما يلى :

يكون جزء منها سكر الدم حيث إن مستوى السكر في الدم يتراوح بين 80-180 مجم في كل 100 سم³ من الدم . فمن المعروف أنه بعد تناول وجبة غذائية غنية بالمواد الكربوهيدراتية يرتفع سكر الدم ليقترب من الحد الأقصى . وفي الأحوال العادمة لا يزيد عن هذا الحد (180 مجم) ثم يبدأ مستوى السكر في الدم عن الحد الأدنى إن ذلك يؤدي إلى اضطراب وظائف أعضاء الجسم المختلفة وخاصة الجهاز العصبي مما يسبب الإغماء وفقدان الوعي ، ويشعر الشخص بالإجهاد .

ويساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم عدة هرمونات ، كما أن كمية السكر في الدم تنظم إفراز هذه الهرمونات .

يتحول جزء منها في الكبد وفي العضلات إلى ما يسمى النشا الحيواني أو الجليكوجين والذي يخزن بدوره في الكبد والعضلات .

يتحول جزء من أحadiat التسكر أيضاً إلى دهون تخزن في أماكن تخزين الدهن في الجسم .

يتآكسد جزء منها لانطلاق الطاقة اللازمة لقيام خلايا الجسم بجميع الأنشطة الحيوية .

ثانياً : أيض الدهون

بعد أن تصل الدهون إلى القناة الليمفية الصدرية في صورة كيلوميكرونات والتي تصب محتواها في الجهاز الوريدي للدم عندئذ تصل إلى القلب ومنه إلى الشريان الأورطي الذي يتولى توصيل الكيلوميكرونات إلى خلايا الجسم وخاصة خلايا الكبد وألياف عضلة القلب وخلايا النسيج الدهني ، وهناك يتم تكسيرها إلى الجلسریدرات الثلاثية والكوليستيرول والليبيادات

المفسفة والبروتين . وتصل معظم هذه المركبات إلى الدم حيث ترتبط الجزيئات الدهنية بالبروتينات لتكوين ما يسمى بالبروتينات الليبية ، وهى أصغر حجماً من الكيلوميكرونات . ويمكن تخزين الجلسریدات الثلاثية أو تكسيرها لتكوين الأحماض الدهنية والجلسيروл . والأحماض الدهنية المضافة إلى الدم والتى تصل إلى الخلايا بعضها يكون مشبعاً والبعض الآخر غير مشبع ، وكلاهما يستفاد به لتكوين المركبات الليبية المختلفة (مثل الجلسریدات الثلاثية والليبيادات المفسفة والكوليستيرول) ، أو تتأكسد لانطلاق الطاقة . علماً بأن الأحماض الدهنية غير المشبعة يمكن أكستها بطريقة أخرى وسرعة وينتج عن ذلك مركبات تسمى هيدروبوروكسيدات وهذه المركبات مواد سامة وقد يتم تحويلها إلى أحماض دهنية مشعبة حيث يضاف الهيدروجين إلى الروابط المزدوجة فى الحامض الدهنى غير المشبع ، ولذا يتحول إلى حامض دهنى مشبع .

ثالثاً : أيض البروتينات

كما أشرنا سابقاً فإن نواتج هضم البروتين تمتص أساساً على شكل أحماض أمينية ولو أن بعض البيتيدات (ثنائى وثلاثى البتيدات) يمكن أن تمتص بنسبة صغيرة فى الأمعاء . وبعد انتقال الأحماض الأمينية إلى الدم ينقلها بدوره إلى خلايا الجسم للاستفادة منها فى العديد من العمليات الآتية :

جزء من الأحماض الأمينية يصل إلى الخلايا يستخدم فى تصنيع بروتينات الأنسجة وأيضاً بروتينات البلازم .
جزء آخر يدخل فى تكوين مركبات غير البروتينية .
جزء يستفيد به فى تصنيع مكونات أخرى فى الجسم مثل الكرياتين .

بعض من الأحماض الأمينية يمكن أن تتحول إلى أحماض أمينية أخرى { وهذا يتم لتكوين الأحماض الأمينية التى يمكن تصنيعها داخل خلايا الجسم والتى يطلق عليها أحماض أمينية غير ضرورية .
يتحوال جزء من الأحماض الأمينية إلى كربوهيدرات أو دهون أو قد يختزن داخل الخلايا .

الجزء الباقي من الأحماض الأمينية سوف يتم أكسدته للحصول على طاقة حيث تبدأ هذه العملية بنزع مجموعة الأمين من الحامض الأميني ، ويتم ذلك على مرحلتين في المرحلة الأولى يتم نزع ذرتين من الهيدروجين لتكوين حامض يسمى الحامض الإيميني وفي المرحلة الثانية يضاف جزئ من الماء إلى الحامض الإيميني فيكون حامض عضوي لا يحتوى على نيتروجين وأمونيا .

وظائف الكبد :

يؤدي الكبد العديد من الوظائف الهامة جداً للجسم ، ومن أهم هذه الوظائف :

- تصنيع وإفراز العصارة الصفراوية والتي تساعده على تحويل الدهن إلى مستحلب وهذا يساعد على هضم المواد الدهنية .
- يعتبر الكبد مخزناً للدم حيث تخترقه شبكة كبيرة من الأوعية الدموية ، لذا يلاحظ تضخم الكبد في حالات هبوط القلب .

- يُعمل الكبد على تخلص الجسم من كريات الدم الحمراء الهرمة ، لذا فخلايا الكبد تستخلاص الحديد الموجود في هيموجلوبين الدم لهذه الكريات لاحتزاره مع استخدام باقى جزئي الهيم في تصنيع الصفراء .
- يؤدى الكبد أيضًا دوراً في تصنيع كريات الدم الحمراء في بعض الحالات مثل تكوين كريات الدم الحمراء في الجنين بعد الشهر السادس من الحمل إلى ما قبل الولادة ، وأيضاً في الحالات المرضية التي يتوقف فيها تصنيع الكريات في نخاع العظم .
- يقوم الكبد بدور وقائي وذلك بمعادلة التأثير السام لبعض السموم ، والتي تصل إليه من القناة الهضمية عن طريق الدورة البابية .
- يعتبر الكبد عضو تخزين للعديد من المواد مثل الجليكوجين والدهن وبعض الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب 12 .

- يقوم الكبد بتصنيع العديد من بروتينات البلازما وأيضاً الهيبارين كما يقوم بتكوين مادة الفيبرينوجين التي تلعب دوراً رئيسياً في تجلط الدم عند حدوث نزيف .
- يلعب الكبد دوراً رئيسياً في عمليات الأيض .

الجهاز الدورى

الجهاز الدورى هو أحد أجهزة الاتزان الداخلى فى الجسم . والجهاز الدورى فى الفقاريات يعرف بأنه جهاز مغلق حيث يكون الدم داخل أو عية مغلقة (أي توجد شعيرات دموية بين الشرايين والأوردة) ، ولكن فى كثير من اللافقاريات تعرف الدورة الدموية بأنها مفتوحة حيث يضخ الدم من القلب إلى الشرايين التى تفتح فى فجوات الأنسجة وعندئذ يكون الدم على اتصال مباشر مع خلايا الجسم ثم يدخل الأوردة المفتوحة لكي يندفع إلى الأمام فى اتجاه القلب مرة أخرى .

ويترکب الجهاز الدورى فى الفقاريات من الجهاز الوعائى القلبي وهو عبارة عن القلب والأوعية الدموية

بالإضافة إلى الدم الذي يوجد داخل الأوعية خلال دورانه من القلب إلى أنسجة الجسم وعودته في الاتجاه العكسي . ويقوم الجهاز الدورى بوظائف عديدة منها عملية تبادل الغازات مع أنسجة الجسم ، ونقل عناصر الغذاء الممتصة من القناة الهضمية وأيضاً الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء إلى خلايا الجسم ، كما يقوم بنقل الفضلات الناتجة من عمليات الأيض إلى الأعضاء المختصة بالإخراج ، هذا بالإضافة إلى تنظيم حرارة الجسم وثبات الرقم الهيدروجيني لسوائل الجسم ، كما تعمل كريات الدم البيضاء على حماية الجسم من البكتيريا والفيروسات ، وتلعب الصفائح الدموية دوراً هاماً في عملية تجلط الدم عند حدوث نزف .

أولاً: الدم

يحتوى الدم في الثدييات على البلازمما وهي تمثل 55% من حجم الدم وخلايا الدم وهي تمثل 45% :

البلازمما

البلازمما عبارة عن سائل يحتوى على 90% ماء مذاب فيه بروتينات البلازمما (الألبومين ، الجلوبولينات ،

والفيبرينوجين) وجلوكوز وأحماض أمينية وإلكتروليتات والعديد من الإنزيمات وكذلك الأجسام المضادة والهرمونات وأيضاً الفضلاب الناتجة من عمليات الأيض هذا بالإضافة إلى كميات ضئيلة من مواد أخرى عضوية وغير عضوية .

خلايا الدم

تسمى خلايا الدم أيضاً العناصر المكونة وكما أشرنا في الفصل الرابع الخاص بدراسة الأنسجة الضامة فإن خلايا الدم تتكون من :

كريات الدم الحمراء

وهي تحتوى على هيموجلوبين الدم الذى يعمل فى نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

كريات الدم البيضاء

وتؤدى دوراً هاماً فى التهام الميكروبات مع كونها عوامل مناعية

الصفائح الدموية

وترتبط وظائفها بعملية تجلط الدم عند حدوث نزف .

ت- منع فقدان الدم

عند حدوث جرح أو تمزق لوعاء دموي فإن ذلك يؤدى إلى اندفاع الدم وهو ما يسمى نزف الدم ، ومن هنا تحدث ثلاثة عمليات تؤدى جماعها إلى تقليل أو منع فقدان الجسم للدم وهذا ما يسمى بالهيموستاتس أى منع فقدان الدم أو إيقاف النزف وهذه العمليات الثلاث هى :

انقباض العضلات اللائرادية فى الأوعية الدموية فى مكان الجرح ويؤدى هذا إلى تقليل سريان الدم فى الأوعية الممزقة (المجرورة) .

تجمع الصفائح الدموية فى موقع الجرح وهذا يؤدى أيضاً إلى تقليل حجم الدم المفقود .
تكوين جلطة فى مكان الجرح .

عملية تكوين الجلطة

يحتوى الدم على كل العوامل التى تساعد على تكوين الجلطة عند حدوث جرح وتبدأ خطوات تكوين الجلطة بانطلاق مادة تسمى الثروموبلاستين من الصفائح الدموية

فى مكان الجرح وأيضاً من الأنسجة المجرورة ، ومع وجود أيونات الكالسيوم فى البلازما فإن كل من الثرومبوبلاستين وأيونات الكالسيوم يعملان على تحويل مادة بروتئينية موجودة فى البلازما وهى البروثرومبين (يتم تصنيعها فى الكبد فى وجود فيتامين ك) على إنزيم يسمى ثرومبين الذى يؤدى بدورة إلى تحويل بروتين الفيبرينوجين الموجود فى البلازما فى صورة سائلة وذائبة إلى مادة غير ذائبة وهى الفيبرين ، والذى يتكون على شكل ألياف دقيقة تتشابك مع بعضها لتكوين شبكة تلتصق بها الصفائح الدموية وتتحصر بداخلها كريات الدم الحمراء والبيضاء .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدم يحتوى على مواد مانعة للتجلط تسمى مضادات التجلط ، ومن أهم هذه المواد الهيبارين والذى يمنع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية وي تكون الهيبارين أساساً فى خلايا الكبد ، هذا بالإضافة إلى أن أحد أنواع كريات الدم البيضاء والمسمى الخلايا القاعدية يوجد بداخلها الهيبارين الذى ينطلق منها إلى بلازما الدم . والهيبارين يعمل على عدم تكوين مادة الثرومبين من البروثرومبين ، وذلك عن طريق إعاقة عمل

الثرومبو بلاستين ومن هنا يمنع تكوين الفيبرين من الفيبرينوجين .

الظواهر غير الطبيعية لتجلط الدم

من أهم الظواهر غير الطبيعية لعملية تجلط الدم في الإنسان والتي تؤدي إلى ظهور حالات مرضية هي تكوين جلطة دموية داخل الأوعية الدموية مما يسبب انسداد هذه الأوعية . وتكون هذه الظاهرة خطيرة في حالة انسداد أوعية المخ أو القلب أو الرئتين . وهناك ظاهرة أخرى وهي مرض وراثي معروف باسم مرض نزف الدم أو الهيموفيليا . وينتتج عن هذا المرض تأخر تكوين الجلطة عند حدوث أي جرح وذلك لعدم حدوث عملية التجلط بصورة طبيعية . والسبب في ذلك هو وجود خلل جيني على الكروموسوم الحامل لصفة الجنس والمعروف باسم اكس كروموسوم وعادة تورث هذه الصفة من الأم عندما تكون حاملة لهذا المرض على أحد كروموسومات الجنس الخاصة بها وعندما تنتقل هذه الصفة إلى الابن فإنه يولد مصاباً بهذا المرض . ولو حدث أن كلاً من الأم والأب يحملان الجين

المسبب للمرض فمن المحتمل أن تصاب الابنة بهذا المرض .

د. فصائل الدم

عند نقل دم شخص ما إلى دم شخص آخر فإن كريات الدم الحمراء قد لا تتأثر أو قد تلتتصق مع بعضها وهذه الظاهرة تعرف باسم التصاق الكريات، والسبب في ذلك وجود عامل على غشاء كريات الدم الحمراء يسمى مولد الإلصاق ، وأيضاً يوجد عامل في البلازما عبارة عن جسم مضاد يسمى اجلوتينين .
وهنالك نوعان من مولدات الإلصاق يرمز لهما بالحروف A,B
وأيضاً نوعان من الأجسام المضادة يرمز لهما بالحروف a,b .

وقد عرف أن الجسم المضاد a لو وجد مع مولد الإلصاق A يحدث التصاق لكريات الدم لذا يعرف باسم مضاد anti A A ، وأيضاً الجسم المضاد b يسبب التصاق الكريات الموجود بها مولد الإلتصاق B لذا يعرف باسم مضاد anti B B ، ومن هنا فلا يوجد في دم الإنسان مولد الإلتصاق A مع الجسم المضاد a وأيضاً لا يوجد مولد الإلصاق B مع الجسم المضاد b . وطبقاً

لوجود هذه العوامل فقد تم تقسيم فصائل الدم فى الإنسان إلى أربع فصائل هى :

فصيلة A : حيث يوجد على كريات الدم الحمراء مولد الإلصاق A وفى البلازما الجسم المضاد b .

فصيلة B : وهذا يوجد على كريات الدم الحمراء مولد الإلصاق B وفى البلازما الجسم المضاد a .

فصيلة AB : حيث تتميز كريات الدم الحمراء بوجود مولدى الإلصاق A,B ولا يوجد فى البلازما أى أجسام مضادة .

فصيلة O : وهذا لا يوجد على كريات الدم الحمراء أى مولدات إلصاق ويوجد فى البلازما كل من الجسم المضاد a,b .

ولذا فعند نقل الدم من شخص إلى آخر لابد أن يؤخذ فى الاعتبار نوع فصيلة دم الشخص الذى سيؤخذ منه الدم والذى يسمى المعطى وأيضاً نوع فصيلة دم الشخص الذى سينقل إليه الدم والذى يسمى المستقبل . فلو لم يكن دم كل منها مناسباً للأخر فإن كريات الدم الحمراء المنقولة من المعطى سوف يحدث لها التصاق فى دم

المستقبل ومن هنا يحدث انسداد في الأوعية الدموية الصغيرة يعقبها تكسير كريات الدم الحمراء وخروج الهيموجلوبين إلى ، وهذا يعرف بتحلل الدم .

ولقد أطلق على فصائل الدم A,B,AB,O فصائل الدم الرئيسية بعد اكتشاف مولدات إلصاق أخرى وأعطيت رمزى M,N ولا توجد أجسام مضادة لها في البلازما ولذلك لا تؤخذ في الاعتبار عند نقل الدم ولكن يستفاد بها في إثبات الأبوة للأطفال المتنازع عليهم .

عامل ريزس

اكتشف في عام 1940 معامل إلصاق على كريات الدم الحمراء في نوع من القردة ، ثم ثبت وجوده على كريات الدم الحمراء لحوالي 85% من المنتجين للجنس البشري الأبيض حيث يوجد مولد إلصاق على كريات الدم الحمراء ويسمى مولد إلصاق د ويعرف أيضاً بعامل ريزس ولا يوجد هذا العامل في حوالي 15% من الجنس الأبيض ، ولذا يسمى الأشخاص الموجود لديهم عامل ريزس موجب ريزس Rh+ والآخرون يطلق عليهم سالب ريزس Rh- . وفي كل الحال لا يوجد في بلازما الدم

جسم مضاد لعامل رايزس . ولكن عند نقل دم لأول مرة من إنسان يحوى عامل رايزس إلى شخص دمه سالب رايزس يتكون عندئذ في دم الشخص السالب أجسام مضادة لهذا العامل تعرف باسم الجسم المضاد لعامل رايزس .


ولو تم نقل الدم الموجب للمرة الثانية إلى الشخص السالب فسوف يحدث التصاق بكريات الدم الحمراء المنقوله ، ومن هنا يحدث انسداد الأوعية الدموية الصغيرة ويعقبها تكسير كريات الدم الحمراء ، لذا يجب عند نقل الدم إلى شخص سالب رايزس أن يتم أخذ الدم من شخص سالب رايزس أيضاً .

ولعامل رايزس دور هام أثناء فترة الحمل حيث تحدث مشاكل عندما يكون دم الأم سالب رايزس ودم الجنين موجب رايزس ، فعندما يختلط دم الجنين بدم الأم عند الولادة تتكون في دم الأم الأجسام المضادة لعامل رايزس ، وإذا حملت الأم مرة أخرى بطفل موجب رايزس فإن الأجسام المضادة لدم الأم تخترق المشيمة وتعمل على التصادق وتكسير كريات الدم الحمراء بالجنين . ولعلاج مثل هذه الحالات ولمنع تكوين أجسام مضادة في دم الأم سالب رايزس والتى تكون حاملة لجنيين موجب يتم إعطائهما بعد الولادة مباشرة أجساماً مضادة لكريات الدم الحمراء

الموجبة لعامل رايزس هذه الأجسام المضادة تقوم بتدمير كريات الدم الحمراء الموجبة لعامل رايزس والتى وصلت إلى دم الأم من الجنين وذلك قبل تكوين الأجسام المضادة لعامل رايزس فى دم الأم .

ثانياً : الجهاز الوعائى القلبى

يشمل الجهاز الوعائى القلبى القلب والأوعية الدموية حيث يضخ القلب الدم إلى كل أجهزة الجسم عن طريق الشرايين التي تتفرع إلى شرايين صغيرة والتي تتفرع بدورها إلى الشعيرات الدموية ثم يترك الدم منطقة الشعيرات الدموية ويتوجه إلى الأوردة الصغيرة ثم إلى الأوردة الأكبر التي تعود بالدم إلى القلب مرة أخرى .



الاواعية الدموية:

الاواعية الدموية نوعان هما الشرايين والأوردة .

الشرايين:

وهي التي تحمل الدم من القلب الى الأنسجة وتنتمي بسمك الطبقة العضلية في جدرها مقارنة بالأوردة . ويندفع الدم في الشرايين نتيجة انقباض عضلات البطين الأيسر؛ ولذا فضغط الدم داخل الشرايين متعدد بين ارتفاع يليه انخفاض؛ وذلك تبعاً لانقباض وارتفاع عضلات القلب وهذا يعرف باسم النبض ؛ولذا فضغط الدم المرتفع يسمى بالضغط الانقباضي ، وهو في الإنسان العادي حوالي 120م زئبق ، أما الضغط المنخفض

فيسمى بالضغط الارتخائى وهو فى الإنسان السليم حوالي 80 مم زئبق ويعبّر عن الضغط برقمين يوضعان فى صورة الكسر، بسطة الضغط الانقباضى ومقامه الضغط الارتخائى . 80 / 120

الأوردة:


الأوردة هى الأوعية الدموية التى تحمل الدم من أنسجة الجسم المختلفة إلى القلب وجدارها العضلى أقل سماكاً من الشرايين . وتبدأ الأوردة كشعيرات دموية فى الأنسجة والتى تجتمع فى اوردة أكبر لكي تنقل الدم مباشرة إلى القلب . وهناك نوع من الأوردة ينقل الدم إلى عضو آخر غير القلب ويسمى فى هذه الحالة وريد بابى' مثل ذلك الوريد الكبدي البابى والذى يقوم بنقل الدم من المعدة والأمعاء إلى الكبد.

ويمكن تلخيص الدورة الدموية فى الفقاريات ومنها الإنسان كما يلى:

يصل الدم المؤكسج من الرئتين عن طريق الأوردة الرئوية إلى الأذين اليسرى كما يعود الدم غير المؤكسج في الأوردة الجوفاء إلى الأذين اليمين وبانقباض الأذينين ينتقل الدم المؤكسج من الأذين اليسرى إلى البطين اليسرى والدم غير المؤكسج من الأذين اليمين إلى البطين اليمين . وعند انقباض البطينين يندفع الدم المؤكسج إلى الشريان الورطي الذي يحمله عن طريق أفرعه العديدة إلى كل أعضاء الجسم . كما يندفع الدم غير المؤكسج من البطين اليمين إلى الشريان الرئوي الذي يحمل الدم إلى الرئتين حيث تتم الأكسجة . وكما أشرنا سابقاً فإن هناك دورة دموية فرعية تمر عبر الكبد تعرف بالدورة الكبدية البابية .

القلب:

القلب في الفقاريات عبارة عن عضو عضلي يوجد في التجويف الصدر ويكون مغطى بغلاف ليفي متصل يسمى غشاء التامور



والقلب في الأسماك يحتوى على حجرتين هما أذين وبطين. ومع وجود حجرتين ثانويتين هما الجيب الوريدى والمخروط الشريانى إلا أنه يطلق على القلب في الأسماك القلب ذو الحجرتين أما في البرمائيات فيتكون القلب من أذينين وبطين واحد، أي يتكون من ثلاثة حجرات و في بعض الزواحف ينقسم البطين إلى حجرتين وبالتالي نجد أن القلب ذا الأربع حجرات يظهر في قلة من الزواحف وأيضا في كل من الطيور والثدييات ؛ ولذا فالقلب في الفقاريات المتقدمة يتكون من نصفين كل نصف يشتمل على أذين وبطين . فالنصف اليمين يشمل الأذين اليمين والبطين اليمين والنصف الأيسر يشمل الأذين

الايسر والبطين الأيسر . وتوجد فى القلب الصمامات الأذين بطينية والتى توصل ما بين الأذين والبطين فى كل نصف من نصفى القلب . وهذه الصمامات تسمح للدم بالمرور من الأذين الى البطين ولا تسمح بارتداد الدم فى الاتجاه العكسي هذا بالإضافة لوجود صمامات عند اتصال الشرايين الكبيرة بالقلب مثل الشريان الرئوى والشريان الأورطي ويطلق عليها الصمامات النصف دائيرية والتى تمنع ارتداد الدم الى القلب .

نشأة وانتقال نبض القلب:

ينشاً نبض القلب فى أنسجة خاصة عبارة عن ألياف عضلية متحورة موجودة فى القلب وهى التى تعمل على تنظيم واستمرارية انقباض عضلة القلب؛ ولذا فإن هذه الأنسجة من العقدة الجيب أذينية والتى توجد فى جدار الأذين اليمين بالقرب من مدخل الوريد الأعوف العلوى . وهذه العقدة تعمل كمنظم لنبضات القلب ؛ ولذا يطلق عليها صانع أو بادئ الخطى حيث ينتشر منها فى مسارات محددة جهد الفعل الى العقدة الأذين بطينية و منها تنتقل الإشارة الى الحزمة الأذين بطينية والتى

تعرف أيضا باسم حزمة هس وتنقسم هذه الحزمة الى فرعين احدهما يتجه الى جدار البطين الأيسر والآخر يتجه الجدار البطين الأيمن . حيث تنتهي في الألياف العضلية للبطينين بفروع صغيرة تسمى ألياف بيركنجي ؛ ولذا يطلق أحيانا على هذه الأنسجة الجهاز المسؤول عن التوصيل في القلب. وعلى ذلك ومن خلال انتشار فعل الجهد في هذه الأنسجة نجد أن القلب ينقبض بطريقة ما بحيث ينقبض الأذينين أولا ثم يعقب ذلك انقباض البطينين وبعد فترة استرخاء لعضلة القلب تبدأ نبضة جديدة بنفس الإيقاع.

وقد يحدث أحياناً تلف لبعض أنسجة هذا الجهاز مما يسبب عدم انتظام نبض القلب ؛لذا يستخدم في هذه الحالة منظم صناعي وضع داخل جسم المريض لتنظيم ضربات القلب.

معدل نبضات القلب

يختلف معدل نبض القلب في الأنواع المختلفة من الحيوانات حيث يقل كلما زاد وزن الجسم فعلى سبيل المثال في الفيل نجد أن معدل النبض 25 نبضة في الدقيقة ، وفي الإنسان 70 نبضة ، وفي القطة 125 نبضة ، وفي فأر يصل إلى 400 نبضة .

وهناك العوامل عديدة تؤثر في معدل نبض القلب مثل السن والجنس والحالة النفسية كما في حالات الخوف والغضب ، هذا بالإضافة إلى المجهود العضلي ، فالتمرينات الرياضية تزيد من معدل نبض من القلب وبالتالي يزيد الدفع القلبي (وهو حجم الدم الذي يندفع من القلب في الدقيقة) . وهذه إحدى الفوائد الهامة لممارسة التمرينات الرياضية . ويتأثر نبض القلب أيضاً ببعض الهرمونات مثل هرمون الأدريناлиين والذي يفرز من نخاع غدة الكظر حيث يؤثر هذا الهرمون على عضلة القلب ويسبب زيادة معدل وقوه نبض القلب ، كما أن معدل النبض يتأثر بمدى إثارة أحد فروع الجهاز العصبي اللاإرادى وهو المعروف باسم الجهاز العصبي السمباتواى حيث تؤدي زيادة نشاط هذا الجهاز إلى زيادة معدل نبض القلب .

أصوات القلب

هناك صوتان يمكن سماعهما في القلب الطبيعي عند وضع الأذن على صدر أي شخص والتي تكون أكثر وضوحاً باستخدام سماعة الطبيب ، فالصوت الأول يكون بسبب اهتزازات الصمامات الأذين بطينية عند غلقها من اندفاع الدم من الأذينين إلى البطينين . أما الصوت الثاني فيكون بسبب ضيق الصمامات

عند فتحات الشريان الكبير المتصلة بالقلب وخاصة الصمام الأورطي وذلك عقب غلق هذه الصمامات ، وأى تلف لصمامات القلب يؤدى إلى سماع أصوات غير طبيعية للقلب وتسمى هذه الحالة المرضية لغط القلب .

الجهاز الليمفي

تعمل الأجهزة الدورية المغلقة في الفقاريات بمساعدة جهاز مكمل لها يعرف بالجهاز الليمفي والذي يعتبر جهاز لجمع والتقط الشعيرات السائلة التي لا يدخل في الجهاز الوريدي . وينشأ الجهاز الليمفي من شبكة من الشعيرات موجودة في معظم أنحاء الجسم ، وتمتد هذه الشعيرات لتكون أوعية ليمفية أكبر فأكبر وتصب في النهاية في القناة الليمفية الصدرية والقناة الليمفية اليمنى والتي تصban في الجهاز الوريدي أسفل الرقبة .

ويعرف الجهاز الليمفي على أنه جهاز مساعد لجمع السائل المنتشر بين خلايا الجسم حيث إن ضغط الدم في الشريان الدقيق يعمل على ترشيح بلازما الدم من خلال جدر الشعيرات الدموية إلى الفجوات الموجودة بين الخلايا . والسائل الناتج من عملية الترشيح يطلق عليه اسم السائل البيني أو السائل النسيجي ، والذي يتوجه معظمها إلى الأوردة عن طريق الشعيرات الدموية

الوريدية ، أما السائل المتبقى والذى لم يتجه إلى الأوردة فيتجمع فى شعيرات ليمفية دقيقة والتى تكون أوعية ليمفية تعود بهذا السائل إلى الأوردة . ويطلق على هذا السائل بمجرد دخول الأوعية الليمفية سائل الليمف . ويلاحظ وجود عقد ليمفية وأنسجة ليمفية على مسافات بطول الأوعية الليمفية . ومن أشهر الأعضاء الليمفية فى الجسم الطحال .

والعقد والأنسجة الليمفية لها عدة وظائف دفاعية فى الجسم وهي :

تؤدى دور المرشحات التى تساعد فى تخلص الجسم من المواد الغريبة وأيضاً من البكتيريا الضارة التى قد توجد فى الدورة الدموية .

تقوم العقد والأنسجة الليمفية بتكوين الخلايا الليمفية . تقوم العقد الليمفية بتكوين الأجسام المضادة والتى تصل إلى الدورة الدموية وتساعد على القضاء على البكتيريا والسموم .

الجهاز التنفسى

التنفس هو عملية تبادل غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون بين الحيوان والبيئة المحيطة به حيث يستخدم الأكسجين في عمليات إطلاق الطاقة من المواد العضوية الموجودة داخل خلايا الجسم ، ومن هنا تقسم عمليات التنفس إلى ثلاثة مراحل :

تنفس خارجي : وهو عملية تبادل الغازات بين هواء الرئتين والدم .

تنفس داخلي : وهو عملية تبادل الغازات بين الدم وخلايا الجسم .

نفس خلوى : والمقصود به عمليات استخدام الأكسجين فى أكسدة المواد العضوية والتى ينتج عنها انطلاق الطاقة داخل الخلايا .

ومعظم الحيوانات تحتاج لوجود الأكسجين فى البيئة المحيطة بها ، ولكن هناك عدداً قليلاً جداً من الكائنات الحية يمكنها العيش فى غياب الأكسجين مثل الطفيليات التى تعيش فى الأمعاء وبعض الكائنات الدقيقة .

أعضاء التنفس

الرئتان

أعضاء التنفس فى الفقاريات العليا هى الرئتان والتى تكون غنية بالتجاويف الداخلية والأوعية الدموية حيث تتميز بمقدرتها الفائقة على تبادل الغازات مع الهواء المحيط بالحيوان .

الخياسيم

تعتبر الخياشيم وسيلة تنفسية مناسبة للحياة في الماء حيث تكون مزودة بأوعية دموية كثيرة تساعد في استخراج أكبر قدر من الأكسجين الذائب في الماء . الخياشيم غير مناسبة للحياة في الهواء لأنة عند خروج الحيوانات من الوسط المائي تلتصق الخياشيم مع بعضها وتعرض الحيوانات للاختناق .

التنفس الجلدي

تم عملية التنفس الجلدي في الحيوانات الأولية والإسفنجيات واللاسعات وأيضاً في كثير من الديدان عن طريق الانتشار المباشر للغازات من خلايا السطح الخارجي ، ومن هنا تحدث عملية تبادل الغازات بين الجسم والبيئة المحيطة بالحيوان وعادة ما تكون هذه الوسيلة مكملة لعملية التنفس بالخياشيم أو بالرئات في بعض الحيوانات الفقارية مثل الأسماك والبرمائيات .

القصيبات الهوائية

يوجد في الحشرات وفي بعض الأنواع الأخرى مفصليات القدم الأرضية جهاز تنفسى يتكون من أنابيب يطلق عليها قصيبات هوائية والتى تتفرع وتمتد إلى كل أجزاء الجسم حيث يدخل الهواء من خلال فتحات أو

ثغور تنفسية موجودة على جانبي الجسم وينتقل ثانى أكسيد الكربون إلى الخارج فى الاتجاه المضاد .


الجهاز التنفسى في الإنسان

يتكون الجهاز التنفسى في الثدييات بما فيها الإنسان ، من فتحى الأنف الخارجيتين والتي يمر منها الهواء إلى الغرفتين الأنفيتين والتي يبطن كلاً منها طبقة طلائية تقرز مخاطاً ، ثم يصل الهواء عن طريق فتحى الأنف الداخليتين إلى البلعوم والذى يعتبر ممراً مشتركاً للهواء في الجهاز التنفسى وأيضاً للغذاء في القناة الهضمية . وعندئذ يمر الهواء على الحنجرة من خلال فتحة المزمار والتي تكون مغطاه بلسان المزمار . ومن الحنجرة يندفع الهواء إلى القصبة الهوائية والتي تكون مدعاة بحلقات غضروفية لكي تظل مفتوحة دائمًا . والقصبة الهوائية مبطنة بغشاء مخاطي خلويات مزودة بأهداب ويحتوى على عدد مخاطية تقرز مخاطاً . وتمتد القصبة الهوائية إلى القفص الصدرى حيث تتفرع إلى شعبتين هوائيتين ، وكل شعبة هوائية تكون مبطنة أيضاً بغشاء مخاطي به أهداب كما أنها مدعاة بحلقات غضروفية . وداخل الرئتين تتفرع كل شعبة وتنقسم إلى شعيبات هوائية يوجد بجدرها ألياف عضلية ملساء (لا إرادية) ، ثم تنتهي

الشعيبات في الحويصلات الهوائية والتى يكون جدارها رقيقةً ورطبةً ليساعد على تبادل الغازات بين الهواء الموجود داخل هذه الحويصلات والشعيرات الدموية الملائقة . وعند وصول الهواء إلى الحويصلات الهوائية تحدث له عدة تغيرات :

يرشح ليصبح خاليًا من معظم الأتربة والمواد الغريبة العالقة الأخرى .

يتم تدفنته إلى درجة حرارة الجسم .
يكون مشبعاً بالرطوبة .



آلية التنفس

يشتمل التنفس على عمليتين هما : الشهيق والزفير فاثناء عملية الشهيق تتنقبض عضلات الضلوع وعطلة الحجاب الحاجز . وهذا يؤدى إلى ارتفاع الضلوع ويصبح الحجاب الحاجز مسطحاً وهنا يتسع حيز الصدر وتتمدد الرئتان ، وهذا يؤدى إلى انخفاض ضغط الهواء داخل الرئتين عن الضغط الجوى فيندفع الهواء من

الخارج ليملأ الرئتين . أما في عملية الزفير فتنبسط عضلات الصدر والحجاب الحاجز فيقل حجم الصدر والرئتين أو بمعنى آخر يعود حجم التجويف الصدرى والرئتين إلى الحجم الطبيعي ، ولذا يطرد الهواء إلى الخارج .

ولو توقفت عملية التنفس أى توقفت الحركات التنفسية كما يحدث في بعض الأحيان تحت تأثير مادة مخدرة مثلاً أو عند حدوث غرق في الماء فهنا لا بد من اللجوء إلى عمليات التنفس الصناعي في محاولة لإعادة الحركات التنفسية مرة أخرى .

وتستخدم بعض المصطلحات للتعبير عن حجم الهواء الذي يؤخذ في عملية الشهيق وحجم الهواء الذي يطرد في عملية الزفير وأيضاً بعض المصطلحات الأخرى المرتبطة بسعة الرئة في الظروف المختلفة للتنفس ، وفيما يلى تعريف لهذه المصطلحات :

حجم هواء التنفس العادي

يعبر هذا المصطلح عن كمية الهواء التي تدخل الرئتين في عملية الشهيق أثناء التنفس بطريقة هادئة ولذا تطرد نفس هذه الكمية في عملية الزفير وهي تساوى تقريرياً نصف لتر في الإنسان .

الحجم الاحتياطي للشهيق

عند أخذ شهيق عميق يمكن لإنسان أن يأخذ كمية من الهواء بالإضافة إلى حجم هواء التنفس العادي وقد يصل حجم الهواء الذي يدخل الرئتين في هذه الحالة إلى حوالي 2,3 لتر لذا يعرف بالحجم الاحتياطي للشهيق .

الحجم الاحتياطي للزفير

إذا أجريت عملية زفير قوية بعد إتمام عملية زفير عادية فإنه يطلق على حجم الهواء الذي يطرد من الرئتين بعد أعمق زفير الحجم الاحتياطي للزفير وهو حوالي 1,1 لتر .

الحجم المتبقى

يستخدم هذا المصطلح للدلالة على حجم الهواء المتبقى في الرئة بعد أعمق زفير ممكن حيث لا تزال توجد كمية من الهواء داخل الرئتين وهي تقدر بحوالي 1,2 لتر .

السعة الكلية للرئة

ويقصد بها السعة القصوى التي يمكن أن تصل إليها الرئة في الإنسان عند تمددها بعد أعمق شهيق ممكن

وهي تساوى مجموع الأحجام الأربعه التى سبق الإشارة إليها لذا فهى تساوى تقريرياً ستة لترات .

السعه العاديه

والمقصود بها حجم الهواء المتبقى فى الرئه بعد عملية زفير عاديه وهى تساوى حجم الهواء المتبقى + الحجم الاحتياطي للزفير أى حوالى 2,3 لتر .

السعه الشهيقيه

وهي تعنى كمية الهواء التي يأخذها الإنسان بعد أعمق شهيق ممكн وتساوى حجم هواء التنفس العادي + الحجم الاحتياطي للشهيق أى حوالى 3,7 لتر .

السعه الحيوية

المقصود بها حجم الهواء الذى يطرد بعد أخذ أعمق شهيق ممكن والسعه الحيوية تساوى السعة الكلية للرئه مطروحاً منها حجم الهواء المتبقى بعد أعمق زفير ممكн وتساوى تقريرياً 4,8 لترأ ، ولذا يمكن ان يعبر عنها بحاصل جمع حجم هواء التنفس العادي وحجم احتياطي الشهيق وحجم احتياطي الزفير .

التحكم فى عملية التنفس

تنظيم عملية التنفس يتم بطريقتين هما :

التنظيم العصبى

التنظيم الكيميائى

التنظيم العصبى للتنفس

التنظيم العصبى للتنفس يتم عن طريق مركز موجود فى جذع الدماغ ويسمى مركز تنظيم التنفس حيث ترسل خلايا عصبية معينة فى هذا المركز إشارات عصبية بانتظام تسبب انقباض عضلة الحجاب الحاجز وعضلات الصدر ، والتى تسبب عملية الشهيق . وعند امتلاء الرئتين بالهواء تتوقف هذه الإشارات العصبية لترتخى العضلات وتتم عملية الزفير ، هذا بالإضافة لوجود مناطق أخرى بجذع الدماغ تستقبل إشارات عصبية من مستقبلات كيميائية موجودة فى الدماغ وفي بعض الشرايين . وهذه المستقبلات تتأثر بضغط غاز ثانى أكسيد الكربون فى الدم ، ومن هنا تعمل على زيادة معدل التنفس عند زيادة ضغط غاز ثانى أكسيد الكربون .

التنظيم الكيميائى للتنفس

تتأثر عملية التنفس بالضغط الجزئي فى الدم لكل من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والأكسجين وذلك من خلال خلايا المراكز العصبية الخاصة بالتنفس التى تتأثر بأى تغيرات فى تركيز هذه الغازات ، ويعتبر ثانى أكسيد الكربون أنشط وأقوى منظم للتنفس . وتوجد فى جدار الشريان الأورطى والشريان السباتى مستقبلات كيميائية تتأثر بانخفاض ضغط الأكسجين أو زيادة ضغط ثانى أكسيد الكربون ، ومن هنا ترسل هذه المستقبلات إشارات عصبية إلى المراكز العصبية الخاصة بالتنفس والتى تعمل على تنبيها .

الأصابع التنفسية

الجزء الأكبر من الأكسجين ينقله الدم من الرئتين إلى خلايا الجسم يتم عنده طريق الارتباط بصبغ تنفسى حيث إن كمية الأكسجين المذابة فى بلازما الدم تكون قليلة جدًا ولا تفى باحتياجات خلايا الجسم . ويوجد نوعان من الأصابع التنفسية الأكثر انتشاراً في المملكة الحيوانية هما الهيموجلوبين والهيموسيانين والهيموجلوبين عبارة

عن بروتين يحتوى على الحديد ويوجد داخل كريات الدم الحمراء فى جميع الفقاريات والعديد من اللافقاريات . أما الهيموسيانين فهو عبارة عن بروتين يحتوى على النحاس ويوجد هذا الصبغ التنفسى فى القشريات وبعض الرخويات مثل الرأسقدميات .

انتقال الغازات في الدم

انتقال الأكسجين

يتكون جزء الهيموجلوبين من 5% هيم وهو الجزء المحتوى على 4 ذرات من الحديد والذى يسبب اللون الأحمر للدم و 95% جلوبين . وجزء الهيم له مقدرة فائقة على الارتباط بالأكسجين . وهذا الارتباط يتوقف على الضغط الجزئي للأكسجين في الوسط المحيط بكريات الدم الحمراء . وكل ذرة من الحديد ترتبط بجزئ من الأكسجين لذا فجزء الهيموجلوبين يمكن أن يرتبط بأربعة جزيئات من الأكسجين .

وتعتمد كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها الدم على كمية الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء ولكن مقدرة

الهيموجلوبين على الارتباط بالأكسجين وفك الارتباط بينهما فيعتمد على الضغط الجزئي للأكسجين . وهناك علاقة بين نسبة تشبث الهيموجلوبين بالأكسجين والضغط الجزئي للأكسجين تمثل بيانياً بمنحنى يطلق عليه اسم منحنى فك الارتباط بين الأكسجين والهيموجلوبين .

وللهيموجلوبين مقدرة على الارتباط بالأكسجين ليكونا معًا مركبًا غير ثابت يحدث له تفكك بسهولة لكي يتحرر الأكسجين مرة أخرى . فعندما يصل الدم إلى الرئتين وعن طريق الشريان الرئوي يكون الضغط الجزئي للأكسجين في هواء الرئتين مرتفعاً (حوالي 100 م زئبق) وعندئذ يرتبط الهيموجلوبين في الشعيرات الدموية للرئتين بالأكسجين ثم يعود الدم مرة أخرى من الرئتين إلى الأنسجة والتي يكون فيها الضغط الجزئي بالأكسجين منخفضاً (10 - 40 م زئبق) ، لذا يتفكك الأكسجين عن الهيموجلوبين ويعطى الدم معظم ما يحمله من الأكسجين إلى خلايا الأنسجة .

وللهيموجلوبين قابلية الارتباط بغاز أول أكسيد الكربون قد تصل مائتى مرة ارتباطه بالأكسجين ، وهذا الارتباط يكون قوياً ويكون مركب ثابت يسمى الكاربوكسى هيموجلوبين . وفي هذه الحالة يكون جزء الهيموجلوبين المرتبط بغاز أول أكسيد الكربون ليست له أى مقدرة على الارتباط بالأكسجين ، ولذا فغاز أول أكسيد الكربون يعتبر غازاً ساماً ولو وصلت نسبته فى الهواء 2% قد يؤدى إلى الوفاة .

انتقال ثانى أكسيد الكربون

عن طريق الدم الذى قام بنقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة يتم أيضاً نقل ثانى أكسيد الكربون من الأنسجة فى طريق عودته إلى الرئتين ولكن انتقال ثانى أكسيد الكربون يختلف عن انتقال الأكسجين فى كونه ينتقل بثلاث طرق مختلفة :

• الجزء الاكبر من ثانى أكسيد الكربون (حوالي

(67%) والذى يصل إلى الدم

يتحول داخل كريات الدم الحمراء إلى حامض الكربونيك والذى يتأين إلى أيونات البيكربونات والهيدروجين بمساعدة إنزيم الكربونيك أنهيدريز . وأيونات الهيدروجين المتكونة يتم معادلتها بالعديد من المركبات المنظمة الموجودة في الدم . أما أيونات البيكربونات فتنو布 إذابة طبيعية سواء في البلازما أو داخل كريات الدم الحمراء .

• جزء آخر من ثانى أكسيد الكربون (حوالي %25) يرتبط عكسيًا بالهيموجلوبين حيث ينتقل إلى الرئتين ليتم تبادله مع الأكسجين والمركب الناتج من ارتباط الهيموجلوبين بغاز ثانى أكسيد الكربون يطلق عليه اسم كربامينوهيموجلوبين .

وكما في حالى ارتباط الأكسجين بالهيموجلوبين فإن ارتباط ثانى أكسيد الكربون بالهيموجلوبين وفك هذا الارتباط يكون مرتبطًا بالضغط الجزئي للغاز . ويمكن أيضًا رسم علاقة بين الضغط الجزئي لغاز ثانى أكسيد

الكربون ومحتوى الدم من الغاز يعرف هذا المنحنى
بمنحنى فك ارتباط الدم بثاني أكسيد الكربون .

- الجزء المتبقى من غاز ثانى أكسيد الكربون ويمثل حوالى 8% من الغاز المنطلق من خلايا الجسم يذوب إذابة طبيعية فى بلازما الدم وأيضاً فى كريات الدم الحمراء .

الأجهزة الإخراجية

عملية الإخراج تعنى تخلص الجسم من المواد الإخراجية الناتجة عن عمليات الأيض المختلفة ، والتى لا يستفاد منها وقد يكون بعضها ضاراً إذا تراكم تداخل خلايا الجسم . وتعمل الأجهزة الإخراجية على التخلص من الماء الزائد والمعادن والمواد العضوية وأيضاً الغازات . بينما يحتفظ الجسم بالمواد الضرورية لأداء الوظائف الحيوية ، لذا فالأجهزة الإخراجية تلعب دور هام فى التخلص من النواتج النيتروجينية وأيضاً فى ثبات الرقم الهيدروجينى لسوائل الجسم . والفضلات

الرئيسية الناتجة من أيض المواد الكربوهيدراتية والليبيدات هي ثانى أكسيد الكربون والماء ، حيث يخرج الماء فى البول بواسطة الأعضاء الإخراجية وأيضاً من الجلد فى صورة عرق . أما ثانى أكسيد الكربون فيخرج عن طريق الأعضاء التنفسية ، وأيضاً بواسطة الإنتشار من خلال الجلد والفضلات الرئيسية الناتجة من أيض البروتينات والأحماض النوويه فهى المركبات المحتوية على النيتروجين ويطلق عليها اسم الفضلات النيتروجينية وهى الأمونيا والبولينا وحامض البوليك .

والأمونيا مادة إخراجية سامة جدًا ومن هنا فإن الحيوانات التي تعيش في وفرة من الماء تخرج معظم الفضلات النيتروجينية في صورة أمونيا ومن أمثلة هذه الحيوانات اللافقاريات التي تعيش في الماء وأيضاً بعض الأسماك . أما في الحيوانات التي لا تعيش في وفرة من الماء مثل السلاحف والبرمائيات والثدييات فإن معظم الأمونيا يتم تحويلها في الكبد إلى مادة أقل في التأثير السمية وهو البولينا . بينما نجد أن الحيوانات التي تعيش في بيئات يندر بها الماء فإن معظم الفضلات

النيتروجينية تكون فى صورة حامض البوليك والذى يمكن التخلص منه فى صورة صلبة ومن أمثلة هذه الحيوانات الحشرات والزواحف والطيور .

وظيفة عضو الإخراج تكون مرتبطة بعملية التنظيم الأسموزى أى بعملية أتران الماء والمعادن .

الفجوات المنقضة وتوجد فى الأوليات التى تعيش فى المياه العذبة وأيضاً فى الأوليات البحرية التى لها أهداب وفى الأسفنجيات .

أنبيوبات مالبىجي وتوجد فى الحشرات .

الأنبوبات الإخراجية المزودة بالخلايا اللهبية وتوجد فى الديдан المفلطحة ، وبعض الديدان الحلقية .

الأنبوبات الإخراجية والتى تعتمد فى تكوين البول على عملية الترشيح بالضغط وهذه توجد فى القشريات والرخويات والفقاريات .

وهنا تجدر الإشارة إلى الأنبيوبات الإخراجية الموجودة فى اللافقاريات والحبليات السفلية تسمى النفريدات (المفرد : نفريدة) ، بينما تسمى فى الحيوانات الفقارية النفرونات .

وأعضاء الإخراج الأساسية في الثدييات هي الكليتان حيث تقوم بتخلص الجسم من المواد الإخراجية النيتروجينية هذا بالإضافة لوجود أعضاء أخرى تلعب دوراً في تخلص الجسم من المواد الإخراجية عديدة ومن أمثلتها طلائية الأنف ، والغدد اللعابية والرئتان والكبد والأمعاء الغليظة والجلد .


الجهاز البولى في الإنسان

يتكون الجهاز البولى في الإنسان من الكليتين ويتمد من كل كلية حالب ، ويصب الحالبان في المثانة البولية ومنها يخرج البول عن طريق مجرى البول وجرى البول في الذكر هو الجزء النهائي للجهاز البولى وأيضاً الجهاز التناسلى . أما في الأنثى فوظيفة مجرى البول إخراجية فقط .

الكلية

الوظيفة الأساسية للكلية هي تخلص الجسم من المواد الإخراجية والماء الزائد مع المحافظة على حجم وتركيب الدم ، وبالتالي فهي المسئولة عن تكوين البول ، هذا بالإضافة لدورها في الجسم كنوع من صمامات ، كما سيتم الإشارة إليه مع وظائف الغدد

الصماء ، ومن هنا فالكليتان توصفان كعدين لونهما أحمر ، تقعان في الجزء الخلفي من تجويف البطن على جانبي العمود الفقري وتشبه الكلية في شكلها حبة الفاصوليا ، ويدخل كل كلية شريان كلوي ويترفرع إلى فروع صغيرة ويسمى كل فرع شرين وارد ومتصل بالكلية وعاء دموي آخر هو الوريد الكلوي الذي يخرج فيه الدم من الكلية بعد تخلصه من المواد الإخراجية .




وعند دراسة قطاع طولي الكلية نجد أنها تتكون من :

- . القشرة وهي المنطقة الخارجية .
- . النخاع وهذا يمثل المنطقة الوسطى من الكلية .

حوض الكلية وهو المنطقة الداخلية والتي يبدأ منها الحالب ويوجد في كلية الإنسان حوالي مليون وحدة من الوحدات المسئولة عن تكوين البول تعرف باسم النفرونات(المفرد : نفرون) .

يتركب النفرون من محفظة بومان والتي يصلها أحد الأفرع الصغيرة من الشريان الكلوي ، حيث تحيط المحفظة شبكة من الشعيرات الدموية تسمى الكبة أو الجمع . ويطلق على المحفظة والجمع معًا كرية مليجى والتي تؤدى إلى الأنبيوبة الملتوية القريبة حيث تكون على اتصال بفرعى منحنى هنلى الموجود على شكل حرف U ، ثم يؤدى المنحنى إلى الأنبيوبة الملتوية البعيدة وتصب هذه الأنبيوبات فى أنبيوبات مجمعة حيث تتجمع فى حوض الكلية لجمع البول من الوحدات البولية ليصل إلى الحالب فى طريقة إلى المثانة البولية .



www.alriyadh.com

خطوات تكوين البول

يتم تكوين البول في الوحدات البولية داخل الكلية في ثلاثة خطوات رئيسية هي :

✓ الترشيح في الجمع

تبدأ عملية تكوين البول في داخل محفظة بومان حيث يصل الدم إلى الشعيرات الدموية المكونة للجمع ولذا يتم

ترشية من خلال جدران هذه الشعيرات بواسطة ضغط الدم . والسائل المكون في تجويف محفظة بومان يشبه بلازما الدم فيما عدا أنه يكاد يكون خالياً من البروتينات . ونتيجة أن عملية الترشيح تتم تحت ضغط فإن جميع الأيونات والجزيئات الموجودة في البلازما تتنقل مع الراشح فيما عدا جزيئات البروتينات الكبيرة والتي لا تستطيع النفاذ من خلال جدر الشعيرات الدموية .

✓ إعادة امتصاص بالأنيبيوبات

بعد عملية تكوين الراشح تحت ضغط ، يندفع هذا الراشح إلى الأنبيوبة الملتوية القريبة وقد قدر حجم الراشح الذي يتكون في الكليتين للإنسان بحوالى 180 لترًا يومياً ، ومن هنا فإن خلايا الأنبيوبات البولية تقوم بعملية إعادة امتصاص لمعظم الأيونات والجزيئات وأيضاً لجزء كبير من الماء . وقد ثبت أن معظم عمليات الامتصاص هذه تتم بواسطة النقل النشط من خلال أغشية خلايا الأنبيوبة الملتوية القريبة وذلك لكي تعود مرة أخرى إلى الدورة الدموية .

و عمليات إعادة الامتصاص في الأنبيوبات البولية تختلف من مادة إلى أخرى ، حيث توجد مواد مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية يعاد امتصاصها بالكامل بينما توجد مواد أخرى لا يعاد امتصاصها كلياً مثل البولينا وحامض البولييك هذا بالإضافة إلى أن معظم الأملاح المعدنية يعاد امتصاصها بكميات متقاربة . وهناك ما يعرف باسم الحد الأقصى للكمية التي يمكن إعادة امتصاصها من المادة فالجلوكوز لو وجد في الدم في المستوى الطبيعي (80 - 180 مجم | 3 سم دم) فإنه يعاد امتصاصه كاملاً ، أما إذا زاد عن المعدل فإن الوحدات البولية تقوم بإعادة امتصاص الحد الأقصى والزيادة من الجلوكوز لا يتم امتصاصها ولذا يظهر الجلوكوز في البول وهذا ما يعرف باسم مرض السكري .

• الإفراز الأنبيובי

هذه الخطوة في تكوين البول هي عكس الخطوة السابقة فالأنبيوبات البولية لها المقدرة على إفراز مواد معينة

فى صورة أيونات أو جزيئات مثل أيونات الهيدروجين والبيوتاسيوم وبعض العقاقير التى قد يتناولها الإنسان ومواد أخرى عديدة ومعظم عمليات الإفراز تتم فى الأنابيب الملتوية البعيدة .

إخراج الماء

من المعروف أن الكلية تلعب دوراً هاماً فى تنظيم الضغط الأسموزى للدم وذلك عن طريق إعادة امتصاص الماء ، ومن هنا تحكم فى كمية الماء الخارج فى صورة بول . فحينما تكون كمية الماء التى تم تناولها كبيرة يزيد حجم البول وفى نفس الوقت يكون مخففاً ، أما عندما تكون كمية الماء التى تصل الجسم قليلة فهنا يقل حجم البول بدرجة كبيرة ، وعلى ذلك فإن الكلية تؤدى دوراً هاماً فى الحفاظ على كمية ثابتة من الماء فى الدم . وهناك هرمون يفرز من الفص الخلفى من الغدة النخامية يسمى الهرمون المضاد الإدرار البول يتحكم فى إعادة امتصاص الماء فى الأنابيبات البولية .

الكلية الصناعية

جهاز الكلية الصناعية يستخدم لمرضى الفشل الكلوى وذلك لكي يقوم مقام الكلىتين بغرض تخلص دم المريض من المواد الإخراجية النيتروجينية ، وأيضاً أى فضلات أخرى أو سموم موجودة فى الدم . وتعتمد فكرة هذا الجهاز على وجود غشاء يسمح بمرور المواد الإخراجية ذات الأحجام الصغيرة الموجودة فى الدم ولا يسمح بمرور المواد ذات الجزيئات أو الأحجام الكبيرة مثل بروتينات البلازمما وخلايا الدم . وهذا الغشاء يفصل بين محلول خاص يسمى محلول الديازة يحتوى على بعض الأيونات وبين الدم الذى يتم سحبة من شريان فى ذراع المريض بواسطة أنبوبة خاصة . وعلى ذلك أثناء مرور الدم فى الجهاز يتم انتقال جزيئات المواد الإخراجية من الدم إلى محلول ومن أهم المواد التى يتم التخلص منها هى البولينا وحامض البوليك والكرياتينين وعديد من الفضلات الأخرى ثم يعود الدم إلى مرشح خاص لتخلصه من أى فقاعات هوائية أو جلطات دموية ، وذلك قبل إعادته إلى جسم المري .


التحكم العصبي الهرموني

يقوم كل من الجهاز العصبي والغدد الصماء بالتحكم في وظائف الجسم المختلفة ، فالوظيفة الأساسية للجهاز العصبي هي استقبال المعلومات من أعضاء الحس المختلفة يتبعه إرسال إشارات كيميائية كهربائية إلى أعضاء الجسم المختلفة ، ومن هنا يتتحكم الجهاز العصبي في الأنشطة وردود الأفعال السريعة ، مثل انقباض العضلات . أما الغدد الصماء فغالبًا ما تتحكم في الوظائف الأيضية ويتم ذلك عن طريق تصنيع وإفراز مواد كيميائية تسمى الهرمونات والتي تطلق إلى الدم حيث تصل إلى العضو المستهدف . وفي جميع الفقاريات نجد أن الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء يكملان بعضهما ويعملان معاً لتنظيم وظائف الأعضاء المختلفة والتحكم في علاقة الدماغ تعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين الجهاز العصبي والغدد الصماء .

أولاً: التحكم العصبي

الجهاز العصبي وأعضاء الحس

من الناحية التشريحية يتكون الجهاز العصبي من الأعصاب والعقد العصبية وكذلك كتلة النسيج التي تنشأ منها الأعصاب والعقد العصبية وهذه تشمل الدماغ والحلق الشوكي أما من الناحية الفسيولوجية فإن الجهاز العصبي هو ذلك الجهاز الذي يستقبل المعلومات من الأعضاء الحسية المختلفة ثم يقوم بترجمة



هذا المعلومات إلى شفرة خاصة بواسطة الجهاز العصبي المركزي حيث يقوم الأخير بتحويلها إلى ردود فعل مناسبة .

وينقسم الجهاز العصبي إلى :

الجهاز العصبى المركزى ويكون من الدماغ وهو محاط بعظام الجمجمة والحبل الشوكى الذى يوجد داخل العمود الفقارى .


الجهاز العصبى الطرفى ويكون من الأعصاب المخية (عددها فى الإنسان 12 زوجاً) والأعصاب الشوكية (عددها فى الإنسان 31 زوجاً) ويقوم الجهاز العصبى الطرفى بنقل الإشارات العصبية من مستقبلات الحس المختلفة إلى الجهاز العصبى المركزى ومن الأخير إلى الأعضاء المنفذة كالعضلات والغدد ويمكن تقسيم الجهاز العصبى إلى جزئين :

جزء وارد وهذا يشمل الأعصاب التى تنقل المعلومات من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبى المركزى .
جزء صادر وهذا ينقسم بدوره إلى جهاز عصبى جسدى والذى يتكون من أعصاب حركية تمد عصبياً العضلات الهيكличية ، وجهاز عصبى ذاتى وهو عبارة عن الأعصاب التى من خلالها تستقبل الأوعية الدموية والقلب والغدد ... إلخ إمداداتها العصبية ، ويشمل الجهاز العصبى الذاتى جهازين هما :

جهاز عصبى سمبتاوى

جهاز عصبى جارسمبتاوى

ويمكن تلخيص تقسيم الجهاز العصبى كما يلى



الخلية العصبية

الخلية العصبية هي وحدة تركيب الجهاز العصبي وتتميز الخلايا العصبية بقدرها على نقل وتوصيل الإشارات العصبية إلى أجزاء الجسم المختلفة كما أن لها قدرة على تصنيع المواد الناقلة للإشارات العصبية مثل الأستيل كولين والنورادرينالين والدوبامين والسيروتونين . والخلايا العصبية لها أيضاً دور في تصنيع الدهون والمواد الكربوهيدارтиة والبروتينات كما أن جميع الخلايا العصبية لها معدل أيضي مرتفع وتحتاج دائماً إلى إمداد مستمر من الأكسجين والجلوكوز والمواد الغذائية الأخرى .


ت تكون الخلية العصبية من جسم الخلية وتفرعات سيتوبلازمية تخرج من جسم الخلية تسمى زوائد الخلية ، وهذه تنقسم بدورها إلى الزوائد الشجرية التي تنقل الإشارات العصبية إلى جسم الخلية والمحور ، وهو ينقل الإشارة العصبية بعيداً عن جسم الخلية إلى خلايا عصبية أخرى أو إلى العضلات والغدد . ويكسو المحور غلاف يتكون من عدة طبقات من مادة بروتينية دهنية تسمى الغلاف الملييني تكونه خلايا خاصة تسمى خلايا شوفان ويعزل الغلاف الملييني المحور عن باقى المحاور

المجاورة . والمحاور المحاطة بالغلاف الميلينى تنقل الإشارات العصبية أسرع من غير المحاطة بغلاف ميلينى . ولا يحيط الغلاف المحور على مدى طوله بل ينقطع على مسافات منتظمة وتسمى هذه النقاط غير مغلفة بعقد رانقييه ، حيث يكون المحور على اتصال مباشر بالسائل خارج الخلايا . وينتهي المحور بتفرعات صغيرة تسمى التفرعات النهاية وفى نهاية كل فرع يوجد انفصال يحتوى على حويصلات تخزن فيها مواد ناقلة للإشارات العصبية .

ويحاط جسم الخلية العصبية بغشاء خلوى ويوجد بداخلة النواة والتى تحتوى على نوية . كما توجد أيضاً داخل جسم الخلية عضيات حية مثل الميتوكوندريا وجهاز جولجي ، وشبكة إندوبلازمية وريبوسومات ، كما توجد خيوط دقيقة تسمى الليففات العصبية . ويحتوى سينوبلازمما الخلية العصبية على حبيبات دقيقة تسمى حبيبات نسل والتى تعتبر صفة مميزة لهذه الخلايا دون غيرها وت تكون هذه الحبيبات من شبكة إندوبلازمية محبيبة ولا تحتوى الخلية العصبية على الجسم المركزى ، ولذلك فهى لا تمتلك القدرة على الانقسام .

أنواع الخلايا العصبية

وكما أشرنا سابقاً عند دراسة الأنسجة العصبية فإنه يمكن تصنيف الخلايا العصبية من حيث التركيب وعدد الروائد السيتوبلازمية التي تخرج من جسم الخلية إلى ثلاثة أنواع :



خلايا عصبية وحيدة القطب

هذا النوع من الخلايا العصبية يحتوى على زائدة بروتوبلازمية واحدة تخرج من جسم الخلية ، ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يعمل كزائدة شجرية والآخر يعمل كمحور .

ومثل هذا النوع من الخلايا العصبية يوجد في العقد العصبية المرتبطة بالجذور الظهرية للأعصاب الشوكية .

خلايا عصبية ثنائية القطب

تحتوي هذا النوع من الخلايا على زائدتين تخرج كل واحدة عند طرف من طرف الخلية ، تعمل إداتها كزائدة شجرية والأخرى تعمل كمحور . ومثل هذا النوع من الخلايا يوجد في شبكيّة العين .

خلايا عصبية عديدة الأقطاب

وتحتوي هذه الخلايا على زوائد شجرية عديدة ومحور واحد ، وهذا النوع من الخلايا العصبية يوجد في الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحلب الشوكي) وفي القرن البطني للحلب الشوكي .

وأيضاً يمكن تصنيف الخلايا العصبية على أساس وظيفتها إلى ثلاثة أنواع :

خلايا عصبية حسية (واردة)

هذا النوع من الخلايا ينقل الإشارات العصبية من المستقبلات (في أعضاء الحس أو في الأعضاء

الداخلية) إلى الجهاز العصبي المركزي وهذه الخلايا أحادية القطب حيث يخرج من جسم الخلية زائدة تتقسم إلى فرعين ، فرع يمتد إلى المستقبلات وينقل منها الإشارة العصبية وفرع يعمل كمحور ويوصل الإشارة العصبية لخلية عصبية أخرى دخل الجهاز العصبي المركزي .

خلايا عصبية حركية (صادرة)

وهذه الخلايا تنقل الإشارات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى عضو الاستجابة مثل العضلات والغدد . وهذه الخلايا متعددة الأقطاب حيث لها عدة زوائد شجرية ومحور واحد .

خلايا عصبية موصلة (بينية)

هذا النوع من الخلايا العصبية يوجد داخل الجهاز العصبي المركزي وهي خلايا متعددة الأقطاب حيث تنقل الإشارات العصبية من خلية عصبية إلى أخرى .

الإشارة العصبية

الإشارة العصبية هي عبارة عن تغيرات كمائية وكهربية تحدث في غشاء الخلية العصبية وتنقل هذه التغيرات على امتداد محور الخلية إلى النهايات العصبية .

ومن المعروف أن غشاء الخلية يفصل بين السائل خارج الخلايا والسائل داخل الخلايا الذين يختلفان عن بعضهما في تركيز الأيونات الموجودة بكل منها ، فالسائل خارج الخلايا يحتوى على تركيز عالية من أيونات الصوديوم والكلوريد . بينما السائل داخل الخلايا يحتوى على تركيزات عالية من أيونات البوتاسيوم والأيونات العضوية كبيرة الحجم مثل البروتينات .

وعلى ذلك ففى حالة الراحة (أي حالة عدم توصيل إشارة عصبية) توجد على السطح الخارجى للغشاء الخلوي تركيزات عالية من الشحنات الموجبة ، بينما على السطح الداخلى للغشاء توجد تركيزات عالية من الشحنات السالبة . والسبب فى ذلك هو اختلاف نفاذية غشاء الخلية للأيونات ، فغشاء الخلية فى حالة الراحة يسمح بمرور أيونات البوتاسيوم (التي توجد بتركيزات عالية داخل الخلية) من الداخل إلى الخارج مسبباً تراكم الشحنات الموجبة خارج غشاء الخلية ، أما الأيونات سالبة

الشحنة مثل البروتينات والتى لا تستطيع المرور عبر الغشاء تسبب تراكم الشحنات السالبة بالداخل وهذا يجعل الغشاء الخلوي فى حالة استقطاب ، أى يكون الغشاء موجب الشحنة فى الخارج سالب الشحنة فى الداخل .

أما عند مرور إشارة عصبية فيحدث تغير سريع فى نفاذية الغشاء الخلوي ويصبح منذلأ لآيونات الصوديوم (التي توجديتركريزات عالية فى السائل خارج الخلايا)، فتمر آيونات الصوديوم الموجبة الشحنة من الخارج إلى الداخل مسببة تراكم الشحنات الموجبة على الناحية الداخلية للغشاء الخلوي وظهور ما يسمى بحالة إزالة الاستقطاب وعلى ذلك يصبح الغشاء موجب الشحنة فى الداخل سالب الشحنة فى الخارج . هذا التغير المؤقت الذى يحدث فى نفاذية الغشاء يسبب ما يعرف بجهد الفعل الذى ينتقل عبر المحور من جزء إلى الجزء الذى يليه مسببا نقل الإشارة العصبية . وبعد إزالة الاستقطاب يعود غشاء الخلية إلى حالته السابقة بعملية تسمى إعادة الاستقطاب والمقصود بها عودة جهد الغشاء الخلوي إلى حالة الراحة حيث يحدث نقص مفاجى فى نفاذية غشاء الخلية لأيونات الصوديوم مما يؤدى إلى منع دخول آيونات الصوديوم لداخل الخلية ، وأيضا يحدث خروج

سريع لأيونات البوتاسيوم الموجبة الشحنة وذلك للوصول إلى الجهد الراحة .

التشابكات (المتشابك) العصبية.

المتشابك العصبي هو الموضع الذى تقترب فيه نهايات تفريعات محور خلية عصبية من التفرعات الشجرية لخلية عصبية أخرى ، ولا يوجد اتصال سينوبلازمى بين هذه النهايات والتفرعات الشجرية ، ولكن توجد مسافة صغيرة جدا تقدر بحوالى 20 مللى ميكرون.

ويكون أى تشابك عصبى من غشاء ما قبل المتشابك وغشاء ما بعد المتشابك والمسافة التى بينهما تسمى شق المتشابك .

وقد تكون المتشابكات العصبية بين خلتين عصبيتين أو بين خلية عصبية وليفة عضلية أو قد يكون المتشابك العصبى بين خلية عصبية وخلية غدية .

أنواع التشابكات العصبية .

يوجد نوعان من التشابكات العصبية :

التشابكات العصبية الكهربية .

ويوجد هذا النوع من التشابكات العصبية بصورة شائعة في اللافقاريات ، كما يوجد أيضا في الجهاز العصبي للفقاريات ولكن بصورة غير شائعة والتشابكات العصبية الكهربية هي النقاط التي يمر عندها التيار الأيوني مباشرة عبر فجوات الاتصال الكهربائي وذلك من خلية إلى أخرى . وتوجد هذه الفجوات بين خلايا الغراء العصبي وكذلك بين الألياف العضلية في القلب والألياف العضلية الملساء في جدار المعدة .

(ب) التشابكات العصبية الكيميائية :

وهذه التشابكات أكثر تعقيدا من التشابكات الكهربية حيث تحتوى على حويصلات من مواد كيميائية خاصة تسمى بالنقلات العصبية والخلايا العصبية التي تحمل الإشارة العصبية جهة التشابكات تسمى الخلايا العصبية قبل التشابكية ، أما الخلايا التي تحمل الإشارة العصبية بعيدا عن هذه التشابكات فتسمى الخلايا العصبية بعد التشابكية . وفي هذه التشابكات ينفصل غشاء ما قبل التشابك عن غشاء ما بعد التشابك بواسطة شق التشابك (والذى يقدر بحوالى 20-30 مللى ميكرون)

وفي معظم الخلايا العصبية يتفرع عند نهاية إلى عدة أفرع ، كل فرع يقترب من التفرعات الشجرية أو من جسم الخلية للخلية

العصبية التى تليها، وعادة ما تتصل الخلية العصبية بالعديد من خلايا عصبية أخرى عن طريقآلاف من التشابكات العصبية . والإشارة العصبية تأتى من محور الخلية العصبية ثم تنتشر فى أفرع ونهيات عصبية كثيرة وعلى ذلك تغطى الخلية العصبية بإشارات عصبية كثيرة فى آن واحد.

آلية نقل الإشارات العصبية فى تشابكات الجهاز العصبى المركزى .

تنتقل الإشارات العصبية فى تشابكات الجهاز العصبى المركزى من خلال عدة آليات بعضها يسبب حالة تحفيز لغشاء ما بعد التشابك وبعضها يسبب حالة تثبيط لغشاءما بعد التشابك والبعض الآخر قد يؤدي إلى حالة تثبيط لغشاء ما قبل التشابك .

حالة التحفيز أو الحث بعد التشابك

عند وصول الإشارة العصبية إلى النهيات العصبية والذى يؤدي إلى دخول أيونات الكالسيوم إلى هذه النهيات يتحرر الناقل العصبى من حويصلات التخزين ، ثم يفرز إلى شق التشابك، وحيث إن شق التشابك ضيق جدا ففى خلال 1/100 من الثانية ينتشر الناقل العصبى ليصل لغشاء ما بعد التشابك ويرتبط

بالمستقبلات الخاصة به على هذا الغشاء . ويؤدى ارتباط الناقل العصبى بالمستقبلات الخاصة به على غشاء ما بعد التشابك إلى تغير نفاذية هذا الغشاء لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم ، الأمر الذى يؤدى إلى دخول أيونات الصوديوم إلى خلية ما بعد التشابك مسببا إزالة استقطاب موضعية لغشاء خلية ما بعد التشابك مقربا جهد الغشاء إلى ما يسمى تحفيز جهد ما بعد التشابك وب مجرد وصول هذا الجهد إلى قيمة معينة تسير موجة من التحفيز أو الحث فى الخلية التى سرعان ما تنتشر لتمتد بطول المحور. وقد وجد أن الناقل العصبى فى معظم التشابكات المحفزة هو عبارة عن الأتيل كولين ، كذلك يعتبر النورادرينالين والدوبارمين والسيروتونين نواقل عصبية محفزة ، حيث وجد أن مستويات هذه النواقل يزيد فى الدماغ والحلق الشوكى أثناء حالة الحث .

حالة تثبيط ما بعد التشابك

وهنا يكون الناقل العصبى من النوع المثبط ، مثل الجليسين أو حامض الجاما أمينوبيوتيرات . فعند ارتباط الناقل بالمستقبلات الخاصة به يحدث تغير فى نفاذية

غشاء ما بعد التشابك مؤدياً إلى تراكم شحنة موجبة خارج الغشاء ، وهذا ما يسمى بزيادة الاستقطاب (أى أن الناحية الداخلية للغشاء تصبح سالبة أكثر مما كانت عليه وقت الراحة) وهنا تكون الاستجابة هى حالة تثبيط حيث يتغير الجهد إلى ما يسمى تثبيط جهد ما بعد التشابك وهذا قد يكون ناتجاً إما عن :

زيادة نفاذية غشاء ما بعد التشابك لأيونات الكلورين والتي يكون تركيزها أعلى خارج الغشاء عن تركيزها داخل الغشاء فتنتشر هذه الأيونات سالبة الشحنة داخل الخلية وتجعل داخل الخلية أكثر سالبية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستقطاب .

زيادة نفاذية غشاء ما بعد التشابك لأيونات البوتاسيوم ، والتي يكون تركيزها داخل الخلية أعلى من خارج الخلية ، فيؤدي ذلك إلى انتشار أى خروج أيونات البوتاسيوم من داخل الخلية إلى خارجها . وهذا يضيف شحنة موجبة خارج الخلية فيصبح خارج الخلية ذو شحنة موجبة أعلى ، الأمر الذى ينتج عنه حالة زيادة الاستقطاب . ومن المعروف أن الخلايا العصبية التى

تفرز نهاياتها نوافل عصبية تسبب حالة تثبيط تسمى
خلايا عصبية مثبطة .

حالة تثبيط ما قبل التشابك

يحدث هذا النوع من التثبيط عند تكوين تشابك بين محور خلية مع محور خلية أخرى ، ولذا يطلق هذا النوع تشابك محور - محوري . حيث تكون الخلية العصبية رقم (1) خلية مثبطة والتي يتشارك محورها مع غشاء ما قبل التشابك (محور الخلية رقم 2) ، والذي يتشارك بدوره مع غشاء ما بعد التشابك (الخلية رقم 3) وينطلق من محور الخلية رقم (1) مادة ناقلة مثبطة مثل حامض الجاما أمينوبيوتيرات ، وهذه المادة المثبطة تؤدى إلى فتح قنوات لأيونات الكلورين فى غشاء ما قبل التشابك للخلية رقم (2) ومن هنا تتدفع أيونات الكلورين من الخارج إلى داخل الخلية ، فيقل جهد الفعل فى النهايات العصبية للخلية رقم (2) ومعنى ذلك حدوث تثبيط أو إعاقة للإشارة العصبية المنقولة من هذه الخلية رقم (3) وهذه الحالة يطلق عليها تثبيط ما قبل التشابك .

القوس العصبي المنعكس

ومن المعروف أن معظم الخلايا العصبية تعمل في مجموعات حيث تتنافر هذه الخلايا لأداء ما يعرف باسم الفعل الانعكاسي ويشمل القوس العصبي المنعكس على خلتين عصبيتين على الأقل هما الخلية العصبية الواردة والخلية العصبية الصادة ولكن في معظم الأحيان تكون القوس العصبي من :

- ✓ عضو الإحساس أو المستقبل
- ✓ خلية عصبية حسية أو واردة
- ✓ خلية عصبية موصلة
- ✓ خلية عصبية حركية أو صادرة
- ✓ العضو المستجيب أو المنفذ وهو العضو الذي سوف يستجيب للتغيرات التي تحدث في البيئة.

ومن أمثلة الأعضاء المنفذة العضلات والغدد ويسمى القوس العصبي الجسدي عندما تظهر الاستجابة في عضلة إرادية ، بينما يسمى القوس العصبي اللاإرادى عندما تكون الاستجابة في العضلات اللاإرادية أو عضلة القلب أو الغدد .

الجهاز العصبي المركزي

يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي ويوجد الدماغ داخل الجمجمة ، بينما يوجد الحبل الشوكي داخل القناة الفقارية . ويحيط كل من الدماغ والحبل الشوكي الأغشية السحائية التي تتكون من ثلاثة طبقات هي : الأم الجافية ، والغشاء العنكبوتي والأم الحنون . وتوجد بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون مسافة تسمى التحت عنكبوتية هذه المسافة مملوءة بالسائل المخى الشوكي . وهذا السائل بديل للليمف الذي يوجد حول خلايا أجهزة الجسم الأخرى ومن ما يعرف أن كثيراً من المواد الموجودة في بلازما الدم لا تصل بسهولة إلى الدماغ لوجود ما يعرف باسم حاجز الدم الدماغي . ويشتمل الحبل الشوكي على المادة السنجابية الموجودة في الداخل على شكل جناح فراشة والتي تحتوى على أجسام الخلايا العصبية . والمادة البيضاء في الخارج والتي تحتوى على حزم الألياف العصبية ويتصل بالحبل الشوكي في الإنسان 31 زوجاً من الأعصاب الشوكية . وكل عصب يتكون من جذرين ، جذر ظهرى يحوى ألياف الخلايا الواردة (الحسية) وجذر بطنى والذى يحوى ألياف الخلايا الصادرة (الحركية) .

والدماغ على نقىض الحبل الشوكي تكون فيه المادة السنجابية للخارج مكونة قشرة الدماغ والمادة البيضاء للداخل . والنسبة بين وزن الماغ والحبل الشوكي في الحيوان تعطى دلالة على مقدار الذكاء عند الحيوان . ففي الأسماك تكون هذه النسبة 1:1 بينما نجد أن هذه النسبة في الإنسان تصل إلى 1:55 أي وزن الدماغ في الإنسان يساوى تقريرًا 55 ضعفًا من وزن الحبل الشوكي . ويكون الدماغ في الحيوانات الفقارية من عدة أجزاء

هي :

الدماغ الأمامي والذي يشتمل على قشرة الدماغ والمهاد وتحت المهاد .
الدماغ المتوسط .

الدماغ الخلفي والذي يشتمل على المخيخ وقطرة الدماغ والنخاع ويتصل بالدماغ في الإنسان 12 زوجاً من الأعصاب المخية .

الجهاز العصبي الطرفي

يقصد بالجهاز العصبي الطرفي الأعصاب المتصلة بكل من الدماغ والحبل الشوكي . ويمكن تقسيم هذه الأعصاب طبقاً للوظيفة إلى أعصاب واردة أو حسية وهي التي تحمل

المعلومات أو الإشارات من المستقبلات الحسية الموجودة في أطراف الجسم المختلفة إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحلق الشوكي) ، وأعصاب صادرة أو محركة والأعصاب المحركة تنقسم بدورها إلى نوعين هما :

الأعصاب الجسدية والتي تكون ما يعرف باسم الجهاز العصبي الجسدي والذي تتجه أليافه العصبية إلى العضلات الهيكيلية . ومن هنا تعرف أيضاً هذه الأعصاب باسم الأعصاب الإرادية .

الأعصاب الذاتية والتي تكون ما يعرف باسم الجهاز العصبي الذاتي ، وتعرف أيضاً أعصاب هذا الجهاز بالأعصاب اللاإرادية أو الحشوية ، حيث تمتد هذه الأعصاب إلى كل أحشاء الجسم مثل العضلات اللاإرادية وعضلة القلب والغدد .

الجهاز العصبي الذاتي

تحكم أعصاب الجهاز العصبي الذاتي في جميع الوظائف اللاإرادية حيث يرتبط عملها بوظائف الأحشاء الداخلية ومن هنا يطلق عليه كما ذكرنا سابقاً الجهاز العصبي الحشوي اللاإرادى ، فأعصاب هذا الجهاز تنظم انتظام العضلات الملساء في القناة

الهضمية وفي الأوعية الدموية وفي المثانة وفي قزحية العين ، وأيضاً هذه الأعصاب لها علاقة بتتنظيم انقباض عضلة القلب وكذلك إفرازات العديد من غدد الجسم .

وينقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى جهازين ، وذلك طبقاً لنشأة الأعصاب من الجهاز العصبي المركزي ، وأيضاً طبقاً للوظيفة ، والجهازان هما الجهاز العصبي السمبتواني ، والجهاز العصبي الجارسمبتواني وتنشأ أعصاب الجهاز العصبي السمبتواني من المنطقتين الصدرية والقطنية من الحبل الشوكي ، ولذا يطلق عليه أيضاً اسم الجزء الصدري القطني . بينما أعصاب الجهاز العصبي الجارسمبتواني تنشأ من جذع الدماغ والمنطقة العجزية من الحبل الشوكي ، ولذا يسمى الجزء المخ العجزي .

يتضح أن معظم أعضاء الجسم الداخلية تصلها ألياف عصبية من كلا الجهازين السمبتواني والجار سمبتواني ، وغالباً ما يكون تأثير أحد هذين الجهازين معاكساً لتأثير الآخر ، فمثلاً زيادة نشاط العصب السمبتواني المتجه إلى القلب تعمل على زيادة سرعة نبض القلب وقوة انقباضة ، بينما تحفيز العصب الجاسمبتواني الذي يتصل بالقلب يسبب بطئاً في سرعة النبض .

أعضاء الحس

أعضاء الحس هى تراكيب خاصة تمد الجهاز العصبى المركزى بأى تغيرات تحدث فى البيئة ، ولذا فهى تعرف أيضًا باسم المستقبلات الحسية . والمستقبل عادة يتأثر بنوع معين من الطاقة وله المقدرة على تحويل هذه الطاقة إلى إشارة عصبية تنتقل إلى الجهاز العصبى المركزى والذى بدوره يستجيب لهذه الإشارة .

وتوجد عدة طرق لتصنيف المستقبلات فمثلا يمكن تصنيفها طبقاً لمواععها في الجسم إلى نوعين :

- مستقبلات داخلية موجودة داخل الجسم وتتأثر بالمؤثرات الداخلية، ومنها ما هو موجود بالأحشاء ولذا تعرف باسم المستقبلات الحشوية ، ويوجد أيضًا منها في العضلات والمفاصل والأوتار والأربطة وتعرف باسم المستقبلات الذاتية ، حيث تتأثر بأى تغيرات توترية .
- مستقبلات خارجية وهذه المستقبلات تتأثر بالمؤثرات الخارجية كالصوت والضوء والحرارة البرودة ، وعادة تسمى أعضاء الحس

وهي تشمل العينين والأذنين والأنف واللسان
والجلد .

ويمكن تقسيم المستقبلات طبقاً لنوع الطاقة التي تتأثر
بها إلى :

- مستقبلات كيميائية وهذا النوع من المستقبلات يتتأثر بمادة كيميائية ومن أمثلتها ممستقبلات التذوق على اللسان ومستقبلات الشم الموجودة في النسيج الطلائى الشمى المبطن للأذن .
- مستقبلات ميكانيكية والتي تتأثر ميكانيكياً مثل مستقبلات السمع ومستقبلات الاتزان وجميعها موجودة في الأذن ، أيضاً مستقبلات اللمس والضغط الموجودة في الجلد .
- مستقبلات الحرارة وهي التي تتأثر بالتغييرات في درجة الحرارة سواء بالارتفاع أو الانخفاض . وتوجد في الجلد أيضاً .
- مستقبلات الضوء ويتأثر هذا النوع بالضوء ولذا نجد في شبکية العين ، ومستقبلات الضوء

فى العين نوعان هما العصى والمخاريط .
فالعصى تتأثر بالضوء الخافت بينما تتأثر
المخاريط بضوء النهار وهى المسئولة عن
تمييز الألوان . فالحيوانات التى لا تستطيع
تمييز الألوان تكون شبكية العين عندها تحتوى
على عصى فقط بدون مخاريط

ثانيًا: التحكم الهرمونى

الغدد الصماء

جهاز الغدد الصماء هو الجزء الثانى من الأجهزة التى
تحكم فى وظائف الجسم وهى عدد لا قنوية تفرز مواد كيميائية
تسمى هرمونات تتجه إلى الدم مباشرة ، ومن هنا تسمى الغدد
ذات الإفراز الداخلى ، ولا بد من إنتاج هذه الهرمونات بالكميات
المطلوبة لكي تؤدى وظائفها على أحسن وجه. أما إذا زاد إفراز
الهرمون عن حاجة الجسم أو نقص فهذا سوف يؤدى إلى اختلال
فى الوظيفة مما قد يسبب أعراضًا مرضية تختلف من هرمون
إلى آخر .

والغدد الصماء في الفقاريات هي :

الغدد النخامية .

تحت المهاد .

الغدة الصنوبرية .

الغدد الدرقية .

الغدد الجاردرقية .

غدة الكظر (فوق الكلوية)

المانسل (المبيض في الأنثى ، والخصية في الذكر)

المشيمية (خلال فترة الحمل) .

البنكرياس (ويعتبر غدة صماء حيث يقوم بإفراز ثلاثة

هرمونات وأيضاً يعتبر غدة قوية لأنها يقوم بإفراز

العصارة البنكرياسية)

مخاطية المعدة والأمعاء .

الكليتان .

الهرمونات

يمكن تعريف الهرمون بأنه مادة كيميائية يتم إنتاجها وتخزينها

داخل خلايا غدة لا قوية ، وينطلق هذا الهرمون إلى الدم مجرد

وصول إشارة فسيولوجية ، والتي قد تنتج من تغير تركيز بعض

محتويات الدم (مثل الكالسيوم أو الجلوكوز) أو من وصول إشارة عصبية . وعن طريق مجرى الدم ينتقل الهرمون إلى العضو المستهدف .

ويمكن تقسيم الهرمونات طبقاً لتركيبها الكيميائي إلى ثلاثة

مجموعات :

هرمونات بيتيدية أو بروتئينية التركيب .

هرمونات ستيرودية .

هرمونات مشتقة من الأحماض الأمينية .

و قبل التحدث عن هرمونات الغدد الصماء المختلفة تجدر الإشارة إلى أن هناك هرمونين يفرزان من مناطق عديدة في الجسم وهما البروستاجلاندين واللبتين .

البروستاجلاندين

البروستاجلاندينات تفرز بكميات قليلة من معظم أنسجة الجسم و تعتبر من الهرمونات التي تؤثر في مكان إفرازها ، ولو أن بعضها يمكن أن ينطلق من مكان الإفراز إلى الدورة الدموية ، وهي عبارة عن ليبيدات تكونت من الأحماض الدهنية . والبروستاجلاندينات لها وظائف عديدة منها التحكم في إفراز بعض الهرمونات

الأخرى ، كما أن لها علاقة بعملية تجلط الدم وأيضاً بعض الوظائف المرتبطة بالتكاثر . ومن تأثيراتها العديدة في الجسم أيضاً دورها في استجابة الأنسجة للإصابات . ومن المعروف أن تأثير العقاقير المضادة للالتهابات مثل الأسبرين يكون من خلال مقدرتها على تثبيط تصنيع البروستاجلانдинات .

اللبتين

اللبتين هرمون يفرز في الدم بواسطة خلايا الأنسجة الدهنية ويفترض حالياً أن هرمون اللبتين له علاقة بالسمنة أو البدانة ، حيث يؤثر على مستقبلات خاصة في الدماغ لها علاقة بالشهية ، وأيضاً من خلال تأثيره على أيض المواد الدهنية في الجسم الكائن ، ومن ثم فهو يقوم بتنظيم وزن الجسم من خلال تنظيم وزن الأنسجة الدهنية .

الغدة النخامية

الغدة النخامية على غدة صغيرة لا يتعدى وزنها نصف جرام في الإنسان البالغ وتقع بين سقف وقاع الدماغ . وتقسم الغدة النخامية إلى جزئين هما :

الجزء النخامي الغدي ، وهذا يشمل الفص الأمامي والفص الأوسط .

الجزء النخامي العصبي ويشمل الفص الخلفي والذي يتصل بمنطقة تحت المهاد بالدماغ ، حيث توجد أجسام خلايا عصبية في منطقة تحت المهاد ونهاية أليافها العصبية في الفص الخلفي للغدة . ومن الثابت أن هرمونات هذا الفص الخلفي تفرزها الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تحت المهاد ، وتصل هذه الهرمونات إلى الفص الخلفي من خلايا الألياف العصبية حيث يتم تخزينها وعند الحاجة إليها تطلق هذه الهرمونات من الفص الخلفي إلى الدم .

هرمونات الجزء النخامي الغدي

ينتج الفص الأمامي من هذا الجزء ستة هرمونات جميعها بروتينية التركيب ، وخمسة من هذه الهرمونات تنظيم عمل صماء أخرى في الجسم ، ولذا تسمى هرمونات منشطة ، ولهذا السبب يطلق على الغدة النخامية الغدة القائد . هرمونات هذا الجزء هي :

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

يعلم هذا الهرمون على تنظيم إنتاج هرمونى الغة الدرقية التيروكسين وثلاثى أيدو الشيروبين . ويتأثر إفراز الهرمون المحفز للغدة الدرقية بمستوى هرمونات الغة الدرقية فى الدم وأيضاً بمادة تفرز من منطقة تحت المهداد وتسمى العامل المحرر للهرمون الحافز للغدة الدرقية .

الهرمون المحفز لقشرة الغدة الكظرية

ينظم هذا الهرمون نشاط قشرة الغدة الكظرية ويتحكم فى إفراز هذا الهرمون مستوى هرمونات قشرة الغدة الكظرية فى الدم وهرمون يفرز من تحت المهداد يسمى الهرمون المحرر للهرمون المنظم لقشرة الغدة الكظرية .

الهرمونات المنظمة لعمل المناصل

تعمل هذه الهرمونات على تنظيم المناصل (المبيضين والخصيتين) وهى عبارة عن ثلاثة هرمونات :

الهرمون المحفز لتكوين الحويصلات

يلعب هذا الهرمون دوراً هاماً فى نمو العضاء التناسلية ، وفي نضج البويضات في المبيض والحيوانات المنوية في الخصية .

الهرمون المحفز لتكوين الجسم الأصفر

يساعد هذا الهرمون على انطلاق البوويضات الناضجة من حويصلة جراف كما يساعد في تحفيز الخلايا البينية في الخصية لتكوين الهرمون الذكري تستوستيرون وينظم إفراز كلا الهرمونين المحفزيين للحوصلات ولتكوين الجسم الأصفر هرمون يفرز من تحت المهاد يسمى الهرمون المحرر للهرمونات المنظمة للمناسل.

هرمون البرولاكتين

يحفز هذا الهرمون نمو العدد الثديية ويساعد على إفراز اللبن من الثديين . وفي بعض الثدييات يساعد هذا الهرمون في انطلاق هرمون البروجستيرون من الجسم الأصفر .

وينظم إفراز هرمون البرولاكتين هرمونان يفرزا من تحت المهاد حيث يزيد أحدهما من إفراز البرولاكتين ويسمى الهرمون المحفز لإطلاق البرولاكتين ، والآخر يقلل من إفراز البرولاكتين ويسمى الهرمون المثبط لإطلاق البرولاكتين .

هرمون النمو

ينظم الهرمون نمو عضلات الجسم وأيضاً العظام ، ولذلك فهو يلعب دوراً هاماً في بناء الجسم . ومن هنا يزيد إفراز هذا الهرمون في مرحلة الطفولة ، وعلى ذلك فنقص إفراز هذا الهرمون أثناء نمو الطفل يسبب تأخر نمو العظام والعضلات ، وتعرف هذه الحالة بالقزامة . وعكس ذلك زيادة إفراز هذا الهرمون عن المعدل الطبيعي في مرحلة الطفولة يؤدي إلى العمقة . أما زيادة إفراز هرمون النمو عند الكبار فيسبب تضخم اليدين والقدمين ويعرف ذلك بالأكترومجل . ويتحكم في إفراز هذا الهرمون هرمونان يفرزان من منطقة تحت المهاد حيث يزيد أحدهما من إفراز هرمون النمو والأخر يقل من إفرازه .

وتتجدر الإشارة إلى أن الفص الأوسط للغدد النخامية في الحيوانات الفقارية الأقل تطوراً (الأسماك والبرمائيات والزواحف) ينتج هرموناً يسمى الهرمون المحفز لحاملات الصبغ الأسود الميلانين داخل الخلايا الصبغية ، ولذا فهذه الحيوانات لها المقدرة على محاكاة لون

الوسط المحيط

هرمونات الجزء النخامي العصبي

كما أشرنا سابقاً فإن هرمونات هذا الجزء من الغدة النخامية مصدرها خلايا عصبية موجودة في منطقة تحت المهاد وتصل هذه الهرمونات إلى الفص الخلفي من الغدة النخامية من خلال الألياف العصبية . ومن الثابت وجود هرمونين يفرزهما تحت المهاد ويخرزان في الجزء النخامي العصبي وهذا الهرمونان هما :

الهرمون المضاد لإدرار البول

يسbib هذا الهرمون زيادة مقدرة الكلية على إعادة امتصاص الماء ، وذلك من خلال تأثيره على نفاذية أغشية خلايا الأنبيوبات المختلفة البعيدة وفرعى هنلى فى الوحدات البولية داخل الكلية . ولذا عند نقص كمية الماء فى الدم تتأثر منطقة تحت المهاد فى الدماغ وهذا يسبب زيادة إفراز هذا الهرمون ، والذى يحمله الدم إلى الكليتين فيزيد معدل امتصاص الماء هنا يقل حجم البول . وعلى العكس من ذلك فعند زيادة حجم الماء الذى يتناوله الفرد تزيد تبعاً لذلك كمية الماء وينتج عن ذلك نقص كمية الهرمون مما يؤدى إلى نقص إعادة امتصاص الماء فى الكلية وهنا تكون النتيجة إدرار كمية

كبيرة من البول . ومن الملاحظ أن زيادة هذا الهرمون عن المعدل في الدم تعمل على انقباض العضلات الملساء للشرابين مما يسبب ارتفاع ضغط الدم ، ومن هنا يطلق عليه أيضاً اسم الهرمون الضاغط للأوعية (فازوبرسين) .

هرمون الأوكسي توسين

من الثابت الآن أن هذا الهرمون يلعب دوراً هاماً في انطلاق اللبن من ثدي الأم أثناء عملية الرضاعة هذا بالإضافة لدوره في تسهيل عملية الولادة حيث يسبب تقلص عضلات الرحم ، ومن هنا يتم حقن هذا الهرمون في حالات الولادة المتعسرة .

الغدة الصنوبرية

الغدة الصنوبرية مخروطية الشكل وتقع في البطين الدماغي الثالث داخل الدماغ ، وتقرز هذه الغدة هرمون بيتيدى يسمى الميلاتونين وعديد من المواد الأخرى الشبيهة . ومن وظائف هذا الهرمون أنه يساعد على النوم ، هذا بالإضافة إلى أنه يؤثر في إفراز الهرمونات المنظمة للمناسل من الجزء النخامي الغدي ، وأيضاً

تثبيط عملية التبويض في المبيض ، وذلك من خلال تثبيط إفراز الهرمون المحرر للهرمونات المنظمة للمناسل من منطقة تحت المهاد . ومن ثالث أن إفراز هرمون الميلاتونين يتوقف على وجود الضوء في البيئة حيث يزيد إفرازه عندما يقل الضوء ، بينما يقل إفرازه عند زيادة كمية الضوء .

الغدة الدرقية

ت تكون الغدة الدرقية من فصين يتصلان معًا بواسطة بربخ وتوجد على القصبة الهوائية أسفل الحنجرة ، وتنزن في الإنسان البالغ حوالي 25 جراماً . وبفحص قطاع عرضي في الغدة بالمجهر الضوئي نجد أنها تشتمل على حويصلات عديدة ، وجدار هذه الحويصلات عبارة عن نسيج طلائى يختلف شكل خلاياه بين المكعب والعمودى ، وذلك طبقاً لنشاط الغدة ويوجد بين الحويصلات نوع آخر من الخلايا تسمى خلايا ج . وتقوم الخلايا المكونة للحويصلات بإنتاج هرمونين من الحامض الأميني التيروسين بربطه مع اليود . وهذا الهرمونات هما الثيروكسين وثلاثي أيدو

الثيرونين ، بينما تنتج الخلايا الموجودة بين الحويصلات هرمون آخر يسمى الكالسيتونين .

وظائف هرمون التيروكسين وثلاثي أيدوالتيلورونين

كلا الهرمونين له دور هام في تنشيط عمليات الأيض في جميع خلايا الجسم ، ومن هنا فإن الوظيفة الأساسية لهما تكون مرتبطة بعمليات النمو بصفة عامة والجهاز العصبي بصفة خاصة . ويبدو هذا واضحًا عند نقص إفراز الغدة الدرقية في الأطفال فيؤدي هذا النقص إلى إعاقة النمو ، ولو لم يتم تدارك ذلك مبكراً فقد ينتج إنسان قزم مختلف عقلياً . أما في حالة نقص نشاط الغدة عند الكبار فتظهر اعراض مرض الميكسيديميا ، ومن أهم اعراضه أن الجلد يصبح سميكًا وينتفخ الوجه بسبب تراكم سوائل الجسم تحت الجلد وبطء في ضربات القلب ، وقد تكون هناك زيادة في وزن الجسم .

أما زيادة نشاط الغدة الدرقية فيؤدي إلى تضخمها حيث يظهر ورم في منطقة الرقبة أسفل الحنجرة ويعرف بالورم الدرقي ، علماً بأن هذا الورم قد يظهر يسبب نقص إفراز الغدة . وغالباً ما يكون راجعاً لنقص كمية اليود في الجسم ويعرف بالورم الدرقي يسبب نقص اليود ، وتعالج مثل هذه الحالة بتناول أقراص

تحتوى على اليود ، ومن توصيات هيئة الصحة العالمية الآن استخدام ملح الطعام المضاف إليه اليود بدلاً من ملح الطعام العادى . ولكنفى حالة الورم الدرقى نتيجة زيادة إفراز الغدة الدرقية والذى يسبب زيادة معدل الأيض عن المستوى资料的文本内容是关于甲状腺功能亢进症的治疗。它指出，世界卫生组织建议在食盐中添加碘以替代普通盐，因为碘可以减少甲状腺激素的分泌。文章还提到，如果通过手术切除大部分甲状腺后，剩余的甲状腺功能不足以满足身体需求时，可能会出现低碘症状。

وكما أشرنا سابقاً فإن هناك هرموناً محفزاً للغدة الدرقية ينطلق من الغدة النخامية (الفص النخامي الغدي) يتحكم في تصنيع وتحرير الثيروكسين وتلاثي أيدو الثيروتين من الغدة الدرقية ، فإذا انخفض مستواهما في الدم تتحرر كمية أكبر من الهرمون المحفز للغدة الدرقية أما ارتفاعهما في الدم فيعمل على ثبيط تحرر الهرمون المحفز للدرقية . أيضاً فإن تحرير الهرمون المحفز للدرقية من الغدة النخامية يتحكم فيه هرمون يفرز بواسطة تحت المهاد وهو المعروف باسم **الهرمون المحرر للهرمون المحفز للغدة الدرقية** .

وظيفة هرمون الكالسيتونين

هرمون الكالسيتونين يفرز من خلايا ج المنتشرة بين حويصلات الغدة الدرقية ، ولقد وجد أن إفراز هذا الهرمون يزيد بزيادة مستوى الكالسيوم في الدم عن المعدل الطبيعي حيث يعمل هرمون الكالسيتونين على تخفيض مستوى الكالسيوم في الدم من خلال تأثيره المباشر على الخلايا الأكولة في العظام لتقليل نشاطها وعلى ذلك يزداد ترسيب الكالسيوم في العظام .

الغدة الجاردرقية

يوجد على السطح الظهرى للغدة الدرقية أربع غدد يطلق عليها الغدد الجاردرقية والوظيفة الأساسية لهذه الغدة هي إنتاج هرمون يسمى هرمون الغدة الجاردرقية ويعمل هذا الهرمون على الحفاظ على المستوى الطبيعي للكالسيوم في الدم وإزالة هذه الغدد زالى قد يحدث بطريق الخطأ عند إزالة جزء من الغدة الدرقية يؤدي إلى نقص سريع في مستوى الكالسيوم في الدم والذي يؤدي بدوره إلى تقلصات عضلية وحالة تشنج عضلى مما يؤدي في النهاية إلى الموت .

وهرمون الغدة الجاردرقية يعمل على رفع مستوى الكالسيوم في الدم وذلك في حالة نقصانة قليلا عن المعدل الطبيعي من خلال

تحفيز الخلايا الأكولة في العظم ، حيث يؤدي نشاط هذه الخلايا إلى تأكل العظام المجاورة لها وبالتالي يتحرر كل من الكالسيوم والفوسفات . ومن هنا فلو زاد مستوى الكالسيوم عن المعدل الطبيعي يقل نشاط الغدد الجاردرقية ، وعلى ذلك يقل إفرازها . وحيث إن عمل هرمون الكالسيتونين معاكس لعمل هرمون الغدة الجاردرقية فهنا يمكن القول أن الهرمونات يعملان معًا لحفظ مستوى الكالسيوم في الدم حول معدله الطبيعي .

وهنا تجدر الإشارة إلى علاقة فيتامين د ومستوى الكالسيوم في الدم حيث يتحول هذا الفيتامين من خلال اكسدة ثنائية الخطوات إلى مركب يسمى 1,25 ثنائي هيدروكسي فيتامين د وهذا المركب له دوراً هاماً في عملية امتصاص الكالسيوم في منطقة الأمعاء بواسطة الأنقال النشط وكما أشرنا سابقاً فإن نقص فيتامين د يسبب مرض الكساح وخاصة عند الأطفال .

الغدة الكظرية (الغدة فوق الكلوية)

غدة الكظر في الفقاريات عبارة عن غدة مزدوجة تقع كل واحدة منها قريباً من الكلية أو فوقها وتتكون كل غدة من طبقتين الخارجية تعرف باسم القشرة والداخلية تسمى النخاع وهاتان

الطبقتان تختلفان من حيث النشأة الجنينية حيث تنشأ طبقة القشرة من الميزودرم بينما تنشأ طبقة النخاع من الأكتودرم وكل طبقة تفرز الهرمونات الخاصة بها ، هذا بالإضافة إلى أن وظيفة القشرة تكون تحت سيطرة الغدة النخامية بينما وظيفة النخاع يتحكم فيها الجهاز العصبي السمبتوسي .

هرمونات قشرة الغدة الكظرية

هرمونات قشرة الغدة الكظرية عبارة عن ستيرويدات وتنقسم طبقاً لوظائفها إلى ثلاثة مجموعات هي :

هرمونات القشرة الخاصة للسكريات

ومن أشهرها الكورتيزون والكورتيكوسเตروئون وهذه المجموعة من الهرمونات لها تأثيراتها الهامة على عمليات الأيض واصةً أيضًا المواد الكربوهيدراتية حيث تسبب هذه الهرمونات تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية وبالتالي يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم ، أيضًا هذه الهرمونات تؤدي دوراً هاماً كمركيبات مضادة للالتهابات ولذا تستخدم في علاج العديد من الأمراض المصحوبة بالالتهابات ولكن يجب استخدامها بعناية فائقة تحت إشراف طبي .

هرمونات القشرة الخاصة بالمعادن

ومن أهم هرمونات هذه المجموعة هرمون الألدوستيرون . ومن أهم وظائفه الحفاظ على توازن المعادن في الجسم وذلك من خلال تنظيم إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والكلوريد في الأنبيوبات البولية في الكلية ، وأيضاً عملية إخراج البوتاسيوم بواسطة الكليتين . ومن هنا يمكن القول أن هذه المجموعة من الهرمونات تعمل على الحفاظ على المستوى الصحيح لهذه الأيونات في الدم .

هرمونات الجنس

تشمل هذه المجموعة من الهرمونات التستوستيرون والأستروجين والبروجستيرون . وفي الواقع فإنها تفرز بكميات ضئيلة من قشرة غدة الكظر ولكن مصدرها الرئيسي في الجسم المناسب . وقد يسبب تضخم غدة الكظر بعض الحالات المرضية في الإنسان . (وسوف تذكر وظائف هذه الهرمونات مع عمل المناسب كعده صماء) .

وكما أشرنا سابقاً فإن قشرة غدة الكظر تعمل تحت سيطرة الغدة النخامية حيث يفرز هرمونات محفز لقشرة

الغدة الكظرية والذى يزيد إفرازه من الجزء النخami
الغدى عند انخفاض مستوى هرمونات قشرة الغدة
الكظرية فى الدم ، وذلك لتحفيزها على إنتاج هرموناتها
بينما ينخفض إفراز هذا الهرمون المحفز من الغدة
النخامية عند ارتفاع مستوى هرمونات قشرة الغدة
الكظرية .

هرمونات نخاع الغدة الكظرية

يفرز نخاع الغدة الكظرية هرمونى هما الإدريناлиين (ويعرف أيضًا باسم الإبينفرين) ، والنورأدريناлиين (ويعرف أيضًا باسم النور أبنفرين) . والهرمونات ينتميان من حيث التركيب الكيميائى إلى مجموعة تعرف باسم الكاتيكولامينات والتى يتم تصنيعها فى خلايا نخاع
الغدة الكظرية من الحامض الأمينى التيروسين .

وتطلق خلايا النخاع هذين الهرمونين فى الدم بنسبة 80% أدريناлиين و20% نورأدريناлиين ، وعمل هرمونين متشابه إلى حد كبير ويدور حول وظائف الأعضاء الداخلية فى حالات الطوارئ ، والتى يوضع بها الجسم مثل الخوف والإثارة والقتال والهروب ، فكلا الهرمونين يعمل على زيادة سرعة نبض القلب ،

وأيضاً تقلص العضلات الملساء في العديد من الأوعية الدموية ، بينما يسبب ارتخاء العضلات في الأوعية الدموية المغذية للعضلات الهيكلية ، أى يسبب اتساع الأوعية الدموية في العضلات الإيرادية . ويعمل هرمون الإدرينيالين على رفع نسبة السكر في الدم من خلال تأثيره على تحويل جليكوجين الكبد إلى الجلوكوز . ومن كل ما تقدم يمكن القول ان هرمونى الإدرينيالين والنور إدرينيالين يعملان على تهيئة الجسم لمجابهة أى حالة من الحالات الطارئة حيث يعملان على زيادة سرعة نبض القلب وزيادة ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر فيه ، ويساعدان عضلات الجسم على الحصول على الطاقة اللازمة للأنقباض مع زيادة استهلاك الأكسجين ويظهر هذا بوضوح أثناء تأدية التمارين الرياضية .

البنكرياس

يعتبر البنكرياس غدة مزدوجة حيث يقوم بإفراز العصارة البنكرياسية التي تصل إلى الإثنى عشر عن طريق القناة البنكرياسية ، وبذلك يلعب دور كغدة قنانية . هذا بالإضافة

لدوره في الجسم كغدة صماء حيث يفرز أيضاً ثلاثة هرمونات التي تصل إلى الدم مباشرةً . ومن هنا فإن دراسة قطاع في البنكرياس توضح وجود نوعين من الخلايا :

خلايا الحويصلات والتي تقوم بإفراز العصارة البنكرياسية الهضمية .

خلايا جزر لانجرهانز وهي عبارة عن ثلاثة أنواع من الخلايا توجد مبعثرة بين خلايا الحويصلات ، وهذه الخلايا هي :

خلايا ألفا وهي المسئولة عن إفراز هرمون الجلوكاجون وهو مركب عديد البيتيد .

خلايا بيتا وتفرز هرمون الانسولين وهو مركب بروتيني .

خلايا دلتا وتفرز هرمون السوماتوستاتين وهو مركب عديد البيتيد .

وظائف هرمونات البنكرياس

الأنسولين

يلعب الأنسولين دوراً هاماً في انتقال جلوكوز الدم إلى خلايا الجسم ، ويظهر هذا الدور عند نقص إفراز

الأنسولين فيؤدى ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر فى الدم ، ويظهر بذلك السكر فى البول ويعرف هذا بمرض السكري وكما هو معروف فإن عدم علاج هذا المرض يؤدى إلى نقص وزن الجسم نتيجة عدم استفادة خلايا الجسم بسكر الدم وتعتمد على الدهون المخزنة فى الحصول على الطاقة .

ومن الثابت أن الأنسولين يساعد فى دخول الجلوكوز إلى الخلايا من خلال سرعة تحويل الجلوكوز إلى فوسفات الجلوكوز . وللأنسولين تأثيرات عديدة مرتبطة بأيضاً الكربوهيدرات والدهون .

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية ، نم عزل الجين المسئول عن تصنيع الأنسولين فى خلايا البنكرياس ، وباستخدام نوع معين من البكتيريا (شيرشيا كولاي) يتم تصنيع واستخلاص الأنسولين الأدمى والذى يستخدم الآن بكفاءة عالية لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع السكر فى الدم نتيجة نقص إفراز هرمون الأنسولين .

الجلوكاجون

يعمل هرمون الجلوکاجون على رفع مستوى جلوكوز الدم وبالتالي فتأثيره مضاد لتأثير الأنسولين على أيض المواد الكربوهيدراتية حيث إن السبب المباشر لزيادة سكر الدم عن طريق هذا الهرمون هو زيادة سرعة تحلل الجليكوجين في الكبد وتحوله إلى جلوكوز ز

وتتأثر إفراز هرمونى الجلوکاجون والأنسولين بمستوى الجلوكوز فى الدم ، فارتفاع مستوى السكر فى الدم يعمل على تثبيط خلايا ألفا لتقليل إفراز هرمون الجلوکاجون وفي نفس الوقت ينبه خلايا بيتا لكي يفرز الأنسولين وينبه خلايا الفا لزيادة إفراز هرمون الجلوکاجون .

السوماتوستاتين

هرمون السوماتوستاتين يعمل على تثبيط إفراز هرمونى الأنسولين والجلوكاجون ومن هنا فإن هذا الهرمون ينطلق من خلايا دلتا استجابة لتناول الطعام .

هرمونات الهضم

بالإضافة لوظيفة الطبقة المخاطية المبطنة للمعدة والأمعاء في إفراز العصارات الهاضمة فإنها تعمل أيضًا كغدة صماء حيث تقوم بإفراز عدد من الهرمونات والتي لها دور أساسى في تنظيم عمليات الهضم المختلفة . ومن أهم الهرمونات التي تفرز من مخاطية المعدة والآماء أربعة هرمونات وجميعها عديدة الببتيدات

الجاسترن

الجاسترن يفرز من مخاطية الجزء البوابي من المعدة عند وصول الطعام إلى المعدة لكي ينبعه الخلايا الجدارية في الغدد المعدية لتحفيزها لإفراز حامض الهيدروكلوريك .

كوليسيستوكينين

هذا الهرمون يفرز من الغشاء المخاطي للأمعاء ويعمل على انقاض الحويصلة المرارية وبذلك يساعد في أنساب العصارة الصفراوية المخزنة بها كي تصل إلى الأمعاء .

بنكريوزيمين

هذا الهرمون يفرز أيضًا من الغشاء المخاطي للأمعاء وينبه البكرياس لإفراز عصارة بنكرياسية غنية بالمحتوى الإنزيمي .

السكرتين

يفرز من الغشاء المخاطي للأمعاء وينبه البنكرياس لإفراز عصارة بنكرياسية غنية بمادة البيكربونات .

هرمونات التكاثر

هرمونات التكاثر تفرز من المناسل وتشمل المبيض في الأنثى والخصية في الذكر . فضلًا لوظيفة المبيض في تكوين البويلضات والخصية في تكوين الحيوانات المنوية فإنها يعملان أيضًا كعدد صماء حيث يقونما بإفراز هرمونات تعرف باسم الهرمونات الجنسية .

المبيض

يفرز المبيض نوعين من هرمونات الجنس الانوثوية وهما الاستروجينات والبروجسترون وهذه الهرمونات عبارة عن استيرويدات والاستروجينات تساعد في نمو الأعضاء التناسلية للأنثى وأيضًا ظهور الصفات

الجنسية الثانوية . اما هرمون البروجسترون فهو مسئول عن إعداد الرحم لاستقبال الجنين كما يساعد على اكتمال نمو الغدد اللبئية لكي تفرو اللبن بعد عملية الولادة .

الخصية

يوجد بين الأنبيوبات المنوية داخل الخصية خلايا تسمى الخلايا البينية وهى التى تقوم بإفراز هرمون الجنس الذكرى التستوستيرون . وهذا الهرمون عبارة عن مركب استيرويدى وهو مسئول عن نمو الأعضاء التناسلية فى الذكر وأيضاً ظهور الصفات الجنسية الثانوية .

وكما أشرنا سابقاً عند دراسة وظائف الغدد النخامية فإن عمل كلا من المبيض والخصية كغدد صماء يتحكم فيه الجزء النخامي الغدى حيث يفرز هذا الجزء الهرمونات المنظمة للماضل والتى تنظم إفراز هرمونات التكاثر منالمبيض والخصية .

هرمونات الكلية

بجانب وظيفة الكلية الأساسية غي عملية الإخراج فمن الثابت الآن أن هناك بعض الهرمونات تفرز من الكلية وهما الأرثروبوبوتين وهرمون الرنين .

الأرثروبوبوتين

الأرثروبوبوتين هرمون جليكوبروتيني يشمل على 166 حامض أميني . وهذا الهرمون يعمل على تحفيز خلايا الجذع في نخاع العظم لكي يتم انقسامها وتحورها لتكوين كريات الدم الحمراء ، والعامل المحفز لإفراز هذا الهرمون هو نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الكليتين والأعضاء الأخرى في الجسم عن المعدل الطبيعي . فعلى سبيل المثال عند إقامة شخص ما في المناطق المرتفعة عن سطح البحر حيث يقل الضغط الجزيئي للأكسجين في الجو عندئذ يزداد معدل تكوين كريات الدم الحمراء لكي تساعده في نقل الأكسجين إلى الخلايا .

هرمون الرنين

هرمون الرنين يفرز من خلايا خاصة تبطن الشريانات الواردة في الوحدات البولية في الكلية والذي ينطلق إلى الدم ويساعد على تحويل مركب بروتيني موجود في البلازم يسمى الأنجيوتنسينوجين إلى الأنجيوتنسين 1، والذي يتم تنشيطه بواسطة إنزيم موجود في الشعيرات الدموية للرئتين لكي يتكون الأنجيوتنسين 2 الذي يعمل بدوره على تنشيط قشرة غدة الكظر لكي ينطلق هرمون الألدوستيرون في الدم.

المراجع

- 1- أحمد حماد الحسيني و أميل شنودة دميان (1977) .
بيولوجية الحيوان العملية الجزء الأول . الناشر دار المعارف - 1119 كورنيش النيل- القاهرة ج . م . ع

2- سعد كمال طه (2010) مبادئ الفسيولوجي "علم وظائف الأعضاء" منتدى مكتبة الاسكندرية. ج . م . ع.

3- محمد أحمد البنهاوي ، اميل شنودة دميان، عبد العظيم عبد الله شلبي و محمد أمين رشدي (1995 م) " علم الحيوان" دار المعارف - 1119 كورنيش النيل – القاهرة – ج. م. ع.

4- محمد اسماعيل محمد ، حلمي ميخائيل بشاي ، يحيى السعيد العاصي ، مني شرقاوي علي و تغريد عبد الرحمن حسن (2002 م) "أساسيات علم الحيوان"
دار الفكر العربي – مدينة نصر – القاهرة – ج . م. ع