

الباب الأول

المعادلات التفاضلية ذات الرتبة الأولى و الدرجة الأولى

مقدمة

المعادلات التفاضلية من الموضوعات الهامة لورودها في كثير العلوم مثل الرياضيات البحتة و التطبيقية وفي الطبيعة و الكيمياء وفي كثير من العلوم الهندسية فكثير من مسائل الانحناء تعتمد في حلها علي المعادلات التفاضلية وكذلك تذبذب الاجسام و الذبذبات الكهربائية وانتقال الحرارة وانتشار الاجسام الذائبة وسرعة التفاعلات الكيميائية.

١.١ تعريف المعادلات التفاضلية

نفرض أن y دالة في المتغير x وأن $y', y'', \dots, y^{(n)}$ المشتقات التفاضلية من الرتبة الأولى و الثانية حتي المشتقة النونية للمتغير y بالنسبة إلي x فإن إي علاقة تربط بين x, y وأحد المشتقات السابقة تسمى "معادلة تفاضلية عادية" أما إذا كانت y دالة في اكثر من متغير ولها مشتقات جزئية فإنها تسمى "معادلة تفاضلية جزئية" ونذكر الان بعض الامثلة المختلفة للمعادلات التفاضلية العادية .

$$\frac{d^2y}{dx^2} + w^2y = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} - \frac{d^2y}{dx^2} - 5x = \cos 2x \quad (2)$$

$$\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + 2yx = 5 \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2y}{\partial x^2} \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2y}{\partial t^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial y}{\partial x} \quad (5)$$

٢.١ رتبة و درجة المعادلة التفاضلية

رتبة المعادلة التفاضلية هي رتبة أعلى مشتقة موجوده في المعادلة التفاضلية. درجة المعادلة التفاضلية هي الاس الذي يرفع الية أعلى معاملي تفاضلي المحدد لرتبة المعادلة. فمثلاً المعادلة (١) هي معادلة من الرتبة الثانية والدرجة الاولى . والمعادلة (٢) من الرتبة الرابعة والدرجة الأولى. والمعادلة (٣) معادلة من الرتبة الثالثة و الدرجة الثانية. والمعادلات (٤)، (٥) معادلات تفاضلية جزئية.

٣.١ تكوين المعادلة التفاضلية

يتم تكوين المعادلة التفاضلية بحذف الثوابت الاختيارية نفرض أن لدينا العلاقة

$$f(x, y, c) = 0 \quad (1)$$

هذه المعادلة تمثل مجموعة المنحنيات المستوية ذات البارامتر الواحد وبتفاضل العلاقة (١) بالنسبة

إلي x نحصل علي معادلة تحتوي علي x, y, y', c ولتكن

$$\phi(x, y, y', c) = 0 \quad (2)$$

وبحذف c من (١) ، (٢) نحصل علي علاقة في الصورة

$$\psi(x, y, y') = 0 \quad (3)$$

و العلاقة (٣) هي معادلة تفاضلية عادية من الرتبة الاولى حصلنا عليها نتيجة لحذف ثابت اختياري واحد وتسمى هذه المعادلة بالمعادلة التفاضلية لمجموعة المنحنيات (١) .

ولتوضيح ذلك نعتبر المثال الاتي

$$y^2 = 4a(x - c)$$

فهذه المعادلة تمثل مجموعة من القطاعات المكافئة التي محورها المحور السيني و وترها البؤري العمودي $4a$. بالتفاضل نحصل علي

$$y \frac{dy}{dx} = 2a$$

وهذه هي المعادلة التفاضلية لمجموعة القطاعات المكافئة.

وفي الحالة العامة اذا اعتبرنا العلاقة

$$f(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \quad (4)$$

وهذه العلاقة تحتوي علي n من البارامترات c_1, c_2, \dots, c_n . للحصول علي المعادلة التفاضلية المناظرة نفاضل هذه العلاقة n من المرات المتتالية بالنسبة الي x فنحصل علي n من العلاقات في الصورة

$$\left. \begin{array}{l} \phi_1(x, y, y', c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \\ \phi_2(x, y, y', y'', c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \phi_n(x, y, y', \dots, y^{(n)}, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \end{array} \right\} \quad (5)$$

من العلاقات (٤)، (٥) وعددها $n+1$ يمكن حذف الثوابت c_1, c_2, \dots, c_n وتكون النتيجة هي الحصول علي معادلة تفاضلية عادية ورتبتها n علي الصورة

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

مثال (١) كون المعادلة التفاضلية لمجموعة المنحنيات

$$c_1 x + (y - c_2)^2 = 0 \quad (1)$$

الحل

حيث ان معادلة مجموعة المنحنيات تحتوي علي بارا مترين فإننا نفاضل مرتين باعتبار ان

$$c_1 + 2(y - c_2)y' = 0 \quad (2)$$

$$2y'^2 + 2(y - c_2)y'' = 0 \quad (3)$$

بحذف C_1 من المعادلة (٢) نحصل علي

$$c_1 = -2(y - c_2)y' \quad (4)$$

نعوض من (٤) في (١) نجد ان

$$-2xy'(y - c_2) + (y - c_2)^2 = 0 \quad (5)$$

بحذف C_2 من المعادلة (٣) نحصل علي

$$y - c_2 = -y'^2 / y'' \quad (6)$$

بالتعويض من (٦) في (٥) نحصل علي المعادلة التفاضلية المطلوب وهي

$$y' + 2xy'' = 0$$

مثال(٢): أوجد المعادلة التفاضلية للقطاعات المكافئة الرأسية المحور.

الحل

المعادلة التفاضلية للقطاعات المكافئة الرأسية المحور هي

$$x^2 = \alpha x + \beta y + c$$

و حيث ان هذه المعادلة تحتوي علي ثلاث ثوابت α, β, C . بالتالي نفاضل ثلاث مرات متتالية

$$2x = \alpha + \beta \frac{dy}{dx}, \quad 2 = \beta \frac{d^2 y}{dx^2}, \quad 0 = \beta \frac{d^3 y}{dx^3}$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 0 \quad \text{المعادلة التفاضلية المطلوبة هي}$$

مثال (٣) إذا كانت

$$y = ae^{2x} + be^{-x} \quad (1)$$

فاثبت إن

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

الحل

بالتفاضل نجد أن

$$\frac{dy}{dx} = 2ae^{2x} - be^{-x} \quad (2)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4ae^{2x} + be^{-x} \quad (3)$$

بجمع (١) ، (٢) نجد أن

$$\frac{dy}{dx} + y = ae^{2x}$$

وبجمع (٢) ، (٣) ينتج أن

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 6ae^{2x}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{dy}{dx} + y\right)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$$

وهو المطلوب.

٤.١ حل المعادلات التفاضلية

حل المعادلة التفاضلية هو عملية الحصول علي الأصل الكامل للمعادلة التفاضلية إي عملية عكس عملية

تكوين المعادلة و التي درسناها. ويمكن تقسيم هذه المعادلات من حيث طرق حلها إلي الانواع الآتية

١. المعادلات التفاضلية ذات المتغيرات القابلة للانفصال.

٢. المعادلات التفاضلية المتجانسة.

٣. المعادلات التفاضلية ذات المعاملات الخطية.

٤. المعادلات التفاضلية التامة.

٥. المعادلات التفاضلية الخطية.

٦. معادلات برنولي.

٧. معادلات ريكاتي.

و سوف ندرس كل نوع علي حدة

١.٤.١ المعادلات التفاضلية ذات المتغيرات القابلة للانفصال

يمكن كتابة المعادلات التي يمكن فيها فصل المتغيرات علي الشكل الاتي

$$M(x)dx + N(y)dy = 0 \quad (1)$$

$$M(y)dx + N(x)dy = 0 \quad (2)$$

و المعادلة (٢) يمكن تحويلها إلي صورة المعادلة (١) وذلك بالقسمة علي $N(x)M(y)$ أي

$$\frac{dx}{N(x)} + \frac{dy}{M(y)} = 0$$

و هذا النوع من المعادلات يمكن حلها بإجراء التكامل مباشرة.

مثال (١) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$x\sqrt{y^2-1}dx + y\sqrt{x^2-1}dy = 0 \quad (1)$$

الحل

بالقسمة علي $\sqrt{x^2-1}\sqrt{y^2-1}$ نحصل علي

$$\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}dx + \frac{y}{\sqrt{y^2-1}}dy = 0$$

وبتكامل هذه المعادلة نحصل علي

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{x^2-1}} + \int \frac{ydy}{\sqrt{y^2-1}} = c$$

$$\sqrt{x^2-1} + \sqrt{y^2-1} = c$$

وهي تمثل الحل العام للمعادلة التفاضلية (١).

مثال (٢) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$xy^3 \frac{dy}{dx} = 1 - x^2 + y^2 - x^2y^2 \quad (1)$$

الحل

نضع المعادلة علي الصورة

$$xy^3 \frac{dy}{dx} = (1-x^2) + y^2(1-x^2) \Rightarrow xy^3 \frac{dy}{dx} = (1-x^2)(1+y^2)$$

$$xy^3 dy = (1-x^2)(1+y^2) dx$$

بقسمة طرفي المعادلة علي $x(1+y^2)$

$$\frac{y^3}{1+y^2} dy = \frac{1-x^2}{x} dx$$

وبالتكامل نحصل علي

$$\int \frac{y^3}{1+y^2} dy = \int \frac{1-x^2}{x} dx + c, \quad \int (y - \frac{y}{y^2+1}) dy = \int \frac{dx}{x} - \int x dx + c$$

$$\frac{y^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(y^2+1) = \ln x - \frac{x^2}{2} + c, \quad x^2 + y^2 = 2 \ln(x \sqrt{y^2+1}) + c$$

وهذا يمثل الحل العام للمعادلة التفاضلية (١)

مثال (٣) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} = (8x + 2y + 1)^2 \quad (1)$$

الحل: بوضع $u = 8x + 2y + 1$

ثم بالتفاضل بالنسبة إلي x نحصل علي

$$u' = 8 + 2y', \quad y' = \frac{1}{2}(u - 8)$$

بالتعويض عن قيمة y' في المعادلة (١) نحصل علي

$$u' - 8 = 2u^2, \quad \frac{du}{dx} = 2u^2 + 8$$

بالتكامل نحصل علي

$$\int \frac{du}{u^2 + 4} = 2 \int dx + c, \quad \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{u}{2} = 2x + c$$

الحل العام للمعادلة التفاضلية هي

$$\tan^{-1} \frac{8x + 2y + 1}{2} = 4x + c$$

٢.٤.١ المعادلات التفاضلية المتجانسة

يقال للدالة $f(x, y)$ إنها متجانسة من درجة n إذا امكن وضعها علي الصورة

$$f(x, y) = x^n f\left(\frac{y}{x}\right), \quad f(x, y) = x^n g\left(\frac{y}{x}\right)$$

حيث g دالة للمتغير $\frac{y}{x}$.

ويقال للمعادلة التفاضلية الآتية

$$f(x, y)dx + g(x, y)dy = 0$$

إنها متجانسة إذا كانت كل من الدالتين $f(x, y), g(x, y)$ متجانسة من نفس الدرجة أي إن

$$f(x, y) = x^n \phi\left(\frac{y}{x}\right), \quad g(x, y) = x^n \psi\left(\frac{y}{x}\right)$$

المعادلة السابقة تكون علي الصورة

$$\phi\left(\frac{y}{x}\right)dx + \psi\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0 \quad (1)$$

ويمكن تحويل هذه المعادلة إلي معادلة من النوع الأول أي ذات متغيرات قابلة للانفصال وذلك بفرض أن

$$z = \frac{y}{x}, \quad y = xz, \quad \frac{dy}{dx} = x \frac{dz}{dx} + z$$

وبوضع المعادلة (١) علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\phi(\frac{y}{x})}{\psi(\frac{y}{x})}, \quad x \frac{dz}{dx} + z = -\frac{\phi(z)}{\psi(z)}$$

$$x \frac{dz}{dx} = -\left[z + \frac{\phi(z)}{\psi(z)} \right]$$

وهذه معادلة قابلة للانفصال يمكن حلها كما سبق

مثال (١) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$(x^2 - y^2)dx + 2xydy = 0, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

ويوضع $y = xz$ نجد أن

$$x \frac{dz}{dx} + z = \frac{z^2 - 1}{2z}, \quad x \frac{dz}{dx} = -\frac{1 + z^2}{2z}$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\int \frac{2z}{1+z^2} dz, \quad \ln x + \ln c = -\ln(1+z^2)$$

$$x(1+z^2) = c, \quad x\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) = c$$

$$x^2 + y^2 - cx = 0$$

وهي معادلة مجموعة من الدوائر نصف قطرها C .

مثال (٢) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$(2ye^{\frac{y}{x}} - x) \frac{dy}{dx} + 2x + y = 0$$

الحل : يمكن كتابة المعادلة السابقة علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y}{x - 2ye^{\frac{y}{x}}}$$

نضع $y = zx$ نجد أن

$$z + x \frac{dz}{dx} = \frac{2+z}{1-2ze^z}, \quad x \frac{dz}{dx} = \frac{2(1+z^2e^z)}{1-2ze^z}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{1-2ze^z}{2(1+z^2e^z)} dz, \quad 2\ln x = \int \frac{e^{-z} - 2z}{e^{-z} + z^2} dz$$

$$2\ln x = -\ln(z^z + e^{-z}) + \ln c, \quad x^2(z^z + e^{-z}) = c$$

$$x^2\left(\frac{y^2}{x^2} + \frac{y}{e^x}\right) = c, \quad y^2 + x^2e^{-\frac{y}{x}} = c$$

مثال (3) أوجد الحل العام المعادلة التفاضلية

$$xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y'$$

الحل

$$y' = \sqrt{1 - \frac{y^2}{x^2}} + \frac{y'}{x}$$

نضع $y = zx$ أي إن

$$y' = xz' + z, \quad xz' + z = \sqrt{1 - z^2} + z$$

$$xz' = \sqrt{1 - z^2}, \quad \int \frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\sin^{-1} z = \ln cx, \quad y = x \sin \ln cx$$

٣.٤.١ المعادلات التفاضلية ذات المعاملات الخطية.

المعادلات التفاضلية ذات المعاملات الخطية تكون علي كصورة الآتية

$$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0 \quad (1)$$

أو تكتب علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$$

وهذه المعادلات ذات المعاملات الخطية يمكن تحويلها إلي

(١) معادلات متجانسة.

(٢) معادلات ذات متغيرات قابلة للانفصال.

أولاً: المعادلات ذات المعاملات الخطية والتي يمكن تحويلها إلي معادلات متجانسة.

في هذه الحالة المستقيمان

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad , \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

يتلاقيان في نقطة ولتكن (α, β) وهذا يعني إن محدد المعاملات لا يساوي الصفر.

نضع $x = u + \alpha$, $y = y + \beta$. فيكون $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dv}$. والمعادلة (١) تصبح

$$\frac{dv}{du} = \frac{a_1u + b_1y}{a_2u + b_2y}$$

وهذه معادلة تفاضلية متجانسة فيمكن حلها كما سبق.

ثانياً: معادلات يمكن تحويلها إلي متغيرات منفصلة

ففي هذه الحالة يكون محدد المعاملات يساوي الصفر أي أن $a_1b_2 = a_2b_1$ والمستقيمان

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad , \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

يكونان متوازيان ويكون

$$a_1x + b_1y = \alpha(a_2x + b_2y)$$

نضع

$$u = a_1x + b_1y, \quad \frac{du}{dx} = a_1 + b_1 \frac{dy}{dx}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{b_1} \left(\frac{du}{dx} - a_1 \right)$$

والمعادلة (١) تصبح

$$\frac{1}{b_1} \left(\frac{du}{dx} - a_1 \right) = \frac{u + c_1}{\alpha u + c_2}$$

وهذه معادلة ذات متغيرات قابلة للانفصال فيمكن حلها كما سبق.

مثال (١) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$(2x - y + 4)dy + (x - 2y + 5)dx = 0$$

الحل

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

نلاحظ أن محدد المعاملات

وبالتالي المعادلة يمكن تحويلها إلي معادلة متجانسة.

أولا: نوجد نقطة التقاطع للمستقيمين

$$2x - y + 4 = 0, \quad x - 2y + 5 = 0$$

وهي $(-1, 2)$ باستخدام التعويض

$$x = u - 1, \quad y = v + 2$$

$$dx = du, \quad dy = dv$$

المعادلة تصبح علي الصورة

$$(2u - 2 - v - 2 + 4) + (u - 1 - 2v - 4 + 5)du = 0$$

باستخدام التعويض $v = uz$

$$\frac{dv}{du} = z + u \frac{dz}{du}, \quad (2 - z)(z + u \frac{dz}{du}) + (1 - 2z) = 0$$

$$2z' + 2v \frac{dz}{du} - z^2 - uz \frac{dz}{du} + 1 - 2z = 0, \quad u(2 - z) \frac{dz}{du} = z^2 - 1$$

$$\frac{2 - z}{z^2 - 1} dz = \frac{1}{u} du, \quad \left(\frac{1}{2(z - 1)} - \frac{3}{2(z + 1)} \right) dz = \frac{1}{u} du$$

$$\frac{1}{2} \ln(z - 1) - \frac{3}{2} \ln(z + 1) = \ln u + \ln c, \quad \ln \frac{z - 1}{(z + 1)^3} = 2 \ln cu$$

بالتعويض عن قيم v, u نحصل علي

$$\frac{y - x - 3}{(y + x - 1)^3} = c$$

مثال (٢) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$(2x - 4y + 5) \frac{dy}{dx} + x - 2y + 3 = 0$$

الحل : نلاحظ إن محدد المعاملات يساوي الصفر

نضع

$$x - 2y = u, \quad 1 - 2 \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{du}{dx} \right)$$

المعادلة تصبح علي الصورة

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{du}{dx} = - \frac{u + 3}{2u + 5}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{4u + 11}{2u + 5}$$

$$\int dx = \int \frac{2u + 5}{4u + 11} du = \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{4u + 11} \right) du$$

$$2x + \frac{c}{4} = u - \frac{1}{4} \ln(4u + 11), \quad 8x + c = 4x - 8y - \ln(4x - 8y + 11)$$

$$4x + 8y + \ln(4x - 8y + 11) + c = 0$$

٤.٤.١ المعادلات التفاضلية الكاملة (التامة)

يقال للمعادلة التفاضلية الآتية :

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

أنها كاملة (تامة) إذا تحقق للدالتين M, N المتصلتين العلاقة

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2)$$

حيث كل من $\frac{\partial M}{\partial y}$, $\frac{\partial N}{\partial x}$ دالة متصلة وبذلك يكون الطرف الأيسر للمعادلة (١) عنصراً تفاضلياً تاماً

لدالة ما $f(x, y)$ بالنسبة للمتغيرين x, y أي أن

$$df(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

والشرط الضروري و الكافي لذلك هو إن تحقق العلاقة (٢).

اولاً: لإثبات ان الشرط الضروري

نفرض إن الطرف الأيسر للمعادلة (١) يمثل تفاضلاً تاماً للدالة $f(x, y)$

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

و بمقارنة المعاملات نحصل علي

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) \quad (3)$$

وبتفاضل العلاقة الأولى من (٣) بالنسبة إلي y و الثانية بالنسبة إلي x نحصل علي

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial M}{\partial y} , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

وبمعني ذلك أنه إذا كانت المعادلة التفاضلية (١) تامة فإنه الشرط (٢) يجب أن يتحقق أي أن هذا الشرط ضروري.

ثانياً: لإثبات ان الشرط الكافي

نفرض إن العلاقة (٢) صحيحة ويكون المطلوب أثبات أن المعادلة التفاضلية (١) تكون تامة أي أن توجد

دالة $f(x, y)$ وبحيث يكون

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) \quad (4)$$

و العلاقة الأولى في (٤) تحقق إذا كان

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + \phi(y) = \psi(x, y) + \phi(y) \quad (5)$$

حيث $\phi(y)$ دالة اختيارية لا تحتوي علي x

وبتفاضل العلاقة (٥) بالنسبة إلي y نجد ان

$$N = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \psi}{\partial y} + \phi'(y) \quad (6)$$

ومن العلاقة (٦) نحصل علي $\phi(y)$ وذلك بالتكامل بالنسبة إلي y و بالتعويض في العلاقة (٥)

عن $\phi(y)$ وبذلك تتعين الدالة $f(x, y)$ تماماً وهذا يثبت أن الشرط كافي.

مثال (١) اثبت أن المعادلة التفاضلية الآتية تامة و أوجد أصلها التام.

$$(2y^2 + 4xy - x^2)dx + (2x^2 + 4xy - y^2)dy = 0 \quad (1)$$

الحل : نفرض أن

$$M(x, y) = 2y^2 + 4xy - x^2, \quad N(x, y) = 2x^2 + 4xy - y^2$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 4y + 4x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 4x + 4y$$

$$\therefore \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2)$$

المعادلة تامة

نفرض أن حل المعادلة علي الصورة

$$f(x, y) = c$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M = 2y^2 + 4xy - x^2 \quad (3)$$

بتكامل المعادلة (٣) بالنسبة إلي x

$$f(x, y) = 2y^2x + 2x^2y - \frac{x^3}{3} + \phi(y) \quad (4)$$

وبتفاضل العلاقة (٤) بالنسبة إلى y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N = 2x^2 + 4xy - y^2 = 4xy + 2x^2 + \phi'(y)$$

$$\phi'(y) = -y^2(y), \quad \phi(y) = -\frac{y^3}{3} + c$$

$$f(x, y) = 2y^2x + 2x^2y - \frac{x^3}{3} - \frac{y^3}{3} = c$$

مثال (٢) أوجد الحل العام المعادلة التفاضلية

$$(\cos x e^{\sin x} + \sin y \cos x) dx + \cos y \sin x dy = 0 \quad (1)$$

الحل بوضع

$$M = \cos x e^{\sin x} + \sin y \cos x$$

$$N = \sin x \cos y$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cos y \cos x \quad (2)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \cos x \cos y \quad (3)$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

بالتالي المعادلة تامة

نفرض أن حل المعادلة علي الصورة

$$f(x, y) = c$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M = \cos x e^{\sin x} + \sin y \cos x \quad (4)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N = \sin x \cos y \quad (5)$$

بتكامل العلاقة (٤) بالنسبة إلى x نحصل علي

$$f(x, y) = -e^{\sin x} + \sin x \sin y + \phi(y) \quad (6)$$

و بتفاضل هذه العلاقة بالنسبة إلى y نجد أن

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \sin x \cos y + \phi'(y) \quad (7)$$

من (٥)، (٧) نحصل علي

$$\sin x \cos y = \phi'(y) + \sin x \cos y$$

$$\phi'(y) = 0, \quad \phi(y) = c$$

بالتعويض في المعادلة (٦) عن قيم $\phi(y)$

$$f(x, y) = e^{\sin x} + \sin x \sin y + c$$

العوامل المكاملة

إذا كانت المعادلة التفاضلية التي من الدرجة الأولى والرتبة الأولى

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

غير تامة أي يكون

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

فإن يمكن تحويلها إلى معادلة تامة وذلك بضربها في عامل مكامل M والعامل المكامل M يكون غالباً دالة في (x, y) ولكن الحصول علي العامل المكامل في الحالة العامة هي مسألة رياضية غير بسيط لذلك سوف نعتبر أن M دالة في y فقط أو M دالة في y فقط.

بضرب المعادلة (١) في العامل المكامل $M(x, y)$ لكي تصبح تامة وبذلك يكون

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0. \quad (2)$$

المعادلة (٢) أصبحت تامة إذا يكون

$$\frac{\partial x}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N)$$

$$M \frac{\partial \mu}{\partial y} - N \frac{\partial \mu}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = 0 \quad (3)$$

ومن هذه المعادلة يتعين العامل المكاملة μ كدالة في x, y

أولا : شرط وجود عامل مكامل دالة في x فقط.

نفرض أن المعادلة (١) لها عامل مكامل $\mu = \mu(x)$ وبذلك تصبح المعادلة (٣) علي الصورة

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right), \quad \frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

واضح أن الطرف الأيسر للمعادلة الأخيرة دالة في x فقط وبذلك فإن الطرف الأيمن دالة في x فقط .

الشرط الضروري والكافي كي يكون للمعادلة (١) عامل مكامل دالة في x فقط هو أن يكون المقدار

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \text{ دالة في } x \text{ فقط .}$$

$$\frac{1}{\mu} d\mu = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx$$

وبالتكامل يكون

$$\ln \mu(x) = \int \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx, \Rightarrow \mu(x) = e^{\int \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx}$$

ثانيا: شرط وجود عامل دالة في y فقط .

نفرض أن المعادلة (١) لها عامل مكامل في y وبذلك تصبح المعادلة (٣) علي الصورة

$$\frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial y} = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

واضح أن الطرف الأيسر للمعادلة هو دالة في y فقط وبذلك فإن الطرف الأيمن يكون كذلك دالة في y فقط.

الشرط الضروري والكافي لكي يكون للمعادلة (١) عامل مكامل دالة في y فقط هو أن يكون المقدار

$$\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

دالة في y فقط .

وبتكامل هذه المعادلة

$$\ln \mu(y) = -\int \frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dy \Rightarrow \mu(y) = e^{-\int \frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dy}$$

وهذه العلاقة تعطي العامل المكامل بصورة صريحة.

مثال (١) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

الحل

$$xy^3 dx + (x^2 y^2 - 1) dy = 0$$

$$M(x, y) = xy^3, \quad N(x, y) = x^2 y^2 - 1$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3xy^2, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy^2, \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

المعادلة غير تامة

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = xy^2$$

$$\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{1}{y}$$

يوجد عامل مكامل μ دالة في y فقط يتعين من

$$\mu(y) = e^{-\int \frac{dy}{y}} = \frac{1}{y}$$

بعد الضرب في العامل المكامل تصبح المعادلة التفاضلية تامة.

$$xy^2 dx + \left(x^2 y - \frac{1}{y} \right) dy = 0$$

ولإيجاد حل المعادلة التفاضلية (١) نفرض الحل العام لها علي الصورة

$$f(x, y) = c$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M = xy^2 \quad (2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N = x^2 y - \frac{1}{y} \quad (3)$$

يتكامل المعادلة (٢) نحصل علي

$$f(x, y) = \frac{1}{2} x^2 y^2 + \phi(y) \quad (4)$$

ثم نفاضل المعادلة بالنسبة إلي y نحصل علي

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N = x^2 y - \frac{1}{y} = x^2 y + \phi'(y), \quad \phi'(y) = \frac{1}{y}$$

$$\phi(y) = \ln y + \ln c$$

بالتعويض في (٤) نحصل علي الحل العام

$$f(x, y) = \frac{1}{2} x^2 y^2 + \ln cy$$

مثال (٢) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$(1 - xy) dx + (xy - x^2) dy = 0$$

الحل

$$M = 1 - xy, \quad N = xy - x^2$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = y - 2x, \quad \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

المعادلة غير تامة

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = x - y, \quad \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{x - y}{x(y - x)} = -\frac{1}{x}$$

يوجد عامل مكامل μ دالة في x فقط يتعين من

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx} = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{1}{x}$$

بعد الضرب في العامل المكامل تصبح المعادلة التفاضلية تامة.

$$\left(\frac{1 - xy}{x} \right) dx + \left(\frac{xy - x^2}{x} \right) dy = 0$$

واضح أن حل المعادلة التفاضلية التامة السابقة هو

$$\ln x - xy + \frac{y^2}{2} = c$$

٥.٤.١ المعادلات التفاضلية الخطية

المعادلة التفاضلية تكون خطية إذا كانت y ومشتقاتها التفاضلية بالنسبة إلى x من الدرجة الأولى

وغير مضروبة ببعضها و الصورة العامة لها

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x)$$

حيث أن $a_0, a_1, \dots, a_n, f(x)$ دوال في x .

والمعادلة التفاضلية الخطية من الرتبة الأولى و الدرجة الأولى تكون علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = \phi(x) \quad (1)$$

Or

$$\frac{dx}{dy} + p(y)x = \phi(y) \quad (2)$$

ولحل هذه المعادلة نقوم بتحويلها إلى صورة معادلة تامة وذلك يضرب المعادلة (١) في عامل مكامل

$\mu = \mu(x)$ فتصبح المعادلة (١) علي الصورة

$$\mu(x)dy + [\mu(x)p(x)y - \mu(x)\phi(x)]dx = 0 \quad (3)$$

و المعادلة (٣) تكون تامة إذا تحقق الشرط

$$\frac{\partial}{\partial x}[\mu(x)] = \frac{\partial}{\partial y}[\mu(x)p(x)y - \mu(x)\phi(x)]$$

ومنها يكون

$$\frac{d\mu}{dx} = \mu(x)p(x) \quad (4)$$

$$\therefore \frac{d\mu}{\mu(x)} = p(x)dx \Rightarrow \mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

وبالتعويض من (٤) في (٣) نحصل علي الصورة

$$\mu(x)dy + y d\mu = \mu(x)\phi(x)dx$$

$$d[\mu(x)y] = \mu(x)\phi(x)dx$$

و بتكامل هذه المعادلة نحصل علي

$$\mu(x)y = \int \mu(x)\phi(x)dx + c \Rightarrow y = \frac{1}{\mu(x)} \int \mu(x)\phi(x)dx + \frac{c}{\mu(x)}$$

هو الحل العام للمعادلة التفاضلية الخطية (١).

وبالمثل يمكن إيجاد حل المعادلة التفاضلية (٢) علي الصورة

$$x(y) = \frac{1}{\mu(y)} \int \mu(y) \phi(y) dy + \frac{c}{\mu(y)}$$

مثال (١) : أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} + y \cot x = \sec x$$

الحل : نوجد أولاً عاملاً مكافئاً يعتمد علي x

$$\mu(x) = e^{\int \cot x dx} = \sin x$$

الحل العام للمعادلة يصبح علي الصورة

$$\frac{d}{dx}(y \sin x) = \tan x, \quad y \sin x = \int \tan x dx + c$$

$$y = \operatorname{cosec} x \ln \sec x + c \operatorname{cosec} x$$

مثال (٢) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$x \frac{dy}{dx} + (x + 1)y = 3x^2 e^x$$

الحل : يمكن كتابة المعادلة علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} + \left(1 + \frac{1}{x}\right)y = 3x^2 e^x, \quad \mu = e^{\int \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx} = x e^x$$

$$\frac{d}{dx}(y x e^x) = 3x^3 e^{2x}, \quad y x e^x = 3 \int x^3 e^{2x} dx + c$$

$$xy = (x^3 + c) e^{-x}$$

هو الحل العام للمعادلة التفاضلية

٦.٤.١ معادلة برنولي

هي المعادلة تكون علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} + yp(x) = Q(x) y^n \quad (1)$$

حيث n عدد حقيقي لا يساوي 1

لحل هذه المعادلة يتم تحويلها أولاً إلى معادلة خطية وذلك بالقسمة على y^n

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + y^{1-n} p(x) = Q(x) \quad (2)$$

ثم نفرض أن $u = y^{1-n}$. فيكون

$$\frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} \quad (3)$$

وبالتعويض من (3) في (2) نحصل على

$$\frac{1}{1-n} \frac{du}{dx} + p(x)u = Q(x) \Rightarrow \frac{du}{dx} + (1-n)p(x)u = (1-n)Q(x)$$

وهذه معادلة تفاضلية خطية يمكن حلها كما سبق.

مثال (1) : أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{2x} = 5x^2 y^5 \quad (1)$$

الحل

بقسمة المعادلة (1) على y^5 نجد أن

$$y^{-5} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x} y^{-4} = 5x^2 \quad (2)$$

نفرض أن $u = y^{-4}$ فيكون $\frac{du}{dx} = -4y^{-5} \frac{dy}{dx}$ و بالتعويض في (2)

$$-\frac{1}{4} \frac{du}{dx} - \frac{u}{2x} = 5x^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} + \frac{2u}{x} = -20x^2$$

وهذه معادلة تفاضلية خطية. يتك حلها كالتالي

$$\mu = e^{\int \frac{2dx}{x}} = x^2 \Rightarrow \frac{d}{dx}(ux^2) = -20x^4$$

$$ux^2 = -4x^5 + c \Rightarrow u = -4x^3 + \frac{c}{x^2} = \frac{c - 4x^5}{x^2} = y^{-4}$$

الحل العام للمعادلة (١) هو

$$y^4 = \frac{x^2}{c - 4x^5}$$

٦.٤.١ معادلة ريكاتي

معادلة ريكاتي هي المعادلة التي تكون علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + Q(x)y + R(x) \quad (1)$$

حيث R, Q, P دوال في X فقط ويمكن حل هذه المعادلة إلي علم أحد الحلول الخاصة لها $y = y_1$ حيث y_1 دالة في X . وفي هذه الحالة فالأصل التام للمعادلة (١) يعطي بالتعويض

$$y = y_1 + \frac{1}{z} \quad (2)$$

حيث أن z دالة في X يمكن ايجادها علي النحو التالي :

حيث أن $y = y_1$ حل للمعادلة (١) فبالتالي هو يحققها

$$\frac{dy_1}{dx} = p(x)y_1^2 + Q(x)y_1 + R(x) \quad (3)$$

ب طرح المعادلة (٣) من المعادلة (١) ينتج أن

$$\frac{d}{dx}(y - y_1) = p(x)(y^2 - y_1^2) + Q(x)(y - y_1) \quad (4)$$

من المعادلة (٢) نحصل علي

$$\frac{d}{dx}(y - y_1) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{z}\right) = -\frac{1}{z^2} \frac{dz}{dx}$$

المعادلة (٤) تصبح علي

$$-\frac{1}{z^2} \frac{dz}{dx} = (y_1^2 + \frac{1}{z^2} + \frac{2y}{z} + y_1^2)p(x) + \frac{1}{z}Q(x)$$

$$\frac{dz}{dx} + [2y_1p(x) + Q(x)]z = -p(x)$$

وهذه معادلة خطية يمكن حلها كما سبق.

مثال (١) اثبت أن $y = 1$ حل خاص للمعادلة التفاضلية الآتية ثم أوجد حلها العام.

$$\frac{dy}{dx} = (y - 1)(xy - y - x)$$

الحل

بوضع المعادلة التفاضلية علي الصورة

$$\frac{dy}{dx} = (x - 1)y^2 + (1 - 2x)y + x \quad (1)$$

وهذه معادلة تمثل معادلة ريكتاتي

بالتعويض في المعادلة (١) نحصل علي

$$x - 1 + (1 - 2x) + x = 0$$

ولذلك فإن $y = 1$ حل خاص للمعادلة التفاضلية (١).

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{z^2} \frac{dz}{dx} \text{ وبالتالي } y = 1 + \frac{1}{z}$$

بالتعويض في المعادلة (١) نحصل علي

$$-\frac{1}{z^2} \frac{dz}{dx} = (x - 1)(1 + \frac{1}{z})^2 + (1 - 2x)(1 + \frac{1}{z}) + x$$

$$\frac{dz}{dx} + (x - 1)(z + 1)^2 + (1 - 2x)(z^2 + z) + z^2x = 0$$

$$\frac{dz}{dx} + z^2(x - 1 + 2x + x) + z(2x - 2 + 1 - 2x) + x - 1$$

$$\frac{dz}{dx} - z = 1 - x \quad (2)$$

وهذه معادلة خطية عاملها المكامل هو $\mu(x) = e^{-\int dx} = e^{-x}$

و يمكن حل هذه المعادلة كما يلي

$$\frac{d}{dx}(e^{-x}z) = (1-x)e^{-x} \Rightarrow e^{-x}z = \int (1-x)e^{-x} + c = xe^{-x} + c$$

$$z = x + ce^x$$

إي أن الحل العام لمعادلة (١) هو

$$\frac{1}{y-1} = x + ce^x$$

تمارين (١)

(١) كون المعادلات التفاضلية لمجموعة المنحنيات الآتية

$$(i) y = (x - c)^3 \quad (ii) y = \sin(x + c)$$

$$(iii) x^2 + cy^2 = 2y \quad (iv) y = c(x - 2)^2$$

$$(iiv) y = ax^2 + be^x \quad (vi) y = ax^3 + bx^2 + cx$$

$$(vii) y = \alpha \cos(\ln x) + \beta \sin(\ln x)$$

$$(viii) y = a\{x + \sqrt{x^2 - 1}\}^n + b\{x - \sqrt{x^2 - 1}\}^n$$

حيث n ثابت مطلق.

$$(ix) y = (a + bx) \cosh mx$$

حيث m ثابت مطلق.

$$(x) y = a(\sin^{-1} x) + b(\sin^{-1} x)^2$$

$$(xi) y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

$$(xii) y = \alpha e^{\beta x}$$

$$(xiii) (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$$

(٢) أوجد المعادلة التفاضلية للقطاعات المكافئة التي محورها هو المحور السيني.

(٣) كون المعادلة التفاضلية للدوائر التي نصف قطرها الواحد الصحيح ومركزها تقع علي

$$y = 2x$$

(٤) اوجد الحل العام المعادلات التفاضلية الآتية بطريقة فصل المتغيرات

$$(i) \frac{dy}{dx} = \cos(y - x) \quad (ii) \tan x \sin^2 y dx + \cos^2 x \cot y dy = 0$$

$$(iii) x \frac{dy}{dx} - y = y^2 \quad (iv) xy \frac{dy}{dx} = 1 - x^2$$

$$(iiv) \frac{dy}{dx} = \sqrt{4x + 2y - 1} \quad (v) x^2 \frac{dy}{dx} + y = a$$

$$(vi) xy^3 \frac{dy}{dx} = 1 - x^2 + y^2 - x^2 y^2$$

$$(vii) x(1 - x^2)dy = (x^2 - x + 1)ydx$$

$$(viii) (x + y)^2 \left(x \frac{dy}{dx} + y\right) = xy \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$$

(٥) اوجد الحل العام للمعادلات التفاضلية المتجانسة الآتية

$$(i) (x + 2y)dx - xdy = 0 \quad (ii) xy' = y - xe^{y/x}$$

$$(iii) xy' - y = (x + y) \ln \frac{x + y}{x} \quad (iv) xy' = y \cos(\ln \frac{y}{x})$$

$$(v) xy' - y = x \tan \frac{y}{x} \quad (vi) (x^2 - 2xy - y^2) \frac{dy}{dx} = x^2 + 2xy - y^2$$

$$(vii) (x + y)^2 \frac{dy}{dx} = x^2 - 2xy + 5y^2 \quad (viii) x \frac{dy}{dx} = y - x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right)$$

(٦) اوجد الحل العام للمعادلات التفاضلية ذات المعاملات الخطية الاتية

$$(i) y' = \frac{4x - y + 7}{2x + y - 1} \quad (ii) (2x - 4y + 6)dx + (x + y - 3)dy = 0$$

$$(iii) (x - y - 1) + (y - x + 2)y' = 0$$

$$(iv) (3y - x)y' = 3x - y + 4$$

$$(v) (x - 5y + 5)dy + (5x - y + 1)dx = 0$$

$$(vi) x^2 \frac{dy}{dx} = (2x - y + 1)^2 \quad (vii) (y + ax + b) \frac{dy}{dx} = y + ax - b$$

(٧) بين أن المعادلات الاتية تامة واوحد الحل العام لها

$$(i) 2xydx + (x^2 - y^2)dy \quad (ii) (2 - 9xy^2)xdx + (4y^2 - 6x^3)ydy = 0$$

$$(iii) (x^3 - 3xy^2)dx + (y^3 + 3x^3y)dy = 0$$

$$(iv) xdx + ydy = a^2 \left(\frac{xdx - ydy}{x^2 + y^2} \right)$$

$$(v) (3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 3y^2)dy = 0$$

$$(vi) (\cos x - x \cos y)dy - (\sin y + y \sin x)dx = 0$$

$$(vii) e^{-y}dx - (2y + xe^{-y})dy = 0 \quad (viii) \frac{y}{x}dx + (y^3 + \ln x)dy = 0$$

$$(ix) \frac{2x^2 + y^2}{y^2}dx - \frac{2x^3 + 5y}{y^3}dy = 0$$

$$(x) (1 + y^2 \sin 2x)dx - 2y \cos^2 x dy = 0$$

$$(xi) \left(\frac{x}{\sin y} + 2 \right) dx + \frac{(x^2 + 1) \cos y}{\cos 2y - 1} dy = 0$$

$$(xii) \sin x \cos y dy + \cos x \sin y dx + \cos x e^{\sin x} dx = 0$$

$$(xiii) [3ax^2 + 2(a + 2h)xy + (b + 2h)y^2] dx$$

$$+ [(a + 2h)x^2 + 2(b + 2h)xy + 3by^2] dy = 0$$

(٨) أوجد عامل مكامل يعتمد علي x فقط لكل من المعادلات التفاضلية الآتية ومن ثم أوجد

اصلها التام

$$(i) (x^3 + y^4)dx + 8xy^3dy = 0$$

$$(ii) (1 - xy)dx + (1 - x^2)dy = c$$

$$(iii) (x^3 + 2y^3 - 3xy)dx + 3x(y^2 + x)dy = 0$$

$$(iv) (2x^2 + xy + a^2)ydx + (x + 2y)(x^2 + a^2)dy = 0$$

(٩) أوجد عامل مكامل يعتمد علي y فقط لكل من المعادلات التفاضلية الآتية ومن ثم أوجد

اصلها التام

$$(i) xy^3 dx + (x^2 y^2 - 1) dy = 0$$

$$(ii) y^2 dx + (xy + 1) dy = 0$$

$$(iii) (y + 1) dx + (xy + y^2 + y + 1) dy = 0$$

$$(iv) dx + \{1 + (x + y) \tan y\} dy = 0$$

(١٠) أوجد الحل العام لكل من المعادلات الخطية الآتية

$$(i) (x + 1) \frac{dy}{dx} - y = 3x^4 + 4x^5 \quad (ii) \left\{ 2x \frac{dy}{dx} + y \right\} \sqrt{1+x} = 1 + 2x$$

$$(iii) 2(x^2 + x + 1) \frac{dy}{dx} + (2x + 1)y = 8x^2 + 1$$

$$(iv) 2(1 - x^2) \frac{dy}{dx} - (1 + x)y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$(v) (1 + x^2)^2 \frac{dy}{dx} + (1 + x)(1 - x^2)y = 2 \quad (vi) \frac{dy}{dx} + y \tan x = \sin 2x$$

$$(vii) \frac{dy}{dx} \sin x \cos^3 x + y \cos 2x \cos^2 x = 0$$

$$(viii) \frac{1}{2} \frac{dy}{dx} = y \tan 2x + 1 + \sec 2x \quad (ix) \frac{dy}{dx} + 2y = x^2 + 3 \cosh x$$

$$(x) \frac{dy}{dx} + 2y \operatorname{cosec} 2x = 2 \cot^2 x \cos 2x$$

$$(xi) \frac{dy}{dx} \cot x - y = \operatorname{cosec} 2x + \cos 2x$$

$$(xii) (1 - x^2) \frac{dy}{dx} + xy = x \sin^{-1} x + (1 - x) \sqrt{1 - x^2}$$

(١١) حول المعادلات التفاضلية الآتية إلي معادلات خطية ثم أكمل حلها

$$(i) (xy - y^2) \frac{dy}{dx} = y^2 - 1 \quad (ii) \left\{ x \left(\frac{1 - y^2}{1ty^2} \right) - 1 \right\} \frac{dy}{dx} = y$$

$$(iii) \{ (2y^2 - 1)x + y^3 \} \frac{dy}{dx} = y(1 - y^2)^2 \quad (iv) x \frac{dy}{dx} = 4y - 4\sqrt{y}$$

$$(v) 2x \frac{dy}{dx} - y = \frac{2x^3 - 1}{y} \quad (vi) x^3 \frac{dy}{dx} = 2x^2y + y^3$$

$$(vii) \frac{dy}{dx} \cos x + y \sin x + y^3 = 0$$

$$(viii) 2(1 + x)y \frac{dy}{dx} + 2x - 3x^2 + y^2 = 0$$

(١٢) أثبت أن $y = 1$ حل خاص للمعادلة التفاضلية الآتية ثم أوجد أصلها التام

$$\frac{dy}{dx} = (y - 1)(xy - y - x)$$

(١٣) اثبت أن $y = \frac{x + 1}{x^2}$ حل خاص للمعادلات التفاضلية الآتية واوحد أصلها التام

$$\frac{dy}{dx} + y^2 = \frac{1}{x^4}$$

(١٤) أثبت أن $y = x$ حل خاص لكل من المعادلات التفاضلية الآتية ثم أوجد حلها العام

$$(i) x \frac{dy}{dx} + (n - 1)ax^n (y - x)^2 + y - 2x = 0$$

$$(ii) \frac{dy}{dx} + xy^2 - (2x^2 + 1)y + x^3 + x - 1 = 0$$

$$(iii) (x^2 + a) \frac{dy}{dx} + 2y^2 - 3xy - a = 0$$

الفصل الأول

المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى و الدرجات العليا

درسنا في الباب الأول كيفية حل المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى و الدرجة الأولى وفي هذا الباب سوف ندرس كيفية حل المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى و الدرجات الأعلى و المعادلات التي سوف ندرسها يمكن تقسيمها الي

(١) معادلات قابلة للحل في P (٢) معادلات قابلة للحل في x

(٣) معادلات قابلة للحل في y

وكذلك سوف ندرس الحلول الشاذة لبعض المعادلات التي من درجة أعلى من الأولى.

(١) المعادلات القابلة للحل في P

نعتبر المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى و الدرجات العليا هي :

$$L_0 \left(\frac{dy}{dx} \right)^n + L_1 \left(\frac{dy}{dx} \right)^{n-1} + \dots + L_{n-1} \frac{dy}{dx} + L_n = 0 \quad (1)$$

حيث أن L_0, L_1, \dots, L_n دوال في x, y

نفرض أن $P = \frac{dy}{dx}$ المعادلة (١) تصبح علي الصورة

$$p^n + L_1 p^{n-1} + \dots + L_{n-1} p + L_n = 0 \quad (2)$$

الطرف الأيسر لهذه المعادلة عبارة عن كثيرة حدود من الدرجة n فاذا أمكن حلها بالنسبة إلي p علي الصورة.

$$(p - \varphi_1)(p - \varphi_2) \dots (p - \varphi_n) = 0$$

حيث $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ دوال في x, y

و هذه معادلات تفاضلية من الرتبة الأولى و الدرجة الأولى.

$$p = \varphi_1, p = \varphi_2, \dots, p = \varphi_n$$

$$\frac{dy}{dx} = \varphi_1(x, y), \quad \frac{dy}{dx} = \varphi_2(x, y), \quad \dots, \quad \frac{dy}{dx} = \varphi_n(x, y)$$

حلول هذه المعادلات يمكن فرضها علي الصورة

$$f_1(x, y, c_1) = 0, f_2(x, y, c_2) = 0, \dots, f_n(x, y, c_n) = 0$$

ويكون الحل العام للمعادلة هو

$$f_1(x, y, c_1) f_2(x, y, c_2) \dots f_n(x, y, c_n) = 0 \quad (3)$$

المعادلة (٣) تمثل مجموعات من المنحنيات

$$f_1(x, y, c_1) = 0, f_2(x, y, c_2) = 0, \dots, f_n(x, y, c_n) = 0$$

إذا استبدلنا c_1, c_2, \dots, c_n بالثابت الاختياري C ورسمنا المنحنيات

$$f_1(x, y, c) = 0, f_2(x, y, c) = 0, \dots, f_n(x, y, c) = 0$$

وجعلنا C تتغير من $-\infty$ إلى $+\infty$ فإننا نحصل على نفس المنحنيات.

الحل العام للمعادلة (1) هو :

$$f_1(x, y, c)f_2(x, y, c)\dots f_n(x, y, c) = 0$$

وهو يحتوي على ثابت اختياري واحد لأن المعادلة من الرتبة الأولى.

مثال (1) اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx}\cosh x + 1 = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = p \quad \text{الحل : بوضع } p$$

$$p^2 - p(e^x + e^{-x}) + e^x e^{-x} = 0$$

بالتحليل

$$(p - e^x)(p - e^{-x}) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x, \quad \frac{dy}{dx} = e^{-x}$$

$$y = e^x + c, \quad y = e^{-x} + c$$

هو الأصل التام للمعادلة هو

$$(y - e^x - c)(y + e^{-x} - c) = 0$$

مثال (2) أوجد الحل المعادلة التفاضلية

$$p^2 - (x + y)p + xy = 0$$

$$(p = \frac{dy}{dx} \text{ حيث})$$

الحل : بالتحليل

$$(p - x)(p - y) = 0 \quad p = x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = x \quad y = \frac{1}{2}x^2 + c_1$$

$$p = y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \quad y = c_2 e^x$$

يكون الحل العام هو

$$\left(y - \frac{1}{2}x^2 - c\right)(y - ce^x) = 0$$

(٢) المعادلات القابلة للحل في x

المعادلات التفاضلية القابلة للحل في x تأخذ الصورة

$$x = f(y, p) \quad (1)$$

$$p = \frac{dy}{dx} \quad \text{حيث}$$

وبمفاضلة المعادلة (١) بالنسبة إلى y نحصل علي

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial y}$$

وهذه معادلة تفاضلية في المتغيرين p, y فإذا أمكن حلها علي الصورة

$$y = \psi(p, c) \quad (2)$$

فإنه بالتعويض عن y في المعادلة (٢) نحصل علي

$$x = f(p, c) \quad (3)$$

الحل العام للمعادلة (١) ينتج بحذف p من المعادلتين (٢)، (٣) وإذا لم يمكن حذف p من المعادلتين فإن المعادلتين (٢)، (٣) تسميان بالمعادلات البارامترية للحل.

مثال (١) حل المعادلة التفاضلية

$$x - y = 2ap - ap^2$$

الحل:

$$x = y + 2ap - ap^2 \quad (1)$$

بالتفاضل بالنسبة إلى y نجد أن

$$\frac{1}{p} = 1 + (2a - 2ap) \frac{dp}{dy} \Rightarrow \frac{1}{p}(1 - p) = 2a(1 - p) \frac{dp}{dy}$$

$$dy = 2ap dp$$

و منها نحصل علي

$$y = ap^2 + c \quad (2)$$

وبالتعويض عن قيمة y في المعادلة (١) نحصل علي

$$x = 2ap + c \quad (3)$$

فلأخط أن يمكن حذف p من المعادلة (٢)، (٣) وذلك كما يلي :

$$p^2 = \frac{y - c}{a}, \quad p = \frac{x - c}{2a}$$

$$\frac{(x - a)^2}{4a^2} = \frac{y - c}{a}$$

$$(x - c)^2 = 4a(y - c)$$

وهي مجموعة من القطاعات المكافئة

مثال (٢) حل المعادلة التفاضلية



$$x = yp - p^2$$

$$p = \frac{dy}{dx} \text{ حيث}$$

الحل : بالتفاضل بالنسبة إلي y

$$\frac{1}{p} = p + y \frac{dp}{dy} - 2p \frac{dp}{dy} \Rightarrow \frac{dp}{dy}(y - 2p) = \frac{1}{p} - p$$

$$y - 2p = \left(\frac{1}{p} - p\right) \frac{dy}{dp} \Rightarrow \left(\frac{1}{p} - p\right) \frac{dy}{dp} - y = -2p$$

$$\frac{dy}{dp} - \frac{p}{1-p^2} y = -\frac{2p^2}{1-p^2}$$

وهذه معادلة تفاضلية خطية من الرتبة الأولى ، العامل المكامل لها

$$\mu(p) = e^{\int \frac{p}{p^2-1} dp} = e^{\frac{1}{2} \int \frac{2p}{p^2-1} dp} = e^{\ln \sqrt{p^2-1}} = \sqrt{p^2-1}$$

$$\frac{d}{dp} (y \sqrt{p^2-1}) = \frac{-2p^2}{1-p^2} \sqrt{p^2-1} = \frac{2p^2}{\sqrt{p^2-1}}$$

$$y \sqrt{p^2-1} = \int \frac{2p^2}{\sqrt{p^2-1}} dp + c$$

و لإيجاد هذا التكامل نستخدم التعويض

$$p = \cosh \theta \quad dp = \sinh \theta d\theta$$

$$\int \frac{2p^2}{\sqrt{p^2-1}} dp = \int \frac{2 \cosh^2 \theta}{\sinh \theta} \cdot \sinh \theta d\theta = \int 2 \cosh^2 \theta d\theta$$

$$= \int (1 + \cosh 2\theta) d\theta = \theta + \frac{1}{2} \sinh 2\theta$$

$$= \theta + \sinh \theta \cosh \theta$$

$$y \sqrt{p^2-1} = \theta + \sinh \theta \cosh \theta + c$$

$$= \cosh^{-1} p + p \sqrt{p^2-1} + c$$

ومنها نجد

$$y = p + \frac{1}{\sqrt{p^2 - 1}} (\cosh^{-1} p + c) \quad (1)$$

بالتعويض عن y في المعادلة الأصلية

$$\begin{aligned} x &= yp - p^2 \\ &= p^2 + \frac{p}{\sqrt{p^2 - 1}} (\cosh^{-1} p + c) - p^2 \end{aligned}$$

وتكون

$$x = \frac{p}{\sqrt{p^2 - 1}} (\cosh^{-1} p + c) \quad (2)$$

المعادلتان (1)، (2) تمثلان الحل البارامتري للمعادلة المطلوبة.

(3) المعادلات القابلة للحل في y

المعادلات القابلة للحل في y يمكن كتابتها علي الصورة

$$y = f(x, p) \quad (1)$$

بتفاضل بالنسبة إلي x

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial x}$$

وهذه معادلة تفاضلية في x, p فإذا أمكن حلها علي الصورة

$$x = \phi(p, c) \quad (2)$$

فأنه بالتعويض عن قيمة x في المعادلة (1) نحصل علي

$$y = \psi(p, c) \quad (3)$$

الحل العام للمعادلة (1) ينتج بحذف p من المعادلتين (2)، (3) و إذا تغدر الحذف تسمي المعادلتين (2)، (3) بالمعادلات البارامتريّة للحل.

مثال (1) حل المعادلة التفاضلية الآتية

$$y = p + p^3 \quad (1)$$

الحل

بالتفاضل بالنسبة إلي x نجد أن

$$p = \frac{dp}{dx} + 3p^2 \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dx} (1 + 3p^2)$$

$$\int dx = \int \frac{1 + 3p^2}{p} dp + c$$

لذلك يكون

$$x = \ln p + \frac{3}{2}p^2 + c \quad (2)$$

المعادلتين (1)، (2) تمثل المعادلات البارامترية للحل.

مثال (2) أوجد حل المعادلة التفاضلية

$$y = xp^2 + p \quad (1)$$

الحل

بتفاضل هذه المعادلة بالنسبة إلى x نحصل على

$$p = \frac{dy}{dx} = p^2 + 2xp \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dx}$$

$$p(1-p) = (2xp+1) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dx}{dp} - \frac{2}{1-p}x = \frac{1}{p(1-p)}$$

وهذه معادلة خطية .

$$\mu(p) = e^{\int \frac{2dp}{1-p}} = e^{2\ln(1-p)} = (1-p)^2$$

$$\frac{d}{dp} [x(1-p)^2] = \frac{1-p}{p}$$

وبالتكامل نحصل على

$$x(1-p)^2 = \int \frac{1-p}{p} dp + c$$

$$x(1-p)^2 = \ln p - p + c$$

ويكون

$$x = \frac{\ln p - p + c}{(1-p)^2} + p \quad (2)$$

بالتعويض من (2) عن قيم x في (1) نحصل على

$$y = \frac{p^2 \ln p - p^3 + p^2 c}{(1-p)^2} + p \quad (3)$$

والمعادلتين (2)، (3) تمثلان الحل العام في الصورة البارامترية.

(4) معادلة كليروت

معادلة كليروت تكون على الصورة

$$y = xp + f(p) \quad (1)$$

حيث $p = \frac{dy}{dx}$ بالتفاضل بالنسبة إلى x تحصل على

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + f'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} [x + f'(p)] = 0$$

أما $\frac{dp}{dx} = 0$ ومنها $p = c$ وبالتعويض في (1) نحصل على

$$y = cx + f(c) \quad (2)$$

وهي معادلة مجموعة من الخطوط المستقيمة

وأما

$$x + f'(p) = 0$$

ومنها

$$x = -f'(p) \quad (3)$$

وبالتعويض في (1) عن x

$$y = -f'(p)p + f(p) \quad (4)$$

بحذف p بين (3) ، (4) نحصل على علاقة بين (x, y) على الصورة الآتية

$$\phi(x, y) = 0 \quad (5)$$

المعادلة (5) تمثل حل آخر للمعادلة (1) وتكون المعادلتين (3) ، (4) هما المعادلتين

البارامتريتين لهذا الحل. المعادلة (5) لا تحتوى على ثابت اختياري فهي حل خاص وعلى العموم لا يمكن استنتاج

هذا الحل من الحل العام بوضع قيمة خاصة للثابت C .

الحل الخاص (5) هو "حل شاذ" أو حل "مفرد" للمعادلة التفاضلية.

المعادلة (2) تمثل الحل العام وهي معادلة مجموعة من المستقيمات ذات البارامتر C .

مثال (1): أوجد الحل العام والحل المفرد للمعادلة التفاضلية الآتية

$$y = xp + ap(1-p) \quad (1)$$

الحل :

بالتفاضل بالنسبة إلى x نجد أن

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + (a - 2ap) \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx}(x + a - 2ap) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c$$

الحل العام للمعادلة هو

$$y = cx + ac - ac^2$$

أو

$$x + a - 2ap = 0 \quad (2)$$

بحذف p من المعادلتين (1) ، (2) نجد أن

$$y = \frac{(x + a)^2}{4a}$$

أي أن

$$(x - a)^2 = 4ay$$

وهذا هو الحل المفرد ويمثل غلاف مجموعة المستقيمات الممثلة بالحل العام.

مثال (2) أوجد الحل العام والحل المفرد للمعادلة التفاضلية

$$y = xp + \frac{ap}{\sqrt{1+p^2}}$$

الحل: بالتفاضل بالنسبة إلى x نحصل على

$$p = x \frac{dp}{dx} + \frac{a}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} \frac{dp}{dx}$$

بذلك يكون

$$\left[x + \frac{a}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \frac{dp}{dx} = 0$$

$$p = c \Leftarrow \frac{dp}{dx} = 0$$

الحل العام للمعادلة التفاضلية هو

$$y = xc + \frac{ac}{\sqrt{1+c^2}} \quad (2)$$

وهي تمثل مجموعة من المستقيمات.

أو

$$x = -\frac{a}{(1+p^2)^{3/2}} \quad (3)$$

بالتعويض من (3) في (1) عن قيمة x نجد أن

$$y = \frac{ap^3}{(1+p^2)^{3/2}} \quad (4)$$

المعادلتان (3)، (4) هما المعادلتان البارامتريتان للحل المفرد ويحذف p بين (3)، (4) نحصل علي المعادلة الكارتيزية للحل المفرد من (3) نجد أن

$$p^2 = \left(-\frac{a}{x}\right)^{2/3}, \quad y = -xp^3$$

$$y^{2/3} = (-x)^{2/3} p^2 = (-x)^{2/3} \left[\left(-\frac{a}{x}\right)^{2/3} - 1\right]$$

$$y^{2/3} = a^{2/3} - (-x)^{2/3} = a^{2/3} - x^{2/3}$$

و يكون الحل المفرد للمعادلة التفاضلية

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

وهو غلاف مجموعة المستقيمات التي يمثلها الحل العام .

مثال (3) أوجد الحل العام والحل المفرد للمعادلة التفاضلية

$$\sin px \cos y = \cos px \sin y + p$$

الحل: نكتب المعادلة على الصورة

$$\sin px \cos y = \cos px \sin y = p$$

$$\sin(px - y) = p$$

$$px - y = \sin^{-1} p$$

و بالتالي يكون

$$y = xp - \sin^{-1} p \quad (1)$$

وهذه صورة معادلة كليروت .

بالتفاضل بالنسبة إلى x نجد أن

$$p = p + x \frac{dp}{dx} - \frac{1}{\sqrt{1-p^2}} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} \left[x - \frac{1}{\sqrt{1-p^2}} \right] = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c$$

الحل العام هو

$$y = cx - \sin^{-1} c$$

ومن الناحية الأخرى

$$x = \frac{1}{\sqrt{1-p^2}}$$

$$p = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$$

بالتعويض في (1) نجد أن

$$y = \sqrt{x^2-1} - \sin^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \sqrt{x^2-1} - \sin^{-1} x^{-1} \sqrt{x^2-1}$$

وهذا هو الحل المفرد ويمثل غلاف المستقيمات.

الفصل الثاني

المعادلات التفاضلية من الرتبة العليا

الصورة العامة للمعادلات التفاضلية من الرتبة العليا هي

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

ولا يوجد حتى الآن طريقة مباشرة لحل هذه المعادلة .

و سوف ندرس في الأبواب القادمة طرق لحل حالات خاصة من هذه المعادلات وهي التي تكون فيها المعادلة (١) خطية. و ايضا حتى في مثل هذه الحالات الخاصة لن نستطيع أن نحصل على طريقة مباشرة نوجد بها الحل العام لأي معادلة تفاضلية خطية من الرتبة n إلا في الحالات التي تكون فيها المعاملات مقادير ثابتة. وسوف ندرس الآن بعض الحالات للمعادلة (١) التي يمكن فيها باستخدام تعويض مناسب تحويلها الى معادلة تفاضلية أخرى ذات رتبة أقل.

أولاً: المعادلات التفاضلية التي لا تحتوى على y بصورة صريحة

الصورة العامة لها هي

$$f(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

وفي هذه الحالة فإن رتبة المعادلة يمكن أن تؤول الي $n - k$ وذلك بوضع $y^{(k)} = p$

المعادلة (١) تأخذ الصورة

$$f(x, p, p', \dots, p^{(n-k)}) = 0 \quad (2)$$

وهذه المعادلة التفاضلية من الرتبة $(n - k)$ في المتغيرين x, p فإذا أمكن حلها على الصورة

$$p = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_{n-k}) = 0 \quad (3)$$

وبأجراء التكامل k من المرات للمعادلة (٣) نحصل على الحل العام للمعادلة (١).

مثال (١) حل المعادلة

$$\frac{d^4 y}{dx^4} - \frac{1}{x} \frac{d^3 y}{dx^3} = 0 \quad (1)$$

الحل

$$\text{let } \frac{d^3 y}{dx^3} \Rightarrow \frac{d^4 y}{dx^4} = \frac{dp}{dx}$$

و بذلك تصبح المعادلة التفاضلية (١) على الصورة

$$\frac{dp}{dx} - \frac{1}{x}p = 0$$

$$\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln p = \ln x + \ln c_1 \Rightarrow p = c_1 x$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = cx \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{c_1}{24}x^4 + \frac{c_2}{2}x^2 + c_3x + c_4$$

وهذا هو الحل العام.

مثال (٢) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية

$$2x \frac{dy}{dx} \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 1 \quad (1)$$

الحل

$$\frac{dy}{dx} = p \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$$

المعادلة (١) تصبح على الصورة

$$2xp \frac{dp}{dx} = p^2 - 1 \Rightarrow \frac{pdp}{p^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln(p^2 - 1) = \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2} \ln c_1$$

$$p^2 - 1 = c_1 x \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = c_1 x + 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{c_1 x + 1}$$

$$y = \pm \int \sqrt{c_1 x + 1} dx \Rightarrow y = \pm \frac{2}{3c_1} (c_1 x + 1)^{3/2} + c_2$$

و يكون الحل العام للمعادلة التفاضلية (١)

$$9c_1^2 (y - c_2)^2 = 4(c_1 x + 1)^3$$

ثانياً: المعادلات التفاضلية التي لا تحتوي x بصورة صريحة

هذه المعادلات تكون على الصورة.

$$f(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

وباستخدام التعويض $y' = p$ يمكن تخفيض رتبة المعادلة كما يلي

$$\frac{dy}{dx} = p, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy},$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(p \frac{dp}{dy} \right) = p^2 \frac{d^2 p}{dy^2} + p \left(\frac{dp}{dy} \right)^2$$

و هكذا بالنسبة لباقي المشتقات من الرتب الأعلى. بالتعويض عن قيم $y^{(n)}, y'', \dots, y'$ فإن المعادلة (١) تصبح على الصورة

$$\phi(y, p, \frac{dp}{dy}, \frac{d^2p}{dy^2}, \dots, \frac{d^{n-1}p}{dy^{n-1}}) = 0 \quad (2)$$

وهذه معادلة تفاضلية من الرتبة $(n-1)$ في المتغيرين y, p فإذا أمكن حل المعادلة (٢) وإيجاد p كدالة في y فإنه باستخدام الفرض $y' = p$ نحصل على معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى وبحلها نوجد y .
مثال (١) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية

$$y(y-1)\frac{d^2y}{dx^2} + (\frac{dy}{dx})^2 = 0 \quad (1)$$

الحل: نضع

$$\frac{d^2y}{dx^2} = p \frac{dp}{dy}$$

المعادلة تصبح على الصورة

$$y(y-1)p \frac{dp}{dy} + p^2 = 0 \Rightarrow y(y-1)\frac{dp}{dy} + p = 0$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{y(y-1)} = -[\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y}]dy$$

$$\ln p = \ln \frac{y}{y-1} + \ln c_1 \Rightarrow p = \frac{c_1 y}{y-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{c_1 y}{y-1} \Rightarrow \int \frac{y-1}{y} dy = \int c_1 dx$$

$$y - \ln y = c_1 x + c_2$$

وهو الحل العام للمعادلة (١).

ملحوظة: إذا كانت المعادلة التفاضلية خالية من y و x فإن يمكن حل المعادلة بأخذ أحد التعويضين السابقين.

ولكن نلاحظ أن استخدام التعويض $y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy}$ يكون أسهل في الحل.

مثال (٢): حل المعادلة التفاضلية

$$\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2} = m \frac{d^2y}{dx^2} \quad (1)$$

الحل: سوف ندرس حل هذه المعادلة باعتبارها معادلة لا تحتوى على x بصورة صريحة (وبتترك دراستها باعتبارها معادلة لا تحتوى على y بصورة صريحة كتمرين).

باستخدام التعويض

$$\frac{dy}{dx} = p \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = p \frac{dp}{dy}$$

المعادلة تصبح على الصورة

$$\sqrt{1+p^2} = mp \frac{dp}{dy} \Rightarrow \int \frac{mpdp}{\sqrt{1+p^2}} = \int dy$$

$$m\sqrt{1+p^2} = y + c_1 \Rightarrow 1+p^2 = \frac{1}{m^2}(y + c_1)^2$$

$$p^2 = \frac{(y + c_1)^2}{m^2} - 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \frac{\sqrt{(y + c_1)^2 - m^2}}{m}$$

$$\int \frac{m dy}{\sqrt{(y + c_1)^2 - m^2}} = \pm \int dx \Rightarrow m \cosh^{-1}\left(\frac{y + c_1}{m}\right) = \pm(x + c_2)$$

$$y = m \cosh \frac{x + c_2}{m} - c_1$$

وهو الحل العام.

ثالثا: المعادلات المتجانسة

تعريف: المعادلة التفاضلية تكون متجانسة إذا كانت كل حدودها من نفس البعد.

إذا اعتبرنا y و x من البعد الواحد فإن

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

و بالتالي فإن $\frac{dy}{dx}$ من البعد صفر

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{dy}{dx}}{\Delta x}$$

المشتقة $\frac{d^2y}{dx^2}$ من البعد -1

وهكذا نلاحظ أن $\frac{d^3y}{dx^3}$ من البعد -2 ، $\frac{d^ny}{dx^n}$ تكون من البعد $(1-n)$

فمثلاً المعادلة التفاضلية

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 4x^3 \frac{d^2y}{dx^2} + 2y^2 = 0$$

هي معادلة متجانسة من البعد ٢.
والمعادلة التفاضلية

$$(x^2 - 4xy) \frac{d^2y}{dx^2} + 8y \frac{dy}{dx} = 0$$

هي معادلة متجانسة من البعد ١.
ولحل المعادلات المتجانسة نعتبر الحالات الآتية

(١) إذا كانت المعادلة التفاضلية يمكن كتابتها على الصورة الآتية

$$\phi(x \frac{dy}{dx}, x^2 \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, y) = 0 \quad (1)$$

يمكن حل هذه المعادلة باستخدام التعويض $t = \ln x$ or $x = e^t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \cdot \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$$

وهكذا يمكن إيجاد بقية الحدود وبالتعويض تصبح المعادلة (١) على الصورة

$$\phi(y, \frac{dy}{dt}, \frac{d^2y}{dt^2}, \dots) = 0$$

هذه المعادلة لا تحتوى على t بصفة صريحة ويمكن حلها باستخدام التعويض

$$\frac{dy}{dt} = p, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = p \frac{dp}{dy}$$

وبذلك يمكن تخفيض رتبة المعادلة بمقدار الواحد.

مثال (١) أوجد الحل العام للمعادلة المتجانسة

$$y \left(x^2 \frac{d^2y}{dx^2} \right) + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 3y \left(x \frac{dy}{dx} \right) \quad (2)$$

الحل: هذه المعادلة متجانسة وتكون على الصورة

$$f(y, x \frac{dy}{dx}, x^2 \frac{d^2y}{dx^2}, \dots) = 0$$

باستخدام التعويض $x = e^t$ نجد أن

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}, \quad x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$$

و بالتالي المعادلة (٢) تصبح على الصورة

$$y \frac{d^2y}{dt^2} - 4y \frac{dy}{dt} + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 0 \quad (3)$$

بوضع

$$\frac{dy}{dt} = p, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = p \frac{dp}{dy}$$

تصبح المعادلة (٣) على الصورة

$$yp \frac{dp}{dy} - 4yp + p^2 = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dy} + \frac{1}{y} p = 4$$

وهذه معادلة خطية يكون عاملها المكامل هو

$$\mu(y) = e^{\int \frac{dy}{y}} = y \Rightarrow \frac{d}{dy}(py) = 4y \Rightarrow yp = 2y^2 + c_1$$

$$p = 2y + \frac{c_1}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2y + \frac{c_1}{y}$$

$$\frac{1}{4} \int \frac{4y dy}{2y^2 + c_1} = \int dt + \ln c_2 \Rightarrow \frac{1}{4} \ln(2y^2 + c_1) = \ln x + \ln c_2,$$

$$\sqrt[4]{2y^2 + c_1} = xc_2 \Rightarrow 2y^2 + c_1 = x^4 c_2^4 \Rightarrow y^2 = \frac{x^4 c_2^4}{2} - \frac{c_1}{2}$$

وهو الحل العام

(ب) إذا كانت المعادلة التفاضلية على الصورة

$$f\left(\frac{y}{x}, \frac{dy}{dx}, x \frac{d^2y}{dx^2}, \dots\right) = 0 \quad (4)$$

أي تكون هذه المعادلة متجانسة من البعد صفر.

وفي هذه الحالة نضع $x = e^t$, $y = zx$,

فيكون

$$\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx} \quad \text{and} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 2 \frac{dz}{dx} + x \frac{d^2z}{dx^2}$$

ولكن

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dt}, \quad x^2 \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{d^2z}{dt^2} - \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{dy}{dx} = z + \frac{dz}{dt}, \quad (5)$$

$$x \frac{d^2y}{dx^2} = 2x \frac{dz}{dx} + x^2 \frac{d^2z}{dx^2} = 2 \frac{dz}{dt} + \frac{d^2z}{dt^2} - \frac{dz}{dt}$$

$$x \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{dz}{dt} \quad (6)$$

وبالتعويض عن (5)، (6) تتحول المعادلة (4) الى الصورة

$$\phi\left(z, \frac{dz}{dt}, \frac{d^2z}{dt^2}, \dots\right) = 0$$

وهي معادلة خالية من t ويمكن حلها كما سبق.

مثال (2) أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية المتجانسة الأتية

$$(x^2 + y^2)(y - xy') + x^2y^2y'' = 0 \quad (7)$$

الحل : بالقسمة علي x^3 نجد أن

$$\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right)\left(\frac{y}{x} - y'\right) + \frac{y^2}{x^2}xy'' = 0$$

بوضع

$$y = zx, \quad x = e^t$$

تتحول المعادلة التفاضلية (7) الى الصورة

$$(1 + z^2)\left(z - z - \frac{dz}{dt}\right) + z^2\left(\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{dz}{dt}\right) = 0$$

$$-\frac{dz}{dt} - z^2 \frac{dz}{dt} + z^2 \frac{d^2z}{dt^2} + z^2 \frac{dz}{dt} = 0$$

$$z^2 \frac{d^2z}{dt^2} = \frac{dz}{dt} \quad (8)$$

بوضع

$$\frac{dz}{dt} = p, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = p \frac{dp}{dz}$$

تتحول المعادلة التفاضلية (أ)

$$z^2 p \frac{dp}{dz} = p \quad \Rightarrow \int dp = \int \frac{dz}{z^2}$$

$$p = \frac{dz}{dt} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{a} = \frac{z-a}{az}$$

$$\int \frac{az dz}{z-a} = \int dt \quad \Rightarrow t - \ln b = a \int \left[1 + \frac{a}{z-a}\right] dz = az + a^2 \ln(z-a)$$

$$t = az + a^2 \ln(z-a) + \ln b \quad \Rightarrow \ln x = a \frac{y}{x} + a^2 \ln\left(\frac{y}{x} - a\right) + \ln b$$

و يكون

$$x = b \left(\frac{y}{x} - a\right)^{a^2} e^{\frac{ay}{x}}$$

وهو الحل العام

رابعاً: المعادلات التفاضلية يمكن كتابتها علي صورة مشتقة لمقدار تفاضلي اقل من رتبة

المعادلة بمقدار الوحدة

الطرف الأيسر للمعادلة

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

هو عبارة عن مشتقة لمقدار تفاضلي ما من الرتبة $(n-1)$ وليكن مثلاً:

$$\phi = \phi(c, x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

هنا يمكن كتابة المعادلة (1) علي الصورة $\frac{d\phi}{dx} = 0$ ومنها $\phi = c$

مثال (1) حل المعادلة التفاضلية

$$yy'' + y'^2 = 0$$

الحل: هذه المعادلة يمكن كتابتها علي الصورة

$$d(yy') = 0$$

ومنها يكون

$$yy' = c$$

$$y^2 = c_1 x + c_2$$

ملحوظة : أحيانا للحصول على دالة مشتقتها تساوى الطرف الأيسر للمعادلة فإن ذلك لا يتحقق إلا بعد ضرب طرفي المعادلة في دالة ما.

مثال (٢) حل المعادلة التفاضلية

$$yy'' = y'^2$$

الحل : بالقسمة على yy' نحصل على

$$\frac{y''}{y'} = \frac{y'}{y} \Rightarrow \int \frac{y''}{y'} = \int \frac{y'}{y} \Rightarrow \ln y' = \ln y + \ln c$$

$$y' = yc \Rightarrow \frac{dy}{dx} = yc$$

$$\frac{dy}{y} = cdx \Rightarrow \ln y = cx + c_1$$

$$y = e^{cx + c_1} = c_1 e^{cx}$$

وهو الحل العام

مثال (٣) حل المعادلة التفاضلية الآتية :

$$y' y''' = 2y''^2$$

الحل : بالقسمة على $y' y''$ نحصل على

$$\frac{y'''}{y''} = 2 \frac{y''}{y'} \Rightarrow \int \frac{y'''}{y''} = 2 \int \frac{y''}{y'}$$

$$\ln y'' = 2 \ln y' + \ln c \Rightarrow y'' = cy'^2$$

وبوضع $y' = p$

$$\frac{dp}{dx} = cp^2$$

$$\frac{1}{p^2} dp = cdx \Rightarrow -\frac{1}{p} = cx + c_1$$

$$p = -\frac{1}{cx + c_1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{cx + c_1}$$

$$y = \frac{1}{c} \ln(cx + c_1) + c_2$$

وهو الحل العام.

تمارين (٢)

(١) أوجد الحل العام لكل من المعادلات التفاضلية بحلها بالنسبة إلى $p = \frac{dy}{dx}$,

- (i) $y^2 p^2 - 3xyp + 2x^2 = 0$
(ii) $p^2 - (xy + 2x)p + 2x^2 y = 0$
(iii) $p^2 - p - 6 = 0$
(iv) $p^3 - p(x^2 + xy + y^2) + xy(x + y) = 0$
(v) $p^2 - 2\cos x - 1 = 0$
(vi) $x + yp^2 = p(1 + xy)$

(٢) أوجد الحل العام لكل من المعادلات التفاضلية الآتية باعتبارها قابلة للحل في x

- (i) $x = 4p + 4p^3$
(ii) $p^2 - 2xp + 1 = 0$
(iii) $2y + p^2 + 2p = 2x(p + 1)$
(iv) $p = \tan\left(x - \frac{p}{1 + p^2}\right)$
(v) $p^3 - p(y + 3) + x = 0$

(٣) أوجد الحل العام لكل من للمعادلات التفاضلية الآتية باعتبارها قابلة للحل في y

- (i) $y = xp^2 + p$ (ii) $y = x + p^3$ (iii) $p^2 + p = e$
(iv) $y = p \sin p + \cos p$ (v) $y = p \tan p + \log \cos p$
(vi) $e^{p-y} = p^2 - 1$

(٤) أوجد الحل العام والحل المفرد لمعادلة كليروت التفاضلية لكل من المعادلات الآتية

- (i) $y = xp + p^2$ (ii) $y = xp + p^3$ (iii) $y = xp + \cos p$
(iv) $y = xp + \sqrt{a^2 p^2 + b^2}$ (v) $p = \log(xp - y)$
(vi) $\cosh xp \cosh y = \sinh px \sinh y + p$ (vii) $y = xp + \frac{p}{p + 1}$
(viii) $y = xp + \sqrt{p^2 - 1}$ (ix) $y = xp + \frac{ap}{\sqrt{1 + p^2}}$
(x) $y = xp + \sqrt{p^2 + 1} - p \log(p + \sqrt{p^2 + 1})$

(٥) حل المعادلات التفاضلية باعتبارها خالية من y

$$\begin{aligned} (i) 2xy'y'' &= y'^2 - 1 & (ii) x^2y'' &= y'^2 \\ (iii) y''^2 + y' &= xy'' & (iv) y'' \operatorname{cosec} x &= 1 \\ (v) x(a-x)y'' + 2(1-x)y' &= 1 & (vi) y^{(n)} - 2y^{(n-1)} &= e^x \end{aligned}$$

(٦) حل المعادلات التفاضلية باعتبارها خالية من x

$$\begin{aligned} (i) yy'' &= y'^2 y'' & (ii) y'^2 - (3y - 2y')y'' &= 0 \\ (iii) yy'' + 1 &= y'^2 & (iv) y'' + y'^2 &= 1 \\ (v) 2yy'' &= y'^2 & (vi) yy'' &= y'^2 - y'^3 \\ (vii) yy'' + y'^2 + 2ay^2 &= 0 \end{aligned}$$

(٧) حل المعادلات التفاضلية المتجانسة الآتية

$$\begin{aligned} (i) xy'' - xy' + y &= 0 & (ii) x^2y'' - xy' + 5y &= 0 \\ (iii) 2x^2yy'' + y^2 &= x^2y'^2 & (iv) (2yy'' - y'^2)x^2 + y^2 &= 0 \end{aligned}$$