



كيمياء حيوية 2

الأيض (التمثيل الغذائي)

طلاب الفرقة الرابعة عام بكلية التربية بالغردقة

شعبة العلوم البيولوجية

الترم الثاني 2023/2022

د/ حسين حسن عباس تميرك



الايض

إعداد: (Ass. Prof. Dr. Hussien Temerk)

كلية العلوم

قسم الكيمياء

العام الجامعي
2022/2021

بيانات الكتاب

الكلية: التربية

الفرقه: الثالثه

التخصص: كيمياء

تاريخ النشر: 2021

عدد الصفحات: 41

المحتوى

<u>الصفحات</u>	<u>الموضوعات</u>
4	مقدمه
4	تقسيم العمليات الايضيه
5	هضم الكربوهيدرات
7-6	ايض السكريات
13-8	خطوات تحلل الجلوکوز
14	التفاعلات اللاهوائية للبيروفيت
15	التفاعلات الهوائية للبيروفيت
20-16	دورة كيربس
21	محصلة الطاقة الناتجة من دورة كربس
22	بناء الجلايكوجين
23	استحداث الجلايكوجين
26-23	تحليل الجلايكوجين
28-27	هضم البروتينات
29	اهمية الاحماض الامينيه
32-29	ايض الاحماض الامينيه
35-32	دورة اليوريا
38-36	التمثيل الغذائي للبيادات
41-39	الفيتامينات

Metabolism (الايض)

- تُعرف العمليات الأيضية : التمثيل الغذائي على أنها مجموع كل التفاعلات الكيميائية للجزيئات الحيوية التي تحدث داخل الخلية.

تقسم العمليات الأيضية إلى:

عمليات البناء
Anabolism

عمليات الهدم
Catabolism

عملية الهدم: هي عملية تكسير الجزيئات الحيوية الكبيرة كالبروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، والأحماض النووية إلى جزيئات أصغر منها كالأحماض الأمينية، السكريات الأحادية، الأحماض الدهنية، والنيوكليوتيدات.

عملية البناء: في هذه العملية تُستخدم الجزيئات الصغيرة كمواد أولية تدخل في تفاعلات عديدة لإنتاج جزيئات أكبر وأكثر تعقيداً.

ملاحظة: عمليتا الهدم والبناء منفصلتان وغير متعاكستان، فعملية الهدم تتم لإنتاج الطاقة وعملية البناء تحتاج إلى الطاقة.

هضم الكربوهيدرات

في الفم:

- يتم تحلل النشا إلى مالتوز وسلسل من السكريات العديدة بواسطة إنزيم أميليز اللعاب وذلك بكسر الرابطة الجلايكوسيدية ($\alpha-1 \rightarrow 4$)
- يتوقف عمل هذا الإنزيم عند وصوله مع الطعام إلى المعدة بسبب درجة حموضتها الشديدة.

في المعدة:

- لا يوجد هضم للمواد السكرية.

في الأمعاء:

- يُكمل إنزيم أميليز البنكرياس ما بدأه أميليز اللعاب ويُحطّم المزيد من الروابط الجلايكوسيدية لينتج خليط من السكريات الثنائية.
- تُفرز الإنزيمات الخاصة بهضم السكريات الثنائية مثل إنزيم اللاكتاز، السكريز، والمالتيز ليكون الناتج النهائي خليط من السكريات الأحادية.
- يتم إمتصاص السكريات الأحادية من خلال الغشاء الطلائي المبطن للأمعاء الدقيقة.
- وبعد الإمتصاص يتم نقلها في الدم إلى الكبد، حيث يعمل الكبد على تحويل السكريات الأحادية المتنوعة مثل الفركتوز والجلاكتوز إلى جلوكوز لاستفادة منه باقي الخلايا.
يتم نقل الجلوكوز بواسطة الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة ليتم استغلاله بالطرق الآتية:

1 - أكسدة الجلوكوز لإنتاج الماء، ثاني أكسيد الكربون، والطاقة عن طريق تحلل الجلوكوز ودورة كربس.

2 - تحويل الجلوكوز إلى مكونات أخرى ذات أهمية بيولوجية مثل:

- الريبوز والديوكسي رايبوز لتصنيع الأحماض النووية.
- الفركتوز يدخل في تكوين السائل المنوي.
- حمض الجلوكيورونك في الكبد وهو هام للتفاعلات التي يتم فيها تحويل المواد السامة إلى مواد غير سامة.
- سكريات أمينية لصنع السكريات المتعددة المخاطية.

تخزين الفائض منه:

- يتم تخزين الجلوكوز في الكبد والعضلات على هيئة جلايكوجين بواسطة عملية تسمى الجليكوجينس Glycogenesis
- يتم تخزينه في الكبد والنسيج الشحمي على هيئة دهون متعادلة عن طريق طريقة عملية تسمى ليبوجينesis Lipogenesis

أيض السكريات

Glycolysis	- تحليل الجلوكوز
Krebs Cycle	- دورة كربس
Glycogenesis	- بناء الجلايكوجين
Gluconeogenesis	- إستحداث الجلايكوجين
Glycogenolysis	- تحليل الجلايكوجين

تحلل الجلوكوز

هو عبارة عن تحلل (تكسير) سكر الجلوكوز 6 ذرات كربون إلى جزيئين من البيروفيت (Pyruvate) 2 جزيء × 3 ذرات كربون من خلال 10 تفاعلات إنزيمية محفزة.

أهمية عملية تحلل الجلوكوز:

- تُعتبر هذه العملية بمثابة المرحلة الممهدة للأكسدة الكاملة لجزيء الجلوكوز ليعطي: ماء + ثاني أكسيد الكربون + طاقة (ATP)
- تزويد الخلية ببعض المركبات الحيوية الازمة لعمليات البناء.

- تتم جميع التفاعلات الإنزيمية لعملية الـجلايكوليس في سينتوبلازم جميع خلايا الكائنات الحية.


مراحل تحلل الجلوكوز:



- المرحلة الأولى : المرحلة التحضيرية (تتكون من خمسة تفاعلات إنزيمية) 1 إلى 5 تبدأ بالجلوكوز وتنتهي بالجيسير الدهيد 3-فوسفات ويتم في هذه التفاعلات إستهلاك للطاقة.

- المرحلة الثانية : مرحلة حفظ الطاقة تتكون من خمسة تفاعلات إنزيمية 6 إلى 10 (تبدأ بتحول الجليسر الدهيد


3-فوسفات وتنتهي بتكوين البيروفيت ويتم فيها إنتاج الطاقة



خطوات تحلل الجلوكوز


١) تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 -فوسفات:

- يتم إستهلاك جزء ATP لتحويل جزيء جلوكوز إلى جلوكوز 6 -فوسفات بواسطة إنزيم الهاكسوكينيز (في تفاعل غير عكسي في وجود أيون الماغنيسيوم (Mg^{+2}) أو المنجنيز (Mn^{+2}))
- إذا زاد تركيز الجلوكوز 6 -فوسفات المنتج فإنه يُثبط عمل إنزيم الهاكسوكينيز، لذلك فهو يُمثل أحد نقاط التحكم في عملية تحلل الجلوكوز




٢) تحويل الجلوكوز 6 -فوسفات إلى فركتوز 6 -فوسفات:

- يُحفز إنزيم الفوسفoglوكوزأيسوميريز (Phosphoglucoseisomerase) تحويل الجلوكوز 6 -فوسفات إلى فركتوز 6 -فوسفات في تفاعل عكسي.
- يحتاج هذا الإنزيم إلى أيونات الماغنيسيوم (Mg^{+2}) أو المنجنيز (Mn^{+2})




3- تحويل الفركتوز 6 -فوسفات إلى فركتوز 1، 6 ثانوي الفوسفات:

- يحتاج إنزيم الفوسفوفركتو كيناز إلى أيونات الماغنيسيوم (Mg^{2+}) حيث يستهلك جزيء واحد من الطاقة (ATP) لإنتاج الفركتوز 1، 6 ثانوي الفوسفات.
- يعتبر هذا التفاعل تفاعل غير عكسي حيث يمثل هذا الإنزيم أحد نقاط التحكم في عملية تحطيم الجلوكوز.




4) إنشطار مركب الفركتوز 1، 6 ثانوي الفوسفات:

- ينشطر الفركتوز 1، 6 ثانوي الفوسفات (6 ذرات كربون) ليعطي جزيئين سكريثلاي وهما ثانوي هيدروكسى أسيتون فوسفات (3 ذرات كربون) وجليسير الدهيد 3-فوسفات (3 ذرات كربون) بواسطة إنزيم الألدوليز Aldolase




(5) تحول السكريات الثلاثية الفوسفاتية:

- بواسطة إنزيم الترايوز فوسفات أيزوميراز (Triose Phosphate Isomerase) يتم تحويل ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات إلى جليسير ألهيد 3-فوسفات الذي يقوم بدوره بإكمال عملية تحلل الجلوكوز.
- وبهذا تكون حصيلة المرحلة التحضيرية هي تحلل جزيء جلوكوز إلى جزيئين من الجليسير ألهيد 3-فوسفات وإستهلاك جزيئين من الطاقة ATP.



(6) تحول الجليسير ألهيد 3-فوسفات إلى 3،1 ثنائي فوسفوجليسيريت:


- يُحفز إنزيم الجليسير ألهيد 3-فوسفيت ديهيدروجينيز تحويل جزيئين من جليسير ألهيد 3-فوسفات إلى جزيئين من 3،1 ثنائي فوسفوجليسيريت (مركب عالي الطاقة).
- هذا التفاعل يتم في وجود العامل المساعد نيكوتين أميد أدينين ثنائي النيوكليوتيد NAD^+ حيث ينتقل إلكترون من الجليسير ألهيد 3-فوسفات إلى NAD^+ .



(7) تحول 3،1 ثانى فوسفوجليسيريت إلى 3 -فوسفوجليسيريت:


- يُحفز إنزيم فوسفوجليسيريد كيناز (Phosphoglycerate Kinase) تحويل جزيئين من 3،1 ثانى فوسفوجليسيريت إلى 3 -فوسفوجليسيريت وتكوين جزيئين من ال ATP .

ملاحظة: تنتقل مجموعة الفوسفات من المادة الأساس إلى ال ADP بدون نقل إلكترونات




(8) تحول 3 -فوسفوجليسيريت إلى 2 -فوسفوجليسيريت:

- يُحفز إنزيم فوسفوجليسروميوتاز (Phosphoglyceromutase) تحويل 3-فوسفوجليسيريت إلى 2-فوسفوجليسيريت عن طريق نقل مجموعة الفوسفات من ذرة الكربون رقم 3 إلى رقم 2 في وجود أيونات الماغنيسيوم




٩) إزالة جزء ماء من 2-فوسفوجليسيريت:

- يُحفز إنزيم الإنوليز (Enolase) إزالة جزء ماء من 2-فوسفوجليسيريت وتكوين الفوسفوينول بايروفيت (مركب عالي الطاقة).
- يحتاج هذا الإنزيم إلى وجود أيون الماغنيسيوم (Mg^{+2}) أو المنجنيز (Mn^{+2}).



١٠) تكوين البيروفيت:

- يُحفز إنزيم البيروفيت كاينيز (Pyruvate Kinase) إنتقال مجموعة الفوسفات ذات الطاقة العالية من مركب الفوسفوينول بايروفيت إلى ADP وإنتاج البيروفيت في تفاعل غير عكسي.
- يحتاج هذا الإنزيم إلى وجود أيون البوتاسيوم (K^{+}) بالإضافة إلى الماغنيسيوم (Mg^{+2}) والمنجنيز (Mn^{+2}).



محصلة الطاقة الناتجة من تحلل جزء من الجلوكوز إلى جزيئين من البيروفيت

- إستهلاك 1 ATP في الخطوة رقم 1.
- إستهلاك 1 ATP في الخطوة رقم 3.

- إنتاج جزئيين من ال NADH باعتبار أن الجلوكوز ينطر إلى جزئين في الخطوة رقم 6 . كل جزء من ال NADH عند أكسدته يعطي 3 ATP .
- إنتاج 2 ATP في الخطوة رقم 7 باعتبار أن الجلوكوز ينطر إلى جزئين من الجليسير الدهيد 3 -فوسفات وكل جزء يعطي 1 ATP .
- إنتاج 2 ATP في الخطوة رقم 10 باعتبار وجود جزئين من 3 -فوسفو إنول بيروفيت ليعطي كلاً منها 1 ATP .


وبالتالي يكون الناتج: $ATP\ 8 = 6+2+2+1-1$

تنظيم عملية تحلل الجلوكوز

- يلاحظ أن جميع المركبات الوسيطة بين الجلوكوز والبيروفيت هي مركبات مفسرة.
- أي أنها متأينة عند درجة حموضة الخلية مما يجعلها مشحونة بشحنة سالبة تمنعها من المرور خلال الأغشية الخلوية لتظل في سيتوبلازم الخلية.
- أما البيروفيت أو اللاكتيت المتكون يمكن أن يمر خلال الأغشية الخلوية؛ فنظرًا للعدم فسفرة البيروفيت فإنه يمتلك القدرة على الانتقال من السيتوبلازم إلى الميتوكوندريا ليبدأ الأكسدة الهوائية (دورة كربس).
- يُلاحظ أن جميع التفاعلات الإنزيمية في الجليكوليسيس هي تفاعلات عكسية ماعدا ثلاثة تفاعلات غير عكسيّة.
- هذه التفاعلات الثلاث هي تفاعلات منظمة لعملية تحلل الجلوكوز و تُسمى بالتفاعلات المحددة لمعدل التفاعل (Rate-Limiting-Steps) .
- هذه التفاعلات المنظمة تتم بواسطة الإنزيمات التالية :

 - هكسوكاينيز
 - فوسفوفركتاينيز
 - بيروفيت كاينيز


مصير البيروفيت الناتج من تحلل الجلوكوز



التفاعلات اللاهوائية للبيروفيت

يُحول إلى لاكتيت:

- في العضلات أو في البكتيريا وعند غياب الأكسجين يتحول البيروفيت إلى حامض اللاكتيت بواسطة إنزيم اللاكتيت ديهيدروجينيز (LDH).




يُحول إلى إيثانول:

- في بعض الكائنات الدقيقة (مثل الخميرة) وفي غياب الأكسجين يتم تحويل

تخمر البيروفيت إلى كحول الإثانول في خطوتين:


1 تحويل البيروفيت إلى أسيتالدهيد بفقد ثاني أكسيد الكربون بواسطة إنزيم بيروفيت ديكربوكسيليز في وجود أيونات المغنيسيوم.

2- إحتزال الأسيتالدهيد إلى كحول إيثيلي مع أكسدة الـ NAD^+ إلى $\text{NADH} + \text{H}^+$



التفاعلات الهوائية للبيروفيت


في وجود الأكسجين ينتقل البيروفيت من السيتوبلازم إلى الميتوكوندريا ليبدأ سلسلة من تفاعلات الأكسدة (دورة كربس) والتي تنتهي بإنتاج ثاني أكسيد الكربون، ماء، وطاقة



Krebs Cycle

تمثل دورة كربس المسار الأخير في أكسدة الكربوهيدرات، الليبيدات، والبروتينات حيث يتم فيها أكسدة أستيل المرفق الإنزيمي أ (Acetyl Co A) إلى ثاني أكسيد الكربون + ماء + إنتاج طاقة.


- في وجود الأكسجين، ينتقل البيروفيت إلى الميتوكوندريا ليتحول إلى أستيل المرفق الإنزيمي أ الذي بدوره يبدأ سلسة تفاعلات دورة كربس



خطوات دورة كربس


١) تفاعل الأستيل مرافق الإنزيمي أ لتكوين السترات:

- يُحفز إنزيم سترات سينثيز (Citrate Synthase) تفاعل الأستيل مرافق الإنزيمي أ مع أوكسالو أسيتات لتكوين السترات.
- يُثبت هذا الإنزيم بواسطة ال ATP أو ال NADH



٢) تحول السترات إلى أيزوسينترات:

- يُحفز إنزيم أكونيتاز (Aconitase) تحول السترات إلى أيزوسينترات عن طريق إزاحة جزيء الماء.
- يحتاج هذا الإنزيم إلى أيونات الحديد كعامل مساعد




٣) نزع مجموعة كربوكسيل من الأيزوسينترات:

- يُحفز إنزيم الأيزوسينترات ديهيدروجينيز (Isocitrate Dehydrogenase) نزع مجموعة الكربوكسيل من الأيزوسينترات.

نزع مجموعة الكربوكسيل من الأيزوسينترات 6 ذرات كربون ليكون الألfa كيتوجلوتاريت 5 ذرات كربون.


- أثناء التفاعل يتكون مركب وسيط وهو أوكسالوسكسيت الذي يتحلل بسرعة ليعطي الألfa كيتوجلوتاريت.



٤) نزع مجموعة كربوكسيل من الألfa كيتوجلوتاريت:


- يُحفز إنزيم الألfa كيتوجلوتاريت ديهيدروجينيز (Alpha ketoglutarate Dehydrogenase) نزع مجموعة الكربوكسيل من الألfa كيتوجلوتاريت (5 ذرات كربون) ليتحول إلى ساكسينيل مرفق إنزيمي أ (4 ذرات كربون).

- هذا التفاعل يُنتج طاقة في شكل NADH




٥) تكوين مركب الساكسينات وتوليد جزء طاقة (GTP)

- يُحفز إنزيم الساكسينات ثايكينيز (Succinate Thiokinase) كسر رابطة الثيوإستر (عالية الطاقة) في مركب الساكسينيل مرافق إنزيمي أ ليعطي مركب الساكسينات وتوليد طاقة بصورة ال GTP




٦) أكسدة الساكسينات إلى فيومارات:

- يُحفز إنزيم الساكسينات ديهيدروجينيز (Succinate Dehydrogenase) أكسدة الساكسينات وتحويله إلى فيومارات.
- يحتاج هذا الإنزيم لـ FAD كعامل مساعد والذي يستقبل جزء من الهيدروجين المزاح من مركب الساكسينات ليُختزل ويعطي ال FADH₂




٧) إنتاج الملاط:

- يُحفز إنزيم الفيومارات هيدراتيز (Fumarate Hydratase) ويُطلق عليه الفيوماريز (L-malate) إضافة جزيء ماء للفيومارات ليعطي المماكب اليساري الملاط (Fumarase)



٨) أكسدة الملالات إلى أوكسالوأسيتات:

- يُحفز إنزيم المالات ديهيدروجينيز (Malate Dehydrogenase) أكسدة جزيء من المالات ليعطي أوكسالوأسيتات.
 - يستخدم هذا الإنزيم العامل المساعد الـ NAD^+ كمستقبل للهيدروجين ليتحول بدوره إلى NADH .



محصلة الطاقة الناتجة من دورة كربس

- إنتاج جزيء واحد من ال NADH في الخطوة رقم 3 ليعطي 3 ATP .
- إنتاج جزيء واحد من ال NADH في الخطوة رقم 4 ليعطي 3 ATP .
- إنتاج جزيء واحد من ال GTP في الخطوة رقم 5 والذي يتحول إلى جزيء واحد من ال ATP .
- إنتاج جزيء واحد من ال FADH₂ في الخطوة رقم 6 ليعطي 2 ATP .
- إنتاج جزيء واحد من ال NADH في الخطوة رقم 8 ليعطي 3 ATP .
- وبالتالي يكون ناتج تحول جزيء واحد من البيروفيت إلى ثاني أكسيد الكربون وماء تساوي:


$$ATP\ 12 = 3 + 2 + 1 + 3 + 3$$

- خطوت تحول جزيئين من البيروفيت إلى جزيئين من الأستيل المرافق الإنزيمي أ تنتج 6 ATP .
- ويكون ناتج تحول جزيء الجلوكوز إلى 2 جزيء بيروفيت يساوي 8 ATP .
- وبالتالي تحلل جزيء من جلوكوز إلى ثاني أكسيد الكربون وماء تساوي:

$$ATP\ 38 = (2 \times 12) + 6 + 8$$

(Glycogenesis)

- يتم تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز-6-فوسفات بواسطة إنزيم الجلوكيناز (Hexokinase) أو إنزيم الهكسوكيناز (Glucokinase).
- يتحول الجلوكوز-6-فوسفات إلى جلوكوز-1-فوسفات عن طريق إنزيم فوسفوجلوكونوموتاز (Phosphoglucomutase).
- يُحول إنزيم البيريديل ترانسفيريز (Uridyl Transferase) الجلوكوز-1-فوسفات إلى بوريدين ثانٍ فوسفات الجلوكوز (UDP-Glucose).
- يقوم الإنزيم الصانع للجلايكوجين (Glycogen Synthase) بتجميع جزيئات الجلوكوز على شكل سلاسل (روابط $\alpha-1 \rightarrow 4$).
- تتفرع السلسلة بواسطة إنزيم الـ $\alpha-1 \rightarrow 4:\alpha-1 \rightarrow 6$ Transglycosylase والذى يقطع وحدات من الجلوكوز ونقلها في سلسلة طرفية برابطة ($\alpha-1 \rightarrow 6$).





إستحداث الجلايكوجين (Gluconeogenesis)

- هي عملية تكوين الجلوكوز أو الجلايكوجين من مصادر غير كربوهيدراتية مثل الأحماض الأمينية، حمض اللاكتيت، البيروفيت، والجليسرون.
- تحدث في السيتوبلازم وليس في الميتوكوندريا، ويحدث 90 % من هذه العملية في الكبد و 10 % في الكليتان.

تحليل الجلايكوجين (Glycogenolysis)


- في هذه العملية يتم تكسير الجلايكوجين إلى وحدات متكررة من الجلوكوز والتي تدخل بدورها في عملية تحلل الجلوكوز (Glycolysis) (إنتاج الطاقة).
- الجلايكوجين الموجود في الكبد والعضلات يتم تكسيره بواسطة إنزيم جلايكوجين فوسفوريлиз في الحالات التالية :
 - في حالات الجوع الشديد حيث يقل الجلوكوز الذي يؤخذ من الطعام .
 - في حالة داء السكري حيث لا يتم الإستفادة من الجلوكوز الموجود في الغذاء .
- يعتبر هذا الإنزيم منظم ومتحكم بعملية تحلل الجلوكوز حيث أن هذا الإنزيم يحدد كمية جزيئات الجلوكوز الناتجة من تحلل الجلايكوجين والداخلة في عملية إنتاج الطاقة (Glycolysis)
- يتم تحليل الجلايكوجين بفعل إنزيم الجلايكوجين فوسفوريлиз (Glycogen Phosphorylase)، والذي يزيل جزيء جلوكوز من طرف السلسلة عن طريق ربطه بمجموعة فوسفات عند ذرة الكربون رقم 1 حتى يتبقى 4 جزيئات من الجلوكوز قبل نقطة التفرع




يقوم إنزيم جلوكوز ترانسفيريز (Glucose transferase) بنقل وحدات السكر الثلاثة المتبقية قبل موضع التفرع إلى سلسلة أخرى تارك جزيء جلوكوز واحد مرتبط برابطة $\alpha-1 \rightarrow 6$ موضع التفرع.

- يتم تحليل جزيء الجلوكوز في موضع التفرع بواسطة إنزيم أميلو-ألفا


$\text{Amylo-}\alpha\text{-}1 \rightarrow 6 \text{ Glucosidase}$



- يتم تحويل جميع وحدات الجلوكوز - 1 فوسفات الناتجة من عملية تحلل الجلايكوجين إلى جلوكوز - 6 فوسفات عن طريق إنزيم الفوسفوجلوكوميوتاز (Phosphoglucomutase)



- تحول وحدات جلوكوز - 6 فوسفات إلى جلوكوز عن طريق إنزيم الجلوكوز - 6 فوسفاتيز (Glucose-6-phosphatase) والذي له القدرة على الخروج من الخلية إلى مجرى الدم



هضم البروتينات

في الفم :

لا يحدث هضم للمواد البروتينية

في المعدة:

- في هذه العملية تنشط إنزيمات المعدة والأمعاء المسؤلة عن هضم البروتينات حيث تحول من صوره غير نشطه (zymogens) الي صوره نشطه (إنزيم).

- يوجد ثلاث إنزيمات في المعدة تعمل على تحطيم الروابط البيتية في البروتينات لتحولها الى ببتيدات وهي:

- الببسين

- الرينين

- الجيلاتينيز

- بالإضافة إلى هذه الإنزيمات يساعد حمض HCl الموجود في المعدة على هضم البروتينات وتحويلها إلى عديد ببتيد حمضي.

الబبسين

- ينشط إنزيم الببسين بواسطه حمض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة الرقم الهيدروجيني 1.5 و 2 ويحول من ببسينوجين إلى ببسين

- يكسر الببسين الروابط البيتية في البروتينات وتحولها إلى عديد الببتيد

الرينين

يفرز هذا الإنزيم من خلال جدار المعدة الداخلي ويعمل على هضم بروتين الحليب في وجود أيونات الكالسيوم

يوجد في وسط متعادل لذلك لا يوجد في معدة الكبار نظراً للحوضه ولكن يوجد في معدة الأطفال لأن الوسط متعادل.

الجيلاتينيز

يعمل هذا الإنزيم على هضم بروتين الجيلاتين وتحويله إلى عديد الببتيد

في الاثني عشر

يستكمل هضم البروتينات بواسطه العصاره البنكرياسيه في الاثني عشر والتي تحتوي على اربع انزيمات وهي:

التربيسين

الكيموتروبسين

الكربوكسى بيتيدايز

الكولاجينايز

تقوم هذه الانزيمات بتكسير الرابطه الببتيديه في عديد الببتيدات المختلفه وتحوبلها الى ببتيدات صغيره ثنائية وثلاثيه واحماض امينيه.

في الامعاء الدقيقه

يتم هضم البروتين وعديد الببتيد والببتيدات الثنائيه والثلاثيه وتحوبلها الى الناتج النهائي من الاحماض الامينيه.

انزيمات الامعاء الهاضمه للبروتين هي:-

الامينوبيتيدايز: يعمل على كسر الرابطه الببتيديه الاولى من طرف مجموعة الامين.

الدايبيتيدايز: يعمل على كسر الرابطه الببتيديه بين ثنائيات الببتيد الناتجه من عمل انزيم البيسين.

امتصاص الاحماض الامينيه

تمتص الاحماض الامينيه حيث انها تذوب في الماء في الاجزاء العلويه من الامعاء الدقيقه بواسطه النقل النشط الذي يحتاج الي طاقه.

تنتقل الاحماض الامينيه بعد امتصاصها من خلال جدار الامعاء الى الدم وتنقل من خلاله الى الكبد حيث يخزن 80% منها في الكبد حتى يحتاجها الجسم في عملياته المختلفه.

اهمية الاحماض الامينيه الناتجه من هضم البروتينات

- ١- تصنيع البروتينات مثل البروتينات الموجودة في الانسجه والبلازم والانزيمات
- ٢- تصنيع بعض الهرمونات مثل هرمون الانسولين
- ٣- بناء المركبات النيتروجينيه مثل القهاء النتروجينيه والكرياتين وبعض
الناقلات العصبيه
- ٤- اكسدة الاحماض الامينيه للحصول على الطاقه او تحويلها الى جلوكوز او احماض دهنيه
- ٥- يتم تكسيرها الى امونيا وهيكيل كربوني ليستفيد منها الجسم في عمليات اخري

ايض الاحماض الامينيه

عمليات البناء:

- تستخدم الاحماض الامينيه كمواد اوليه لبناء البروتينات المختلفه
- تستخدم لبناء سكر الجلوكوز من مصدر غير كربوهيدراتي

عمليات الهدم:

- تتسارع الاحماض الامينيه لانتاج الطاقه عند تناول كميه كبيره منها او عند الامتناع عن الاكل او
في حالة الاصابه بمرض السكر
- في هذه العملية يتتسارع الهيكيل الكربوني في الحمض الاميني الى ثاني اكسيد الكربون وماء
وتحول مجموعات الامين الى يوريا او مركبات نيتروجينيه اخر
- تتم عملية هدم الاحماض الامينيه في الكبد وبصوره اقل في الكلىتين.

ايض مجموعة الالفا-امينو للاحماض الامينيه

- تفاعل نقل مجموعة الامين **Trans amination**

- تفاعل النزع التاكسدي لمجموعة الامين **Oxidative Deamination**


- تفاعل النزع غير التاكسدي لمجموعة الامين **Non-oxidative Deamination**

Deamination

- تفاعل نزع مجموعة الكربوكسيل **Decarboxylation**


١- نقل مجموعة الامين

- هي عملية نقل مجموعة الـα امين من حمض اميني الى هيكل حمض كيتوني لتكوين حمض اميني جديد.
- تحدث هذه العملية في سيتوبلازم وميتوكوندريا خلايا الكبد
- يحفز هذا التفاعل العكسي بواسطة إنزيم الترانس امينيز الذي يلعب دوراً هاماً في عملية هدم وبناء الاحماس الامينية





٢. تفاعل النزع التاكسي لمجموعة الامين:

- هي عملية إزالة مجموعة الـα امين من الحمض الاميني الجلوتاميت لتبقى السلسلة الكربونية لهذا الحمض.
- تنتقل مجموعة الامين المنزوعة إلى دورة الـUrea Cycle (Urea Cycle)، أما السلسلة الكربونية المتبقية تتحول إلى حمض كيتوني ليتحول بعدها لمركب وسيط يدخل في دورة كربس.
- تحدث هذه العملية في ميتوكوندريا خلايا الكبد.
- يحفز هذا التفاعل العكسي وفي وجود الـ NAD^+ بواسطة إنزيم الجلوتاميت ديهيدروجينيز (Glutamate Dehydrogenase) الذي يلعب دوراً هاماً في عملية تنظيم مستوى الطاقة في الخلية.



3. تفاعل التزع غير التاكسي لمجموعة الأمين:

هي عملية إزالة مجموعة الألفا أمين من الحمض الأميني مشبعة بواسطة إنزيمات ألفادي أمينيز (deaminases) ليعطي الأمونيا والأحماض الغير مشبعة.



٤. تفاعل نزع مجموعة الكربوكسيل:

- يحفز تلك التفاعلات إنزيمات دي كربوكسيليز (decarboxylase)
- ينتج من نزع مجموعة الكربوكسيل المرتبطة بذرة الكربون ألفا إلى تكوين مركبات ذات أهمية كبيرة.

مثال:

- ✓ يتم إنتاج مركب الهيستامين بواسطة نزع مجموعة الألفا كربوكسيل من الحمض الأميني الهستيدين.
- ✓ يتم إنتاج مركب الجاما أمينو بيوتريك (ناقل عصبي) بواسطة نزع مجموعة الألفا كربوكسيل من الحمض الأميني الجلوتاميك.
- ✓ يتم إنتاج مركب السيروتونين (ناقل عصبي) بواسطة نزع مجموعة الألفا كربوكسيل من الحمض الأميني التريبتوفان.

دورة البيريا


التفاعل الأول:

- يتم هذا التفاعل في الميتوكوندريا ويكون مركب الكربوميل فوسفات Carbamyl Phosphate من إتحاد الأمونيا (من الجلوتاميت) مع ثاني أكسيد الكربون (من سلسلة التنفس في دورة كربس) + ماء + 2ATP.
- يُحفز هذا التفاعل إنزيم الكارباميل فوسفيت سينثيز-1 Phosphate Synthase 1.




التفاعل الثاني:

- يتم هذا التفاعل في الميتوكوندريا حيث يُحفز إنزيم أورنيثين ترانزكربيميلايز (Ornithine Transcarbamoylase) نقل مجموعة الكرباميل إلى مركب الأورنيثين لتعطي السترولين.




التفاعل الثالث:

- يتم هذا التفاعل في السيتوبلازم حيث يُحفز إنزيم الأرجينينوسكسينيل سينثيز (Argininosuccinate Synthetase) إندماج مركب السترولين مع الحمض الأميني الأسبارتات (بالتالي إضافة مجموعة الأمين الثانية المكونة لليوريا) ليعطي مركب الأرجينينوسكسينيل.




التفاعل الرابع:


- يتم هذا التفاعل في السيتوبلازم حيث يحفز إنزيم الأرجينينوسكسينات لايز (Argininosuccinate Layase) تحلل مركب الأرجينينوسكسينات وتكوين الحمض الأميني الأرجينين والفيوماريت.
- يتحول الفيوماريت إلى الأكسالوأسيتات الذي يتحول بدوره إلى الأسبارتات.



التفاعل الخامس:

- يتم هذا التفاعل في الميتوكوندريا حيث يحفز إنزيم الأرجيناز (Arginase) تحلل الحمض الأميني الأرجينين إلى يوريا والأورنيثين.
- هذا الإنزيم لا يوجد إلا في الكبد، أي أن الكبد هو العضو الوحيد قادر على تكوين اليوريا والتي تنتقل بعد تصنيعها في الكبد إلى الكلية (عن طريق الدم) للتخلص منها بواسطة تكوين البول.






التمثيل الغذائي للبييدات Metabolism of lipids

- تخزن الزيوت والدهون على صورة مركبات متعادلة Glycerides في النبات والحيوان وهذه توجد في الخلية الحية لانتاج الطاقة حيث تعتبر الليبيدات من المصادر الغنية في الطاقة المخزونه داخل الجسم. فعند تناول مادة غذائية تحتوى على دهون فانها تمر من المعدة الى الامعاء حيث يقوم انزيم ال Lipase المفرز من البنكرياس بتحليل الدهون او الزيوت الى احماض دهنية وجلسرول التي تمتص خلال جدر الامعاء وتنتقل بصورة مختلفة الى حيث استخدامها. وتخزن الزيادة من الدهنيات في مواضع مختلفة من جسم الحيوان اهمها تجويف البطن وتحت الجلد وبين العضلات. والجلسرول يتحول الى جليكوجين في الكبد ويمثل الى كربوهيدرات ويتم الحصول على الطاقة المخزونه في المواد الدهنية عن طريق عملية الاكسدة للأحماض الدهنية طولية السلسلة.
• وهناك نوعان من الاكسدة :-

اولا : الاكسدة في الوضع بيتا:- (Knoops oxidation) وتسمى ايضا




• ويلاحظ في هذه التفاعلات مايلي:

- 1- في الخطوة الاولى يلزم جزيء واحد فقط من ATP لتنشيط الحمض الدهني في بدأ β -oxidation وفي وجود مراقب انزيمي Co-enzyme A-SH فتحصل على مشتق معاون للحمض الدهني في صورة نشطة Acyl Co-A ويتبع ذلك استمرار الاكسدة لهذا المركب النشط بصرف النظر عن عدد ذرات الكربون في السلسلة الكربونية للحمض الدهني 0 يعمل مركب ATP على تنشيط الحمض الدهني فقط لتكوين مركب Acyl Co-A.
- 2- يتبع الخطوة السابقة عملية نزع ايدروجين بين ذرتى الكربون α , β ويحدث ذلك في وجود FAD الذي يتحول الى الصورة المختزلة $FADH_2$ وينتج خلال هذه الخطوات جزيئان من الـ ATP.
- 3- عند تحويل المركب Acyl Co-A الى المركب β -Keto acyl Co-A ويحتاج هذا التفاعل الى NAD الذي يتحول الى $NADH_2$ وينتج خلال ذلك 3 جزيئات من الـ ATP. وعلى ذلك فان كل β -Oxidation ينتج خلالها 5 جزيئات من الـ ATP.
- 4- يلاحظ ايضا انه في كل β -Oxidation ينقص ذرتين كربون من الحمض الدهني على صورة Acetyl-COA والتي يدخل دورة كرب للاحماض ثلاثية الكربوكسيل Tricarboxylic acid cycle (Krebs cycle) حيث يتاكسد الى CO_2 . $H_2O + CO_2$.
- 5- اما باقى جزئ الحمض الدهنى فيكون على صورة acyl CoA الذى يحدث له β -Oxidation ليخرج منه ذرتين كربون على صورة acetyl CoA وهكذا حتى يتم اكسدة الحمض الدهنى كله وهكذا تكون النتيجة النهائية هى :-
- • Fatty acid Acetyl CoA $CO_2 + H_2O$
وعلى ذلك فحمض دهنى يحتوى على 18 ذرة كربون يحدث له ثمانى مرات β -Oxidation.
- 6- يلاحظ ان هذه الدورة لا هوائية حيث تتم الاكسدة والاحتزال بواسطة انزيمات dehydrogenase.

ثانياً : الاكسدة في الوضع (α - oxidation)

- يتم هذا النوع من الاكسدة في احوال خاصة في البدور والاجنه وبعض الانسجة كالمخ وتتم كالتالى :-



- وهكذا تتكرر العملية من جديد


- يلاحظ في هذا النوع من الاكسدة استخدام NAD الذي يتحول الى $NADH_2$ (مختزل) وينطلق ثلاثة روابط غنية في الطاقة وينقص الحمض الدهنى ذرة كربون واحدة تخرج على صورة CO_2 ويلاحظ ان الطاقة الناتجة من عملية الـ α -Oxidation تكون اكبر منها في حالة الـ β -oxidation كما ان عملية الاكسدة في النوع الاول تتم في بطيء عن النوع الثاني ولذا تحدث الـ α -oxidation في البدور النابتا لانتاج طاقة بسرعة تساعد على عملية الانبات.

تكوين اجسام كيتونية من الاحماس الدهنية

Formation of Ketone bodies (Ketogenesis)

- تكون هذه الاجسام اذا كانت كمية الدهن في الغذاء كبيرة جدا او اذا حدث اضطراب في دورة كرب لظروف معينة مما يؤدي الى انتاج كميات كبيرة من مركب Acetyl CoA حيث تراكم لعدم امكان اكساته في دورة كرب وينتج عن ذلك ان حرق الدهون في الجسم يسلك طريق اخر اذ ينتج مركبات تسمى بالاجسام الكيتونية Ketone bodies وتسمى هذه العملية بعملية ال-Ketogenesis وهذه المركبات هي :-
- β -acetoacetic acid, β -hydroxybutyric acid , acetone

وتلخص التفاعلات الخاصة بتكوين هذه المركبات فيما يلى:



وبعد تكوين الـ Aceto acetic acid فاما ينزع منه CO_2 ليكون الإسيتون او يحدث له اختزال بواسطة NADH_2 ليكون المركب β -Hydroxy butyric acid

الفيتامينات Vitamins

- تقسم المواد الغذائية الى الاقسام الرئيسية الآتية :-
- **الكريوهيدرات** : كأغذية طاقة.
- **الليبيات** : كأغذية طاقة مركزة. حيث تستخدم الدهون والزيوت بجانب الكربوهيدرات في توليد الحرارة اللازمة للكائن الحي.
- **البروتينات** : وهي المسؤولة عن بناء الخلايا وتجديدها سواء للنمو او لتعويض ما يفقد منها.
- **الماء والاملاح المعدنية** : حيث تدخل في جميع العمليات الفسيولوجية بجميع الكائن الحي.
- وقد وجد ان تغذية حيوانات التجارب على المركبات الغذائية السابقة في صورة تامة وبنسب صحيحة يؤدي الى اعراض مرضية على الحيوانات ثم يتبعه نقص في النمو ثم الموت. بينما تستمر الحيوانات الاخرى التي تتغذى على علائق كاملة التركيب بصحة جيدة ومع استمرار تجارب التغذية وتعددتها امكن توصيفها وتقسيمها واطلق عليها اسم الفيتامينات **Vitamins**.


الفيتامينات عبارة عن مركبات كيميائية عضوية لا تتكون عادةً بواسطة أعضاء الجسم وتوجد عادةً في المواد الغذائية المختلفة ويحتاج إليها الجسم بكميات صغيرة لكي يحتفظ بصحة جيدة ونمو سليم. ولا تتدخل الفيتامينات في بناء الأنسجة ولا يتولد عنها طاقة مثل **المواد الغذائية الأخرى**. وتختلف احتياجات الحيوان من الفيتامينات باختلاف نوعه ويتسبب نقصها في ظهور أعراض مرضية على الكائن الحي وت تكون الفيتامينات في أنسجة النبات وفي أنواع معينة من البكتيريا وقد توجد في صورة نشطة أو ما يسمى مولد **الفيتامينات** .*Precursors*

تقسم الفيتامينات بالنسبة للذوبان


• أولاً : فيتامينات قابلة للذوبان في الماء **Water Soluble** و هى تشمل مجموعه فيتامينات C ، B **Vitamins**

• ثانياً : فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون **Fat soluble** و بالتالى تذوب في مذيبات الدهون و تشمل فيتامينات A, K, E, D **Vitamins**


الفيتامينات الذائبة في الماء




Lipid Soluble Vitamins




vitamin A
 $C_{20}H_{30}O$ part of the visual pigment



$C_{29}H_{50}O_2$ **vitamin E** an antioxidant



vitamin D₂ calcium metabolism
 $C_{28}H_{44}O$ & bone growth



vitamin K₁ a blood clotting factor
 $C_{31}H_{46}O_2$