


محاضرات في الهندسة التحليلية (2)



لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية

إعداد

الدكتور / محمد السيد أحمد العاطون

عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات - كلية العلوم بقنا

العام الجامعي: 2024-2025


تحذير: لا يجوز النسخ أو التصوير من هذه المذكرة أو استخدامها دون إذن القائم بإعدادها.

الباب السابع

نُظْم الإحداثيات في المستوى

أولاً: نظام الإحداثيات الكارتيزيه


من نقطة ثابتة O في المستوى تُسمى نقطة الأصل نرسم مستقيمين متعامدين Ox, Oy يُسميان محاور الإحداثيات. فإذا كانت P نقطة ما في المستوى فإن P تتحدد تحديداً تاماً بواسطة كميتين عدديتين (x, y) يُسميان إحداثيات النقطة في المستوى، حيث x تمثل البعد العمودي للنقطة P عن محور Oy ، وتمثل y البعد العمودي للنقطة P عن محور Ox ، كما بالشكل المقابل:



ثانياً: نظام الإحداثيات القطبية

نظام الإحداثيات القطبية هو نظام إحداثي ثنائي الأبعاد يحدد إحداثيات أي نقطة P في المستوى تحديداً تاماً من خلال المسافة r بين النقطة P ونقطة ثابتة في المستوى O والزاوية θ بين r واتجاه ثابت في المستوى.


لتكن O نقطة ثابتة في المستوى. من هذه النقطة الثابتة نرسم مستقيماً ثابت أفقي ينطبق على المحور Ox ، كما بالشكل المقابل:



فإذا كانت P نقطة ما في المستوى فإن P تتعين تماماً إذا علمنا المسافة OP (أي بُعد P عن O) ، وإذا علمنا أيضاً الزاوية θ التي يصنعها المستقيم OP مع المحور OX . تُسمى النقطة الثابتة O القطب والمستقيم الثابت OX الخط الابتدائي (القطبي).

العلاقة بين الإحداثيات القطبية و الكارتيزية

لتكن P نقطة في المستوى إحداثياتها القطبية (r, θ) وإحداثياتها الكارتيزية (x, y) ، كما بالشكل المقابل:



ومن الشكل المقابل يتضح أن:

$$x = r \cos \theta$$

$$(1), \quad y = r \sin \theta \quad (2)$$

هاتين العلاقاتين تعبران عن x, y بدلالة r, θ .

وبتربيع العلاقاتين (1)، (2) وجمعهما نحصل على:

$$r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (3)$$

وبقسمة العلاقة (1) على العلاقة (2) نحصل على:

$$\frac{y}{x} = \tan \theta \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \quad (4)$$

وهاتين العلاقاتين (3)، (4) تعبران عن r, θ بدلالة x, y .

أمثله محـــــــــــــــــلونه

مثال(1): حول المعادلة $x^2 + y^2 + 3x - 4y = 18$ إلى الصورة القطبية.

الحـــــــــــــــــل

بالتعويض عن $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r^2 = x^2 + y^2$ في المعادلة المعطاة ينتج أن:

$$r^3 + 3r \cos \theta - 4r \sin \theta = 18$$

وهي تمثل معادلة دائرة في الإحداثيات القطبية.

مثال (٢): حول المعادلة القطبية $r = 2a \cos \theta$ إلى الصورة الكارتيزية.

الحـــل

يطرب طرفي المعادلة المعطاة في r نجد أن: $r^2 = 2ar \cos \theta$ بالتعويض عن $x = r \cos \theta$, $r^2 = x^2 + y^2$

نحصل على: $x^2 + y^2 = 2ax \Rightarrow x^2 + y^2 - 2ax = 0 \Rightarrow (x-a)^2 + y^2 = a^2$ وذلك هي الصورة

الكارتيزية للمعادلة المعطاة وهي تمثل دائرة مركزها $(a, 0)$ والنقطة ونصف قطرها a .

مثال (٣): حول المعادلة القطبية $r = a \sec \theta$ إلى الصورة الكارتيزية.

الحـــل

$$\therefore r = a \sec \theta \Rightarrow r = \frac{a}{\cos \theta} \Rightarrow r \cos \theta = a$$

وبالتعويض عن $x = r \cos \theta$ نجد أن الصورة الكارتيزية المناظرة للمعادلة القطبية المعطاة تأخذ الصورة

$x = a$ ، وهي معادلة خط مستقيم يوازي محور ox .

مثال (٤): حول المعادلة $r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$ إلى الصورة الكارتيزية.

الحـــل

$$r = \frac{2}{1 + \cos \theta} \Rightarrow r(1 + \cos \theta) = 2 \Rightarrow r + r \cos \theta = 2$$

وبالتعويض عن $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $x = r \cos \theta$ نجد أن:

$$r + r \cos \theta = 2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + x = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 = (x-2)^2$$

$$\therefore y^2 = -4(x-1)$$

وهي معادلة قطع مكافئ سوف يدرس بالتفصيل لاحقاً.

مثال (٥): حول المعادلة $r = \frac{6}{2 - \sin \theta}$ إلى الصورة الكارتيزية.

الحل

$$\therefore r = \frac{6}{2 - \sin \theta} \Rightarrow r(2 - \sin \theta) = 6 \Rightarrow 2r - r \sin \theta = 6$$

وبالتعويض عن $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $y = r \sin \theta$ نجد أن:

$$2r - r \sin \theta = 6 \Rightarrow 2\sqrt{x^2 + y^2} - y = 6 \Rightarrow 4(x^2 + y^2) = (6 + y)^2$$

$$\therefore 4x^2 + 4y^2 = y^2 + 12y + 36 \Rightarrow 4x^2 + 3y^2 - 12y - 36 = 0$$

وهذه المعادلة يمكن كتابتها علي الصورة:

$$4x^2 + 3(y^2 - 4y) - 36 = 0 \Rightarrow 4x^2 + 3[(y - 2)^2 - 4] - 36$$

ومنها نحصل علي: $4x^2 + 3(y - 2)^2 = 48$ وبالتالي نجد أن الصورة الكارتيزية للمعادلة المعطاة تصبح

$$\frac{x^2}{12} + \frac{(y - 2)^2}{16} = 1 \text{ بالصورة:}$$

وهي معادله قطع ناقص سوف يدرس بالتفصيل لاحقاً.

تمرين: حول المعادلات الآتية إلى الصورة الكرتيزية:

$$r = \frac{6}{2 + \sin \theta} \quad (٣)$$

$$r = \frac{6}{2 + \cos \theta} \quad (٢)$$

$$r = \frac{6}{2 - \cos \theta} \quad (١)$$

تمارين (٧)

١) حول المعادلات الآتية إلى الصورة القطبية:

$$(i) y^2 = -4(x-1), \quad (ii) x^2 + y^2 = a^2, \quad (iii) \frac{x^2}{12} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$$

٢) حول المعادلات الآتية إلى الصورة الكارتيزية:

$$(i) r^2 = 9, \quad (ii) r = a \cos \theta, \quad (iii) r = \frac{6}{2 - \sin \theta}, \quad (iv) \frac{5}{r} = 1 + \cos \theta$$

الباب الثامن

التحويلات الهندسية واختزال معادلة الدرجة الثانية

المعادلة العامة من الدرجة الثانية في متغيرين


المعادلة التي علي الصورة: $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ تسمى بمعادلة الدرجة الثانية في متغيرين x, y . وهذه المعادلة تمثل معادلة منحنى ناتج من حركة نقطة في المستوى.

تغيير محاور الإحداثيات في المستوى

في بعض المواقف الهندسية يكون من المناسب السعي إلي تغيير وضع محاور الإحداثيات. ويكون الغرض من ذلك هو وضع معادلات المنحنيات الممثلة بمعادلة الدرجة الثانية في أبسط صورة لها حتى تتمكن من دراسة خصائصها ومعرفة نوعها بسهولة مقارنة بصورتها الأصلية. وفيما يلي سندرس طريقتين لتغيير المحاور.

أولاً : نقل نقطة الأصل (نقل محاور الإحداثيات موازية لنفسها)

إذا كانت (x, y) هي إحداثيات أي نقطة P في المستوى، ونقلت نقطة الأصل $O(0,0)$ إلى نقطة أخرى ولتكن $O(h, k)$ مع الإبقاء على اتجاه المحاور موازياً للمحاور الأصلية، وكانت إحداثيات النقطة P بالنسبة للمحاور الجديدة هي (X, Y) ، فإنه من الشكل المقابل:



يتضح أن معادلات التحويل بين الإحداثيات الجديدة والإحداثيات الأصلية يمكن كتابتها بالصورة:

$$x = X + h, y = Y + k.$$

حذف حدود الدرجة الأولى من معادلة الدرجة الثانية في متغيرين

نظرية (١): إحداثيات النقطة (x_1, y_1) التي يجب نقل محاور الإحداثيات إليها لحذف حدود الدرجة

الأولى من معادلة الدرجة الثانية $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ يمكن الحصول عليها من

$$\text{حل المعادلتين: } ax_1 + hy_1 + g = 0, hx_1 + by_1 + f = 0.$$

البرهان: عندما نُنقل نقطة الأصل $(0,0)$ إلى النقطة (x_1, y_1) فإن معادلات بين الإحداثيات الأصلية

x, y والإحداثيات الجديدة X, Y تكون بالصورة:

$$x = X + x_1, \quad y = Y + y_1 \quad (1)$$

وبالتعويض من معادلات التحويل (١) في المعادلة العطاء نجد أن:

$$f(X, Y) = a(X + x_1)^2 + 2h(X + x_1)(Y + y_1) + b(Y + y_1)^2 + 2g(X + x_1) + 2f(Y + y_1) + c = 0$$

وبالفك نجد أن هذه المعادلة تصبح بالصورة:

$$f(X, Y) = aX^2 + 2hXY + bY^2 + 2(ax_1 + hy_1 + g)X + 2(hx_1 + by_1 + f)Y + C = 0 \quad (2)$$

حيث أن C يعطي من العلاقة:

$$C = ax_1^2 + 2hx_1y_1 + by_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

ومن هذه المعادلة نجد أن:

$$(1) \text{ معامل } X \text{ هو } 2(ax_1 + hy_1 + g)$$

$$(2) \text{ معامل } Y \text{ هو } 2(hx_1 + by_1 + f)$$

ولكي تصبح هذه المعادلة خالية من حدود الدرجة الأولى يجب إن يكون معاملات حدود الدرجة

الأولى مساوية للصفر. وبوضع معامل $X = 0$ ، معامل $Y = 0$ نجد أن:

$$ax_1 + hy_1 + g = 0, \quad hx_1 + by_1 + f = 0$$

وهما معادلتان في مجهولين x_1, y_1 وبحلها جبرياً معاً نحصل علي إحداثيات النقطة التي يجب نقل

محاور الإحداثيات إليها لكي تصبح المعادلة المعطاة خالية من حدود الدرجة الأولى. وينقل نقت الأصل في هذه الحالة إلى النقطة (x_1, y_1) نجد أن معادلة الدرجة الثانية تصبح بالصورة:

$$aX^2 + 2hXY + bY^2 + C = 0$$

حيث أن:

$$C = ax_1^2 + 2hx_1y_1 + by_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

ملحوظة (١): من خلال برهان نظرية (١) يلاحظ أنه عند نقل نقتة الأصل فإن المعادلة الناتجة والمعادلة الأصلية يكون لهما نفس معاملات حدود الدرجة وبهذا يكون نقل محاور الإحداثيات إلى نقتة ما لا يغير من قيم معاملات حدود الدرجة الثانية في معادلة الدرجة الثانية ولكن فقط يغير معاملات حدود الدرجة الأولى والحد المطلق.

مثال (١): بنقل المحاور إلى نقتة مناسبة حول المعادلة $5x^2 - 6xy + 5y^2 + 22x - 26y + 29 = 0$ إلى أخرى خالية من حدود الدرجة الأولى.

الحل

يفرض أن (x_1, y_1) هي النقتة التي يجب نقل محاور الإحداثيات إليها لكي تصبح المعادلة المعطاة خالية من حدود الدرجة الأولى وبالتالي فإن معادلات التحويل بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة تكون بالصورة:

$$x = X + x_1, \quad y = Y + y_1.$$

وتصبح المعادلة الأصلية بعد التمييز عن قيم x , y بالصورة:

$$5(X + x_1)^2 - 6(X + x_1)(Y + y_1) + 5(Y + y_1)^2 + 22(X + x_1) - 26(Y + y_1) + 29 = 0 \quad (1)$$

وهذه المعادلة يمكن أعاده كتابتها على الصورة

$$5X^2 - 6XY + 5Y^2 + 2(5x_1 - 6y_1 + 22)X + 2(-3x_1 + 5y_1 - 13)Y + C = 0 \quad (2)$$

حيث أن:

$$C = 5x_1^2 - 6hx_1y_1 + 5y_1^2 + 22x_1 - 26y_1 + 29$$

من هذه المعادلة نجد أن:

مثال (٣): باستخدام نقل محاور الإحداثيات ضع المعادلة $y = 2x^2 + 4x + 3$ في أبسط صورة ممكنة:

الحل

نضع المعادلة المعطاة على الصورة الآتية:

$$y = 2x^2 + 4x + 3 \Rightarrow y - 3 = 2x^2 + 4x \Rightarrow y - 3 = 2(x+1)^2 - 2$$

$$\Rightarrow y - 1 = 2(x+1)^2 \Rightarrow (x+1)^2 = \frac{1}{2}(y-1).$$


وينقل محاور الإحداثيات إلى النقطة $(-1,1)$ فنجد أن: $x = X - 1, Y = y + 1$: أن:

$$X = x + 1, Y = y - 1$$

وبالتالي نجد أن المعادلة المعطاة تصبح بالصورة: $X^2 = \frac{1}{2}Y$.

ثانياً: دوران محاور الإحداثيات


نعتبر المحاور ox, oy أدبرت بزاوية θ في اتجاه موجب مع الإبقاء على موضع نقطة الأصل o ، نفرض أن المحاور الجديدة هي oX, oY على الترتيب، وإذا كانت (x, y) ، (X, Y) هي إحداثيات النقطة P بالنسبة للمحاور الأصلية ox, oy ، وبالنسبة للمحاور الجديدة oX, oY على الترتيب، كما بالشكل المقابل:



ومن الشكل المقابل نجد أن:

$$x = r \cos(\theta + \phi) = r(\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi) = (r \cos \phi) \cos \theta - (r \sin \phi) \sin \theta$$

$$= X \cos \theta - Y \sin \theta$$



وبالمثل نجد أن:

$$y = r \sin(\theta + \phi) = r(\sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi) = (r \cos \phi) \sin \theta + (r \sin \phi) \cos \theta = X \sin \theta + Y \cos \theta$$

أي أن معادلات التحويل التي علي الصورة:

$$\left. \begin{aligned} x &= X \cos \theta - Y \sin \theta \\ y &= X \sin \theta + Y \cos \theta \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

تعطي الإحداثيات الأصلية (x, y) بدلالة الإحداثيات الجديدة (X, Y) . وبحل معادلات التحويل (1)

بالنسبة إلي X, Y نحصل علي معادلات التحويل الآتية:

$$\left. \begin{aligned} X &= x \cos \theta + y \sin \theta \\ Y &= -x \sin \theta + y \cos \theta \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

وهذه المعادلات هي التي تعين الإحداثيات الجديدة X, Y بدلالة الإحداثيات الأصلية x, y وذلك في

حالة دوران محاور الإحداثيات بزاوية θ حول نقطه الأصل.

ملحوظة (3): معادلات التحويل السابقة بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة في حالة

دوران محاور الإحداثيات بزاوية θ حول نقطة الأصل يمكن تذكرها من خلال الجدول التالي:

	X	Y
x	$\cos \theta$	$-\sin \theta$
y	$\sin \theta$	$\cos \theta$

المعادلة المعطاة خالية من حدود الدرجة الأولى ولكي تصبح في أبسط صورة ممكنة لا بد من تحويلها إلى معادلة أخرى خالية من الحد المشترك علي xy . ولكي تتحول المعادلة المعطاة إلى معادلة أخرى خالية من الحد xy فإنه يجب تدوير محاور الإحداثيات زاوية مناسبة θ تتعين من العلاقة (نظريه ٢):

$$\tan 2\theta = \frac{2h}{a-b}$$

ومن المعادلة المعطاة نجد أن $2h=12, a=8, b=17$ وبذلك تكون:

$$\tan 2\theta = \frac{12}{8-17} = -\frac{12}{9} = -\frac{4}{3} \Rightarrow \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = -\frac{4}{3} \Rightarrow$$

$$2\tan^2\theta - 3\tan\theta - 2 = 0 \Rightarrow (2\tan\theta + 1)(\tan\theta - 2) = 0$$

وبالتالي نجد أن: $\tan\theta = -\frac{1}{2}$ ، $\tan\theta = 2$ والتي كلاً منها تحقق المعادلة (١). وباختيار $\tan\theta = 2$

$$\text{(الزاوية الحادة) نجد أن: } \sin\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

وإذا دارت محاور الإحداثيات زاوية θ فإن معادلات التحويل بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة تكون بالصورة:

$$x = X \cos\theta - Y \sin\theta, \quad y = X \sin\theta + Y \cos\theta.$$

وبالتعويض عن قيمه كل من $\sin\theta, \cos\theta$ نجد أن معادلات التحويل تصبح بالصورة:

$$x = \frac{1}{\sqrt{5}}(X - 2Y), \quad y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2X + Y).$$

وبالتعويض من معادلات التحويل السابقة في المعادلة الأصلية نجد أن:

$$\frac{8}{5}(X - 2Y)^2 + \frac{12}{5}(X - 2Y)(2X + Y) + \frac{17}{5}(2X + Y)^2 = 20 \Rightarrow$$

$$\left[\frac{8}{5} + \frac{24}{5} + \frac{68}{5}\right]X^2 + \left[-\frac{32}{5} + \frac{12}{5} - \frac{48}{5} + \frac{68}{5}\right]XY + \left[\frac{32}{5} - \frac{24}{5} + \frac{17}{5}\right]Y^2 = 20 \Rightarrow$$

وبالاختصار نجد أن:

$$\frac{100}{5}X^2 + \frac{25}{5}Y^2 = 20 \Rightarrow 20X^2 + 5Y^2 = 20 \Rightarrow \frac{X^2}{1} + \frac{Y^2}{4} = 1$$

وهي معادلة قطع ناقص في الصورة القياسية بالنسبة لمحاور الإحداثيات الجديدة.

$$X = X' \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - Y' \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{X' - Y'}{\sqrt{2}}, \quad Y = X' \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + Y' \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{X' + Y'}{\sqrt{2}}$$

وبالتعويض في المعادلة (1) نجد إنها تصبح بالصورة:

$$5\left(\frac{X' - Y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - 6\left(\frac{X' - Y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{X' + Y'}{\sqrt{2}}\right) + 5\left(\frac{X' + Y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - 8 = 0 \Rightarrow 2X'^2 + 8Y'^2 = 8$$

وهذه المعادلة يمكن وضعها في الصورة: $\frac{X'^2}{4} + \frac{Y'^2}{1} = 1$ وهي تمثل معادله قطع ناقص في الصورة

القياسية بالنسبة لنظام الإحداثيات الجديدة $X'Y'$ سناقش بالتفصيل لاحقاً.

تمارين (٨)

(١) أوجد الإحداثيات الجديدة للنقطة $P(-3,4)$ عندما تُنقل نقطة الأصل إلى النقطة $(2,-5)$.

(٢) باستخدام نقل محاور الإحداثيات ضع المعادلات الآتية في أبسط صورة ممكنة:

$$.x^2 - 4x + 8y + 12 = 0 \quad \diamond$$

$$.y^2 + 6y + 2x + 5 = 0 \quad \diamond$$

$$.x^2 - 4y^2 + 2x + 8y - 7 = 0 \quad \diamond$$

$$.x^2 + 4y^2 - 2x + 8y + 1 = 0 \quad \diamond$$

(٣) باستخدام دوران محاور الإحداثيات ضع كلاً من المعادلات الآتية في أبسط صورة ممكنة:

$$8x^2 - 12xy + 17y^2 = 20 \quad \diamond$$

$$17x^2 + 12xy + 8y^2 - 20 = 0 \quad \diamond$$

$$17x^2 - 12xy + 8y^2 - 20 = 0 \quad \diamond$$

$$.5x^2 - 6xy + 5y^2 = 8 \quad \diamond$$

$$.5x^2 + 6xy + 5y^2 = 8 \quad \diamond$$

(٤) إذا نقلت نقطة الأصل إلى النقطة $(-1,2)$ ، ثم دارت محاور الإحداثيات زاوية $\theta = \frac{\pi}{4}$ فأوجد

$$.5x^2 - 6xy + 5y^2 + 22x - 26y + 29 = 0$$
 الصورة الجديد للمعادلة:

(٥) منحنى إذا دارت محاور الإحداثيات بزاوية $\theta = \frac{\pi}{3}$ تصبح معادلته بالنسبة لمحاور الإحداثيات


$$. \frac{X^2}{4} - \frac{Y^2}{4} = 1$$
 الجديدة علي الصورة: أوجد معادلته بالنسبة للمحاور الإحداثيات الأصلية.

(٦) بدوران محاور الإحداثيات زاوية مناسبة احذف الحد xy من المعادلة $xy = 2$.

الباب التاسع

القطاعات المخروطية

تنشأ القطاعات المخروطية من تقاطع مستوي مع مخروط دائري قائم بحيث لا يمر المستوي برأس المخروط. ومن منطلق هذه النشأة الهندسية هناك أربعة حالات لمنحني التقاطع (المنحني الناتج من تقاطع المستوي مع المخروط) كما بالشكل المقابل:




❖ منحني التقاطع دائرة: عندما يكون المستوي القاطع عمودي علي محور المخروط.

❖ منحني التقاطع قطع مكافئ: عندما يكون المستوي القاطع موازيا لأحد رواسم المخروط.

❖ منحني التقاطع قطع ناقص: عندما يكون المستوي القاطع مائل علي محور المخروط ولا يوازي أي راس من رواسمه .

❖ منحني التقاطع قطع زائد: عندما يكون المستوي القاطع موازيا لراسمين من رواسم المخروط.


وعندما يقطع المستوي المخروط مارا براسة تنتج القطاعات المخروطية "المشوهة" وهي النقطة والخط المستقيم والخطين المستقيمين المتقاطعين، كما بالشكل المقابل:



التعريف الهندسي للقطاعات المخروطية

من جهة أخرى تعرف القطاعات المخروطية علي أنها المحل الهندسي لنقطة $P(x,y)$ تتحرك في المستوي بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة F إلي بعدها عن خط مستقيم ثابت L (F, L) في نفس المستوي مرتباً بالعلاقة:

$$\frac{FP}{PM} = e \quad \text{.....(1)}$$



حيث أن e مقدار حقيقي. يسمى e بالاختلاف المركزي ، L بدليل القطع ، F بالبيؤرة . ويوجه عام فإن الخط المستقيم المار بالبيؤرة عمودياً علي الدليل يسمى بمحور القطع . مع ملاحظه أنه في حالة القطاعات الناقص والذائد يكون لكلا منهما دليلين ويؤرتين.

وبصفة عامه يقال أن القطع المخروطي أفقي إذا كلٌّ محوره منطبقاً أو موازياً لمحور ox وكذلك يقال أنه رأسي إذا كان محوره منطبقاً أو موازياً لمحور oy . وعلي هذا النحو يقال أن القطع المخروطي مائل إذا كان محوره يميل علي محور ox بزوايه ما ولتكن θ .

ويختلف شكل القطع المخروطي الناتج من حركة النقطة $P(x,y)$ في ظل العلاقة (١) تبعاً لقيمه الاختلاف المركزي e كما يلي:

❖ عندما تكون $e = 1$ فإن المنحني الناتج يكون قطع مكافئ.

❖ عندما تكون $e < 1$ فإن المنحني الناتج يكون قطع ناقص.

❖ عندما تكون $e > 1$ فإن المنحني الناتج يكون قطع زائد.

❖ عندما تكون $e = 0$ فإن المنحني الناتج يكون دائرة.


❖ عندما تكون $e \rightarrow \infty$ فإن المنحني الناتج يكون خطين مستقيمين متقاطعين.

ويمكن الحصول علي الدائرة كحالة خاصة من للقطع الناقص كما يمكن الحصول علي الخطين المستقيمين المتقاطعين كحالة خاصة من القطع الزائد.

وفيما يلي دراسة تفصيلية للقطع المكافئ والقطع الناقص والقطع الزائد.

أولاً: القطع المكافئ


تعريف: القطع المكافئ هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في المستوى بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة F (تسمى البؤرة) مساوياً لبعدها عن خط مستقيم ثابت L (يسمى الدليل).



يسمى الخط المستقيم المار بالبؤرة عمودياً على الدليل بمحور القطع المكافئ ، وتسمى نقطة تقاطع القطع المكافئ مع محوره برأس القطع المكافئ (منتصف المسافة بين البؤرة والدليل) ، والقطع المكافئ يكون متماثل حول محوره. عندما تكون رأس القطع المكافئ عند نقطة أصل محاور الإحداثيات ومحوره ينطبق على احدي محوري الإحداثيات فإن معادلة القطع تكون في أبسط صورة لها وتسمى في هذه الحالة "بالصورة القياسية". والمعادلة القياسية للقطع المكافئ لها أربع حالات مختلفة. وفيما يلي سوف نشق المعادلات القياسية الخاصة بالقطع المكافئ لحالاته المختلفة.

المعادلة القياسية للقطع المكافئ

نعتبر قطع مكافئ مفتوح في الاتجاه الموجب لمحور ox ، كما بالشكل المقابل:



وطبقاً للتعريف العام للقطع المكافئ يكون: $\overline{PF} = \overline{PM}$ أي أن: $\sqrt{(x-a)^2 + (y-0)^2} = x+a$ وبترتيب

الطرفين نحصل علي: $(x-a)^2 + y^2 = (x+a)^2$ ومنها نجد أن: $y^2 = (x+a)^2 - (x-a)^2$ ومنها نحصل

علي معادلة القطع في صورتها القياسية وهي:

$$y^2 = 4ax \quad (1)$$


ويمكن أن تأخذ المعادلة القياسية الصور الآتية:


$$y^2 = -4ax \quad (2)$$

$$x^2 = 4ay \quad (3)$$

$$x^2 = -4ay \quad (4)$$

ويمكن استنتاج هذه المعادلات بسهولة من التعريف السابق. وجميعها موضحة بالإشكال أسفلة:






والصفات الهندسية للصور القياسية لمعادلة القطع المكافئ موضحة بالجدول الآتي:

المعادلة القياسية	$x^2 = 4ay$	$x^2 = -4ay$	$y^2 = 4ax$	$y^2 = -4ax$
إحداثيات البؤرة	$(0, a)$	$(0, -a)$	$(a, 0)$	$(-a, 0)$
معادلة الدليل	$y = -a$	$y = a$	$x = -a$	$x = a$
معادلة المحور	$x = 0$	$x = 0$	$y = 0$	$y = 0$
إحداثيات الرأس	$(0, 0)$	$(0, 0)$	$(0, 0)$	$(0, 0)$
معادلة المماس عند الرأس	$y = 0$	$y = 0$	$x = 0$	$x = 0$

الوتر البؤري العمودي لقطع مكافئ: الوتر للقطع المكافئ هو المستقيم الذي يقطع القطع في نقطتين مختلفتين وإذا مر الوتر بالبؤرة يسمى وتر بؤري. وإذا مر الوتر بالبؤرة عمودياً علي محور القطع فيسمى في هذه الحالة بالوتر البؤري العمودي. وطول هذا الوتر هو الذي يحدد اتساع القطع المكافئ وطول الوتر البؤري العمودي للقطع المكافئ يساوي $4a$ ، ويمكن إثبات ذلك كما يلي:




يفرض أن P هي نقطة تقاطع الوتر البؤري العمودي مع الجزء العلوي من القطع وبالتعمييض عن $x=a$ في معادلة القطع المكافئ التي علي الصورة: $y^2=4ax$ نجد أن: $y=2a$ وبالتالي يكون طول الوتر البؤري العمودي يساوي $4a$ أي يساوي ضعف بعد البؤرة عن الدليل.

ملحوظة: في الصور الأربع السابقة يمس القطع المكافئ محورا من محاور الإحداثيات عند نقطة الأصل والتي تسمي في هذه الحالة رأس القطع وبالطبع يمكن أن تكون رأس القطع أي نقطة أخرى غير نقطة الأصل ولكن تتحول معادلة القطع في هذه الحالة إلي صورة أخرى غير الصورة القياسية. ومن معرفتنا السابقة بتغيير محاور الإحداثيات يمكن عن طريق تحويلات مناسبة للإحداثيات التعبير عن معادلة القطع الغير قياسية في صورة قياسية.

المعادلة القياسية للقطع المكافئ الذي محوره يوازي أحد محاور الإحداثيات
أولاً: إذا كان محور القطع يوازي محور ox :

نعتبر قطع مكافئ رأسه النقطة (h,k) ومحوره يوازي محور ox والمماس عند الرأس يوازي محور oy ، كما بالشكل المقابل :



وينقل محاور الإحداثيات موازية لنفسها إلي النقطة (h,k) حيث أن المحاور الجديدة هي OXY ، فتكون معادلة القطع المكافئ منسوبة إلي المحاور الجديدة علي الصورة: $Y^2=4aX$ باستخدام


معادلات التحويل بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة والتي علي الصورة: $X = x - h$ ،
 $Y = y - k$ نحصل علي معادلة القطع منسوبة إلي الإحداثيات الأصلية في الصورة:

$$(y - k)^2 = 4a(x - h)$$

وهي المعادلة المطلوبة عندما يكون القطع مفتوح في الاتجاه الموجب لمحور ox . وتكون الصفات الهندسية للقطع في هذه الحالة كما هو موضحاً بالجدول التالي:

بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور OXY	
$(y - k)^2 = 4a(x - h)$	$Y^2 = 4aX$	المعادلة القياسية
(h, k)	$(0, 0)$	إحداثيات الرأس
$y - k = 0$	$Y = 0$	معادلة المحور
$x - h = 0$	$X = 0$	معادلة العمود عند الرأس
$(h + a, k)$	$(a, 0)$	إحداثيات البؤرة
$x - h = -a$	$X = -a$	معادلة الدليل

وعندما يكون القطع مفتوح في الاتجاه السالب لمحور ox تكون معادلته منسوبة إلي الإحداثيات الأصلية علي الصورة: $(y - k)^2 = -4a(x - h)$ ، كما بالشكل المقابل:




وتكون صفاته الهندسية كما هو موضحاً بالجدول التالي:

بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور OXY	
$(y-k)^2 = -4a(x-h)$	$Y^2 = -4aX$	المعادلة القياسية
(h, k)	$(0, 0)$	إحداثيات الرأس
$y - k = 0$	$Y = 0$	معادلة المحور
$x - h = 0$	$X = 0$	معادلة المماس عند الرأس
$(h - a, k)$	$(-a, 0)$	إحداثيات البؤرة
$x - h = a$	$X = a$	معادلة الدليل

ثانياً: إذا كان محور القطع يوازي محور oy

نعتبر قطع مكافئ رأسه النقطة (h, k) ومحوره يوازي محور oy والمماس عند الرأس يوازي محور ox ، كما بالشكل المقابل:



وننقل المحاور موازية لنفسها إلى النقطة (h, k) نحصل علي معادلة القطع المكافئ منسوبة للإحداثيات الجديدة في الصورة: $X^2 = 4aY$ وبتطبيق معادلات التحويل بين الإحداثيات والتي علي الصورة:

$$X = x - h, \quad Y = y - k$$


نحصل علي معادلة القطع منسوبة للإحداثيات الأصلية في الصورة:

$$(x-h)^2 = 4a(y-k)$$

وذلك عندما يكون القطع مفتوح في الاتجاه الموجب لمحور oy . والجدول التالي يعطي الصفات الهندسية لهذا القطع:

بالتنسبة للمحاور oxy	بالتنسبة للمحاور OXY	
$(x-h)^2 = 4a(y-k)$	$X^2 = 4aY$	المعادلة القياسية
(h, k)	$(0,0)$	إحداثيات الرأس
$x-h=0$	$X=0$	معادلة المحور
$y-k=0$	$Y=0$	معادلة المماس عند الرأس
$(h, k+a)$	$(0, a)$	إحداثيات البؤرة
$y-k=-a$	$Y=-a$	معادلة الدليل

ولكن بالنسبة للحالة التي يكون فيها القطع مفتوح في الاتجاه السالب لمحور oy فإن معادلته يمكن وصفها بالصورة: $(x-h)^2 = -4a(y-k)$ ، كما بالشكل المقابل:



والجدول التالي يوضح الصفات الهندسية للقطع في هذه الحالة :


بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور OXY	
$(x-h)^2 = -4a(y-k)$	$X^2 = -4aY$	المعادلة القياسية
(h, k)	$(0,0)$	إحداثيات الرأس
$x-h=0$	$X=0$	معادلة المحور
$y-k=0$	$Y=0$	معادلة المماس عند الرأس
$(h, k-a)$	$(0, -a)$	إحداثيات البؤرة
$y-k=a$	$Y=a$	معادلة الدليل

أمثلة محلولة


مثال (١): أرسم القطع المكافئ $y^2 = 12x$ وعين البؤرة والدليل.

الحل

بمقارن المعادلة المعطاة بالمعادلة القياسية للقطع المكافئ والتي علي الصورة: $y^2 = 4ax$ نجد أن $4a = 12 \Rightarrow a = 3$ وبالتالي فإن بؤرة القطع هي النقطة $(3,0)$ ورأسه النقطة $(0,0)$ ومعادلة دليله هي $x = -3$.



مثال (٢): أرسم القطع المكافئ $4y + x^2 = 0$ وعين البؤرة والدليل.




مثال (5): باستخدام تحويل هندسي مناسب أرسم القطع المكافئ الذي معادلته $(x+4)^2 = 16(y-2)$ ثم استنتج صفاته الهندسية.

الحـــــل

ينقل محاور الإحداثيات إلى النقطة $(-4, 2)$ نجد أن: $X = x + 4$, $Y = y - 2$ وبالتعويض في المعادلة الأصلية نجد أن: $X^2 = 16Y$ وهي معادلة قطع مكافئ مفتوح في الاتجاه الموجب لمحور OY ، كما بالشكل المقابل، والخواص الهندسية لهذا القطع كما بالجدول التالي:

بالنسبة للمحاور OXY	بالنسبة للمحاور oxy	
$X^2 = 16Y$	$(x+4)^2 = 16(y-2)$	المعادلة القياسية
$(0,0)$	$(h,k) = (-4,2)$	إحداثيات الرأس
$X=0$	$x+4=0 \Rightarrow x=-4$	معادلة المحور
$Y=0$	$y-2=0 \Rightarrow y=2$	معادلة المماس عند الرأس

$(h, k + a) = (-4, 6)$	$(0, a) = (0, 4)$	إحداثيات البؤرة
$y - 2 = -4 \Rightarrow y = -2$	$Y = -a$	معادلة الدليل



مثال (٦): بالتحويل إلى الإحداثيات الكارتيزية ونقل محاور الإحداثيات إلى نقطة مناسبة استنتج

الصفات الهندسية للقطع المكافئ الذي معادلته $r = \frac{6}{1 - \cos \theta}$.

الحل

$$r = \frac{6}{1 - \cos \theta} \Rightarrow r(1 - \cos \theta) = 6 \Rightarrow r - r \cos \theta = 6$$

وبالتعويض عن $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $x = r \cos \theta$ نجد أن:


$$r - r \cos \theta = 6 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - x = 6 \Rightarrow x^2 + y^2 = (x + 6)^2$$

وبالفك والاختصار نحصل على: $y^2 = 12(x + 3)$ وينقل محاور الإحداثيات إلى النقطة $(-3, 0)$ نجد

أن: $X = x + 3, Y = y$ وبالتعويض في المعادلة الأصلية نجد أن:

$$Y^2 = 12X$$

وهي معادلة قطع مكافئ مفتوح في الاتجاه الموجب لمحور ox ، كما بالشكل المقابل:



والخواص الهندسية لهذا القطع كما بالجدول التالي :

بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور OXY	
$y^2 = 12(x+3)$	$F^2 = 12X$	المعادلة القياسية
$(h, k) = (-3, 0)$	$(0, 0)$	إحداثيات الرأس
$y = 0$	$F = 0$	معادلة المحور
$x+3=0 \Rightarrow x=-3$	$X = 0$	معادلة المماس عند الرأس
$(h+a, k) = (0, 0)$	$(a, 0) = (3, 0)$	إحداثيات البؤرة
$x+3=-3 \Rightarrow x=-6$	$X = -3$	معادلة الدليل

معادلتى المماس والعمودي للقطع المكافئ

معادلة المماس للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ عند النقطة (x_1, y_1) الواقعة عليه تكون بالصورة

$yy_1 = 2a(x + x_1)$ ومعادلة العمودي عند نفس النقطة تكون بالصورة $y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1)$ ويمكن

استنتاج ذلك كما يأتي : لتكن معادلة القطع المكافئ هي $y^2 = 4ax$ ، ولتكن (x_1, y_1) نقطة ما واقعة

على القطع فهي تحقق معادته ومن ثم يكون $y_1^2 = 4ax_1$ ، ويميل المماس للقطع عند النقطة (x_1, y_1)

نحصل عليه كما يلي :

$$2y \frac{dy}{dx} = 4a \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2a}{y}$$

وإذا ميل المماس للقطع عند النقطة (x_1, y_1) يكون هو $\frac{2a}{y_1}$. وبالتالي فإن معادلة المماس للقطع المكافئ عند النقطة (x_1, y_1) تكون بالصورة:

$$(y - y_1) = \frac{2a}{y_1}(x - x_1) \Rightarrow yy_1 - y_1^2 = 2ax - 2ax_1.$$

وبالتعويض عن $y_1^2 = 4ax_1$ نحصل على: $yy_1 - 4ax_1 = 2ax - 2ax_1$ ومنها نحصل على:

$$yy_1 = 2a(x + x_1) \quad (1)$$

وهذه المعادلة هي معادلة المماس للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ عند النقطة (x_1, y_1) .

المعادلات البارامترية للقطع المكافئ

المقصود بالصورة البارامترية للمنحني هو التعبير عن إحداثيات أي نقطه (x, y) عليه بدلالة بارامتر وليكن t (أي: $x = x(t), y = y(t)$) وهذه الإحداثيات تحقق معادلة المنحني في الصورة القياسية بدلالة x, y . بالنسبة للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ نجد أن $y = 2\sqrt{ax}$ وبالتالي أنا وضعنا $x = at^2$ نجد أن $y = 2at$. وبالتالي تكون المعادلات: $x = at^2, y = 2at$ هي المعادلات البارامترية للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$. ومن الملاحظ أن المعادلات البارامترية لنفس المنحني يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة. فمثلاً المعادلات: $x = t, y = 2\sqrt{at}, t \geq 0$ هي أيضاً صورته بارامترية للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$. وبالنسبة للصور القياسية الأخرى للقطع المكافئ يمكن وضع معادلات بارامترية مشابهة.

المعنى الهندسي لبارامتر القطع المكافئ

من حساب التفاضل نعلم أن $\frac{dy}{dx}$ تمثل ميل المماس عند أي نقطه من نقاط منحني ما وفي حالة القطع المكافئ بالمعادلات البارامترية أعلاه يكون:

$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{t} \Rightarrow t = \frac{1}{m}$$

أي أن البارامتر t هنا هو مقلوب ميل المماس وهو يساوي " - ميل العمودي ".

وتكون معادلة المماس عند أي نقطة $(at^2, 2at)$ على القطع المكافئ هي:

$$\frac{y-2at}{x-at^2} = \frac{1}{t}$$

أي أن:

$$y = \frac{1}{t}x + at \text{ or } ty - x - at^2 = 0 \quad (2)$$

هي معادلة المماس للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ وهي معادلة من الدرجة الثانية في البارامتر t أي أنه لأي نقطة (x_1, y_1) توجد قيمتين للبارامتر t تحقق المعادلة وهذا يعني أنه من أي نقطة لا تقع علي القطع يمكن رسم مماسان للقطع ومعادله العمودي عند أي نقطه علي القطع المكافئ تكون بالصورة :

$$\frac{y-2at}{x-at^2} = -t$$

أي:

$$y + tx - at^3 - 2at = 0$$

معادله وتر في القطع مكافئ

معادله وتر القطع مكافئ الذي يصل بين النقطتين $P(at_1^2, 2at_1)$ ، $Q(at_2^2, 2at_2)$ هي:

$$\frac{x - at_1^2}{y - 2at_1} = \frac{at_2^2 - at_1^2}{2at_2 - 2at_1} = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

وهذه المعادلة يمكن كتابتها علي الصورة

$$2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0 \quad (3)$$

وبضرب طرفي المعادلة (1) في $a(t_1 - t_2)$ نحصل علي:

$$2a(t_1 - t_2)x - 2a(t_1 - t_2)(t_1 + t_2)y + 2a^2t_1t_2(t_1 - t_2) = 0$$

وهذه المعادلة يمكن كتابتها علي الصورة:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 2at_1^2 & 2at_1 & 1 \\ 2at_2^2 & 2at_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

وهذه المعادلة هي صورة أخرى لمعادلة الوتر لقطع مكافئ بدلالة البارامتر t . وكذلك يمكن استنتاج معادلة الوتر بدلالة الإحداثيات الكارتيزية.

معادله وتر القطع مكافئ الذي يصل بين النقطتين $P(x_1, y_1)$ ، $Q(x_2, y_2)$ هي :

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (5)$$

وحيث أن القطع يمر بالنقطتين $P(x_1, y_1)$ ، $Q(x_2, y_2)$ فيكون :

$$y_1^2 = 4ax_1 \quad (7)$$

$$y_2^2 = 4ax_2, \quad (6)$$

من المعادلتين (٦) ، (٧) نحصل علي : $y_2^2 - y_1^2 = 4a(x_2 - x_1)$ وبالتعويض في المعادلة (٥) والاختصار نحصل علي معادلة الوتر في الصورة :

$$4ax - (y_1 + y_2)y + y_1y_2 = 0 \quad (8)$$

ملحوظة : حيث أن لمماس لمنحني : هو الخط المستقيم الذي يقطع المنحني في نقطتين متطابقتين فإنه يمكن الحصول علي معادلة المماس من معادلة الوتر حيث أنه بوضع $t_1 = t_2$ في المعادلة (٣) نحصل علي المعادلة (٢) ، وكذلك بوضع $x_1 = x_2$ ، $y_1 = y_2$ في المعادلة (٧) نحصل علي المعادلة (١).

شروط تماس خط مستقيم لقطع مكافئ

شروط تماس الخط المستقيم $y = mx + c$ للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ هو $c = \frac{a}{m}$ وإحداثيات نقطة التماس تكون $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ ، ويمكن إثبات ذلك كما يأتي :

معادلة المماس للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ هي $y = \frac{2a}{y_1}(x + x_1)$ حيث أن (x_1, y_1) هي إحداثيات نقطة

التماس. ولكي يكون الخط المستقيم $y = mx + c$ مماسا للقطع يجب أن يكون :

$$m = \frac{2a}{y_1}, \quad c = \frac{2ax_1}{y_1}$$

وبالتالي نجد أن :

$$y_1 = \frac{2a}{m}, \quad x_1 = \frac{cy_1}{2a} = \left(\frac{c}{2a}\right)\left(\frac{2a}{m}\right) = \frac{c}{m}$$

أي أن النقطة $\left(\frac{c}{m}, \frac{2a}{m}\right)$ هي نقطة التماس. وحيث أن (x_1, y_1) هي إحداثيات نقطة التماس (نقطة تقع علي القطع) فيكون:

$$y_1 = mx_1 + c \Rightarrow \frac{2a}{m} = m\left(\frac{c}{m}\right) + c \Rightarrow c = \frac{a}{m}$$

وبالتالي تكون المعادلة التي علي الصورة: $y = mx + \frac{a}{m}$ هي معادلة التماس للقطع المكافئ $y^2 = 4ax$ لجميع قيم m الحقيقية وتكون النقطة $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ هي نقطة التماس.

تمارين (٩-١)

١) أوجد معادلة القطع المكافئ إذا كانت:

❖ البيضة $(-1,2)$ والدليل $x=0$.

❖ البيضة $(3,6)$ والدليل $y=2$.

❖ البيضة $(-4,1)$ والدليل $y=-1$.

❖ البيضة $(-3,-6)$ والدليل $y=0$.

٢) بالتحويل إلى الإحداثيات الكارثيزية ونقل محاور الإحداثيات إلى نقطة مناسبة استنتج الصفات

الهندسية للقطاعات المكافئة الآتية:

❖ $r = \frac{6}{1+\sin\theta}$ ، $r = \frac{6}{1-\sin\theta}$ ، $r = \frac{6}{1+\cos\theta}$

٣) بنقل نقطة الأصل إلى نقطة مناسبة استنتج الخواص الهندسية للقطاعات المكافئة الممثلة بالمعادلات

الآتية:

❖ $y^2 + 2y + 12x + 25 = 0$

❖ $y^2 - 4y - 8x + 20 = 0$

❖ $x^2 - 8x + 4y + 12 = 0$

❖ $x^2 + 8x - 16y + 48 = 0$

٤) أوجد معادلتَي المماسين المرسومين من النقطة $(-3,-2)$ للقطع المكافئ $y^2 = 4x$. وأوجد إحداثيات

نقطتي التماس. ومن ثم أوجد معادلة الوتر الواصل بين نقطتي التماس.

٥) أوجد معادلتَي المماسين المرسومين من النقطة $(2,-3)$ للقطع المكافئ $y^2 = 4x$. وأوجد إحداثيات

نقطتي التماس.

٦) برهن أن المحل الهندسي لنقطة تقاطع مماسين متعامدين لقطع مكافئ هو الدليل.

٧) أوجد معادلة المماس للقطع المكافئ $y^2 = 12x$ والذي يصنع زاوية $\frac{\pi}{4}$ مع الاتجاه الموجب لمحور ox .

ثانياً: القطع الناقص


من التعريف العام للقطاعات المخروطية يعرف القطع الناقص: علي أنه هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في المستوى بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة F (البؤرة) إلي بعدها عن خط مستقيم ثابت L (الدليل) يساوي مقدار ثابت (الاختلاف المركزي) اقل من الواحد الصحيح .

وهذا يعني أن القطع الناقص هو المنحني الناتج من حركة نقطة $P(x,y)$ بحيث يكون بعدها عن البؤرة F إلي بعدها عن الدليل L مرتبطاً بالعلاقة:

$$PF = ePM, e < 1 \quad (1)$$

من هذا التعريف يمكن استنتاج المعادلة القياسية للقطع الناقص كما يلي:

لإيجاد المعادلة القياسية للقطع الناقص نفرض أن البؤرة F تقع علي محور ox وأن الدليل L يكون عمودي علي محور ox والنقطة $P(x,y)$ هي النقطة التي تتحرك في المستوى بحيث تحقق العلاقة (1). وبالتالي فإن النقطة $P(x,y)$ خلال حركتها تقطع محور ox في النقطتين A, A' (نقطتي التقسيم من الداخل والخارج)، كما بالشكل المقابل:



ومن تعريف القطع الناقص نجد أن:

$$\frac{AF}{AH} = \frac{A'F'}{A'H'} = e, e < 1$$

وبفرض أن المسافة بين النقطتين A, A' هي مقدار ثابت $2a$ بحيث أن نقطة الأصل تقع في منتصف المسافة بينهما أي أن $OA' = OA$ وبذلك تكون إحداثيات النقطتين A, A' هما $A(a,0), A'(-a,0)$. وبالتالي من الشكل نجد أن:

$$AF = eAH \Rightarrow OA - OF = e(OH - OA) \quad (1)$$

$$A'F = eA'H \Rightarrow OA' + OF = e(OH + OA) \quad (2)$$

يجمع المعادلتين (1)، (2) نجد أن:

$$AF + A'F = 2e OH \Rightarrow 2a = 2e OH \Rightarrow OH = \frac{a}{e}$$

أي أن الدليل يبعد عن المركز مسافة قدرها $\frac{a}{e}$. وتكون معادلة الدليل هي $x = \frac{a}{e}$. وبطرح المعادلة (1) من المعادلة (2) نجد أن:

$$2OF = e(2OA) \Rightarrow OF = ae$$

أي أن البؤرة تبعد عن نقطة الأصل مسافة قدرها ae وتكون إحداثيات البؤرة هي $F(ae,0)$ والبعد PM هو $\frac{a}{e} - x$. وإذا كانت النقطة $P(x,y)$ تقع على القطع الناقص فإن:

$$\overline{PF}^2 = e^2 \overline{PM}^2 \Rightarrow (x - ae)^2 + y^2 = e^2 \left(\frac{a}{e} - x \right)^2$$

وبالفك والاختصار نجد أن: $x^2(1 - e^2) + y^2 = a^2(1 - e^2)$ وحيث أن $e < 1$ فإن $1 - e^2$ يكون مقدار موجب دائما، وبوضع: $b^2 = a^2(1 - e^2)$ نحصل على:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

وذلك هي معادلة لقطع الناقص في صورتها القياسية عندما تقع بؤرته على محور ox ويكون دليله موازيا لمحور oy . ومن العلاقة $b^2 = a^2(1 - e^2)$ نلاحظ أن $a^2 > b^2$. ومن معادلة القطع نجد أن:

$$x = \pm a \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}, y = \pm b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

وهذا يعني أن القطع الناقص يكون متمائل حول محوري الإحداثيات وكذلك متمائل حول نقطة الأصل ولكي نحصل علي قيم حقيقية للمتغير x يجب أن يكون :

$$1 - \frac{y^2}{b^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} - 1 \leq 0 \Rightarrow y^2 \leq b^2 \Rightarrow |y| \leq b$$

وبالمثل لكي نحصل علي قيم حقيقية للمتغير y يجب أن يكون :


$$1 - \frac{y^2}{b^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} - 1 \leq 0 \Rightarrow y^2 \leq b^2 \Rightarrow |y| \leq b$$

من تماثل القطع الناقص نجد أنه توجد له بؤرة أخرى هي $F'(-ae, 0)$ ودليل آخر معادلته $x = -\frac{a}{e}$ وكذلك نجد أن القطع يقطع محور oy في نقطتين ويكون منحنى القطع مغلق.

ومن الشكل نعلم أن: $\overline{PF} = e\overline{PM}$, $\overline{PF'} = e\overline{PM'}$ ومنها نجد أن:

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = e(\overline{PM} + \overline{PM'}) = e\overline{HH'} = e\left(\frac{2a}{e}\right) = 2a$$

ومن هنا نستنتج تعريفاً آخر للقطع الناقص وهو أن: القطع الناقص هو الحل الهندسي لنقطة تتحرك في المستوى بحيث يكون مجموع بعدها عن نقطتين ثابتتين (البؤرتين) يساوي مقدار ثابت (وهو طول المحور الأكبر). ومن هذا التعريف يمكن استنتاج معادلة القطع الناقص كما يأتي: لتكن بؤرتي القطع الناقص هما النقطتين $F(c, 0), F'(-c, 0)$ حيث c يُعد كلاً من البؤرتين عن نقطة الأصل. ولتكن $P(x, y)$ نقطة في المستوى تقع على القطع، كما بالشكل المقابل:



ومن التعريف السابق للقطع الناقص يكون:

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a \Rightarrow \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} = 2a.$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow (x-c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + (x+c)^2 + y^2$$

$$\Rightarrow -4cx = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} \Rightarrow a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = a^2 + cx.$$

وبتربيع الطرفين نجد أن:

$$a^2[(x+c)^2 + y^2] = (a^2 + cx)^2 \Rightarrow a^2[x^2 + 2cx + c^2 + y^2] = a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 \Rightarrow$$


$$a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 \Rightarrow x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

وبالقسمة على $a^2(a^2 - c^2)$ نحصل على: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$ وحيث أن $a > c$ فإن المقدار

$a^2 - c^2$ يكون موجب دائما، وبوضع $b^2 = a^2 - c^2$ نحصل على:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

وهي المعادلة القياسية للقطع الناقص، كما بالشكل المقابل:



ملاحظات:

❖ النقطتين النابتتين $F(c, 0) = (ae, 0)$, $F'(-c, 0) = (-ae, 0)$ تسمى ببؤرتي القطع الناقص.

❖ الخط المستقيم المار بالبؤرتين يسمى بالمحور الأكبر وطوله $2a$.

❖ الخط المستقيم العمودي على المحور الأكبر من منتصفه يسمى بالمحور الأصغر وطوله $2b$.


❖ نقطة تقاطع المحور الأكبر مع المحور الأصغر تسمى بمركز القطع الناقص.

❖ نقطتي تقاطع المحور الأكبر مع منحنى القطع تسمى برأسي القطع الناقص.

وبالتالي نجد أن المعادلة (٤) تمثل قطع ناقص مركزه نقطة الأصل، ومحوره الأكبر منطبق على محور ox ومحوره الأصغر منطبق على محور oy . وإحداثيات بؤرتيه $(\pm c, 0)$ حيث $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ وطول محوره الأكبر يساوي $2a$ وطول محوره الأصغر يساوي $2b$ وطول وتره البؤري العمودي يساوي $\frac{2b^2}{a}$

والاختلاف المركزي له $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} < 1$. ومعادلتني دليليه هما $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$.

ملحوظة (١): وإذا كان المحور الأكبر للقطع الناقص منطبق على محور oy ومحوره الأصغر منطبق على محور ox كما بالشكل:



فإن معادلته تكون على الصورة:

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (5)$$

وإحداثيات بؤرتيه $(0, \pm c)$ حيث أن $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. وبالتالي تكون المعادلة (٤) تمثل قطع ناقص

أفقي والمعادلة (٥) تمثل قطع ناقص رأسي والصفات الهندسية لهما تكون كما بالجداول التالي:

رأسي	أفقي	اتجاه القطع
$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	المعادلة القياسية
$(0, 0)$	$(0, 0)$	المركز

$A(0,a), A'(0,-a),$	$A(a,0), A'(-a,0),$	إحداثيات الرأسين
$x=0$	$y=0$	معادلة المحور الأكبر
$y=0$	$x=0$	معادلة المحور الأصغر
$F'(0,-c) = (0,-ae)$ $F(0,c) = (0,ae)$	$F'(-c,0) = (-ae,0)$ $F(c,0) = (ae,0)$	إحداثيات البؤرتين
$y = \pm \frac{a}{b} = \pm \frac{a^2}{c}$	$x = \pm \frac{a}{b} = \pm \frac{a^2}{c}$	معادلة الدليلين
$(\pm a,0)$	$(0,\pm b)$	نهايتي المحور الأصغر

ملحوظة (٢):


❖ من المعادلتين (٣)، (٤) نجد أن: $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ وهو الاختلاف المركزي.

❖ إذا كانت $e = 0 \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = 0 \Rightarrow a = b$ وذلك تنطبق البؤرتين والمركز وتصبح المعادلة في

الصورة: $x^2 + y^2 = a^2$ وهي معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها a . أي أن الدائرة هي حالة خاصة من القطع الناقص عندما $e = 0$.

الوتر البؤري العمودي للقطع الناقص

الوتر البؤري العمودي للقطع الناقص هو الوتر المار بالبؤرة عموديا علي المحور الأكبر ويمكن حساب طوله كالآتي: حيث أن الوتر البؤري العمودي يمر بالبؤرة موازيا للدليل (كما بالشكل المقابل)، فتكون



معادلة الوتر البؤري العمودي هي $x = ae$ وهذا الوتر يقطع القطع الناقص في النقطتين $S(ae, y)$ ،
 $S'(ae, -y)$ وبالتالي فإن النقطة $S(ae, y)$ تحقق معادلة القطع أي أن:

$$\frac{a^2 e^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{e^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = (1 - e^2)b^2 = \frac{b^2}{a^2} b^2 \Rightarrow y^2 = \frac{b^4}{a^2} \Rightarrow y = \pm \frac{b^2}{a}$$


وبالتالي يكون طول الوتر البؤري العمودي للقطع الناقص هو:

$$SS' = |2y| = \frac{2b^2}{a}$$

المعادلة القياسية للقطع الناقص الذي محوريه يوازيان محوري الإحداثيات

أولاً: إذا كان المحور الأكبر للقطع يوازي محور ox : نعتبر قطع ناقص مركزه النقطة (h, k)

ومحوره الأكبر يوازي محور ox ومحوره الأصغر يوازي محور oy ، كما بالشكل المقابل:



وننقل محاور الإحداثيات موازية لنفسها إلى النقطة (h, k) حيث أن المحاور الجديدة هي OXY ،

فتكون معادلة القطع الناقص منسوبة إلى المحاور الجديدة علي الصورة: $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$ باستخدام

معادلات التحويل بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة والتي علي الصورة:

$$X = x - h, \quad Y = y - k$$

نحصل علي معادلة القطع الناقص بالنسبة إلى الإحداثيات الأصلية في الصورة:


$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

وصفاته الهندسية كما في الجدول التالي :

بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور $oX'Y'$	
$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$	المعادلة القياسية
(h, k)	$(0, 0)$	إحداثيات المركز
$y - k = 0$	$Y = 0$	معادلة المحور الأكبر
$x - h = 0$	$X = 0$	معادلة المحور الأصغر
$(h \pm c, k)$	$(\pm c, 0)$	إحداثيات المؤرتين
$(h \pm a, k)$	$(\pm a, 0)$	إحداثيات الرأسين
$x - h = \pm \frac{a}{e}$	$X = \pm \frac{a}{e}$	معادلة الدليلين
$(h, k \pm b)$	$(0, \pm b)$	نهايتي المحور الأصغر

ثانياً: إذا كان المحور الأكبر للقطع يوازي محور oy : نعتبر قطع ناقص مركزه النقطة (h, k)

ومحوره الأكبر يوازي محور oy ومحوره الأصغر يوازي محور ox ، كما بالشكل المقابل :



وننقل محاور الإحداثيات موازية لنفسها إلى النقطة (h, k) حيث أن المحاور الجديدة هي OXY ، فتكون معادلة القطع الناقص منسوبة إلى المحاور الجديدة علي الصورة: $\frac{Y^2}{a^2} + \frac{X^2}{b^2} = 1$ وباستخدام معادلات التحويل بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة والتي علي الصورة:

$$X = x - h, \quad Y = y - k$$

نحصل علي معادلة القطع الناقص بالنسبة إلى الإحداثيات الأصلية في الصورة:

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} + \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

والصفات الهندسية لهذا القطع كما في الجدول التالي:

بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور OXY	
$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$	$\frac{X^2}{b^2} + \frac{Y^2}{a^2} = 1$	المعادلة القياسية
(h, k)	$(0, 0)$	إحداثيات المركز
$x - h = 0$	$X = 0$	معادلة المحور الأكبر
$y - k = 0$	$Y = 0$	معادلة المحور الأصغر
$(h, k \pm c)$	$(0, \pm c)$	إحداثيات البؤرتين
$(h, k \pm a)$	$(\pm a, 0)$	إحداثيات الرأسين
$y - k = \pm \frac{a}{e}$	$Y = \pm \frac{a}{e}$	معادلة الدليلين
$(h \pm b, k)$	$(\pm b, 0)$	نهائتي المحور الأصغر

أمثلة محلولة

مثال (١): أوجد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتيه $(\pm 2, 0)$ واختلافه المركزي يساوي $\frac{1}{2}$.

الحل

من المعطيات نلاحظ أن بؤرتي القطع تقع علي محور ox وبالتالي فإن معادلة القطع المطلوبة يجب أن


تكون علي الصورة: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ، ومن المعطيات نجد أن :

وبالتالي تكون:

❖ إحداثيات البؤرتين هما $(\pm c, 0) = (\pm\sqrt{7}, 0)$.


❖ إحداثيات نهايتي محوره الأكبر هما $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$.

❖ إحداثيات نهايتي محوره الأصغر هما $(0, \pm b) = (0, \pm 3)$.




مثال (4): أوجد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتيه $(0, -3)$ ودليلة الخط المستقيم $x = -\frac{5}{2}$ واختلافه

$$e = \frac{2}{3}$$
 المركزي



وننقل محاور الاحداثيات الي النقطة $(-1,3)$ نجد أن: $X=x+1, Y=y-3$ وبالتالي فإن المعادلة المعطاة يمكن كتابتها علي الصورة: $\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{9} = 1$ وهي معادلة قطع ناقص رأسي، كما بالشكل المقابل:



ويمكن استنتاج صفات الهندسية كما يلي:

من معادلة القطع نجد أن: $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3, \quad b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$

وبالتالي نجد أن: $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$

وبالتالي تكون الصفات الهندسية للقطع الناقص كما بالجدول التالي:

بالنسبة للمحاور oxy	بالنسبة للمحاور OXY	
$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$	$\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{9} = 1$	المعادلة القياسية
$(-1,3)$	$(0,0)$	إحداثيات المركز

$x+1=0 \Rightarrow x=-1$	$X=0$	معادلة المحور الأكبر
$y-3=0 \Rightarrow y=3$	$Y=0$	معادلة المحور الأصغر
$(h, k \pm c) = (-1, 3 \pm \sqrt{5})$	$(0, \pm c) = (0 \pm \sqrt{5})$	إحداثيات البؤرتين
$(h, k \pm a) = (-1, 3 \pm 3)$	$(0, \pm a) = (0, \pm 3)$	إحداثيات الرأسين
$y-3 = \pm \frac{9}{\sqrt{5}} \Rightarrow y = 3 \pm \frac{9}{\sqrt{5}}$	$Y = \pm \frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} = \pm \frac{9}{\sqrt{5}}$	معادلة الدليلين
$(h \pm b, k) = (-1 \pm 2, 3)$	$(\pm b, 0) = (\pm 2, 0)$	نهايتي المحور الأصغر

معادلة المماس والعمودي للقطع الناقص

نعتبر القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ، وبفرض أن النقطة (x_1, y_1) نقطة عليّة وبالتالي فإن ميل المماس

لهذا القطع عند أي نقطة عليّة هو: $m = \frac{dy}{dx} = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$ وبالتالي فإن ميل المماس للقطع الناقص عند

النقطة (x_1, y_1) الواقعة عليّة هو: $m_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1}$ وبالتالي تكون معادلة المماس للقطع الناقص

عند النقطة (x_1, y_1) الواقعة عليّة هي:

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m_1 = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1}$$

ومنها نحصل علي: $\frac{y_1 y - y_1^2}{b^2} = -\frac{x_1 x - x_1^2}{a^2}$ وهذه المعادلة يمكن كتابتها علي الصورة:

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}$$

وحيث أن النقطة (x_1, y_1) تقع علي القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ فهي تحقق معادلته أي أن:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$$

وبالتالي فإن معادلة المماس للقطع الناقص الذي معادلته بالصورة:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

عند النقطة (x_1, y_1) الواقعة على الصورة: $\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$ ومعادلة العمودي لهذا القطع عند

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{a^2 y_1}{b^2 x_1}$$

المعادلات البارامترية للقطع الناقص

المعادلات البارامترية للقطع الناقص الذي معادلته $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ هي:

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta$$

حيث أن θ تسمى زاوية الاختلاف المركزي. لانه بحذف البارامتر θ بين المعادلتين ينتج أن:

$$\cos \theta = \frac{x}{a}, \quad \sin \theta = \frac{y}{b}$$

أي أن:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

ومعادلة المماس للقطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ عند النقطة $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ الواقعة على تكون بالصورة:

$$\frac{x \cos \theta}{a} + \frac{y \sin \theta}{b} = 1$$

شرط تماس خط مستقيم لقطع ناقص

الشرط اللازم لكي يكون الخط المستقيم $y = mx + c$ مماسا للقطع الناقص الذي معادلته على الصورة:

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2} \quad \text{هو أن يكون} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ومعادلة المماس هي} \quad c = \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$$

وإحداثيات نقط التماس هي:

$$\left(\frac{-a^2 m}{\pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}}, \frac{b^2}{\pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}} \right)$$

ويمكن استنتاج ذلك كالآتي:

معادلة المماس للقطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ يمكن إعادة كتابتها على الصورة:

$$y = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x_1}{y_1} x + \frac{b^2}{y_1}$$

حيث أن (x_1, y_1) هي نقطة التماس. وبالتالي لكي يكون الخط المستقيم $y = mx + c$ مماساً للقطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ يجب أن يكون:

$$m = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x_1}{y_1}, \quad c = \frac{b^2}{y_1}$$

وبالتالي نجد أن:

$$y_1 = \frac{b^2}{c}, \quad x_1 = -\frac{ma^2}{b^2} y_1 = \left(-\frac{a^2}{b^2}\right) \left(\frac{b^2}{c}\right) = -\frac{ma^2}{c}$$

وبالتالي فإن نقطة التماس للقطع هي $(x_1, y_1) = \left(-\frac{ma^2}{c}, \frac{b^2}{c}\right)$.

وحيث أن النقطة $(x_1, y_1) = \left(-\frac{ma^2}{c}, \frac{b^2}{c}\right)$ هي نقط التماس فهي تحقق معادلة المماس أي أن:

$$y_1 = mx_1 + c \Rightarrow \frac{b^2}{c} = m \left(-\frac{ma^2}{c}\right) + c \Rightarrow c = \frac{b^2}{c} + \frac{m^2 a^2}{c} \Rightarrow c^2 = m^2 a^2 + b^2$$

أي أن الشرط اللازم لكي يكون المستقيم $y = mx + c$ مماساً للقطع الناقص هو أن:

$$c = \pm \sqrt{m^2 a^2 + b^2}$$

ويكون المستقيمان $y = mx + \pm \sqrt{m^2 a^2 + b^2}$ دائماً يمسان القطع الناقص لجميع قيم m الحقيقية وتكون نقطتي التماس هما:

$$\left(\frac{-ma^2}{\pm \sqrt{m^2 a^2 + b^2}}, \frac{b^2}{\pm \sqrt{m^2 a^2 + b^2}} \right)$$

تمارين (٩-٢)

(١) أوجد معادلة القطع الناقص الذي بؤرته $F(3,0)$ ودليلة الخط المستقيم $L: y = \frac{5}{2}$ واختلافه

$$e = \frac{2}{3} \text{ المركزي}$$

(٢) بنقل نقطة الأصل إلى نقطة مناسبة استنتج الصنات الهندسية للقطاعات الناقصة الآتية:

$$9x^2 + 16y^2 - 18x - 96y + 9 = 0 \quad \spadesuit$$

$$5x^2 - 20x + 9y^2 + 54y + 56 = 0 \quad \spadesuit$$


(٣) بالتحويل إلى الإحداثيات الكارتيزية استنتج الصفات الهندسية للقطع الناقص الذي معادلته

$$r = \frac{6}{2 - \sin \theta} \text{ القطبية}$$

(٤) أوجد الشرط اللازم لكي يكون المستقيم $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ مماساً للقطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

ثالثاً: القطع الزائد

تعريف: القطع الزائد هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في المستوى بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة F (البؤرة) إلى بعداً عن خط مستقيم ثابت L (الدليل) يساوي مقدار ثابت (الاختلاف المركزي) أكبر من الواحد الصحيح .




وهذا يعني أن القطع الزائد هو المنحني الناتج من حركة نقطة $P(x,y)$ بحيث يكون بعدها عن البؤرة F إلى بعدها عن الدليل L مرتبطاً بالعلاقة:

$$PF = ePM, \quad e > 1 \quad (1)$$

من هذا التعريف يمكن استنتاج المعادلة القياسية للقطع الزائد كما يلي:

لإيجاد المعادلة القياسية للقطع الزائد نفرض أن البؤرة F تقع على محور ox وأن الدليل L يكون عمودي على محور ox والنقطة $P(x,y)$ هي النقطة التي تتحرك في المستوى بحيث تحقق العلاقة (1).

وبالتالي فإن النقطة $P(x,y)$ خلال حركتها تقطع محور ox في النقطتين A, A' (نقطتي التقسيم من الداخل والخارج)، كما بالشكل المقابل:



ومن تعريف القطع الزائد نجد أن: $\frac{AF}{AH} = \frac{A'F}{A'H} = e, e > 1$ وبفرض أن المسافة بين النقطتين A, A' هي مقدار ثابت $2a$ بحيث أن نقطة الأصل تقع في منتصف المسافة بينهما أي أن $OA' = OA$ وبذلك تكون إحداثيات النقطتين A, A' هما $A(a,0), A'(-a,0)$. وبالتالي من الشكل نجد أن:

$$AF = eAH \Rightarrow OF - OA = e(OA - OH) \quad (2)$$

$$A'F = eA'H \Rightarrow OF + OA' = e(OA' + OH) \quad (3)$$

يجمع المعادلتين (2)، (3) نجد أن: $AF + A'F = (eOA + OA') \Rightarrow 2OF = 2eOA \Rightarrow OF = ae$: أي أن البؤرة تبعد عن نقطة الأصل مسافة قدرها ae أي أن البؤرة هي النقطة $F(ae,0)$.

وبطرح المعادلة (2) من المعادلة (3) نجد أن: $2OA = e(2OH) \Rightarrow OH = \frac{a}{e}$: أي أن الدليل يبعد عن

المركز مسافة قدرها $\frac{a}{e}$ ، ومعادلته تكون بالصورة $x = \frac{a}{e}$. واليعد PM هو $x - \frac{a}{e}$.

وإذا كانت النقطة $P(x,y)$ تقع على القطع الزائد فإن:

$$\overline{PF} = e\overline{PM} \Rightarrow \sqrt{(x-ae)^2 + y^2} = e\left(x - \frac{a}{e}\right)^2$$

وبالفك والاختصار نجد أن: $x^2(e^2 - 1) - y^2 = a^2(e^2 - 1)$ وحيث أن $e > 1$ فإن $e^2 - 1$ يكون مقدار موجب دائماً، وبوضع: $b^2 = a^2(e^2 - 1)$ نحصل على:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

وذلك هي معادلة لقطع الزائد في صورتها القياسية عندما تقع بؤرته على محور ox ويكون دليلاً موازياً

لمحور oy . ومن معادلة القطع نجد أن: $x = \pm a\sqrt{1 + \frac{y^2}{b^2}}$ وهذا يعني أن القطع الناقص يكون متماثل

حول محور ox ويقطعه في نقطتين حقيقيتين هما $A(a,0)$ ، $A'(-a,0)$. وكذلك من معادلة القطع نجد

أن: $y = \pm b\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}$ وهذا يعني أن القطع الزائد يكون متماثل حول محور oy ولا يقطعه في أي

نقطة حقيقية، وكذلك يكون القطع متماثل حول نقطة الأصل أيضاً والتي تمثل مركز القطع. ومن

تماثل القطع الزائد حول محوري الإحداثيات وحول نقطة الأصل نجد أنه توجد له بؤرة أخرى هي

النقطة $F'(-ae,0)$ وكذلك يوجد للقطع دليل آخر هو المستقيم الذي معادلته $x = -\frac{a}{e}$.

ومن الشكل المقابل نجد أن: $\overline{PF'} = e\overline{PM'}$ ، $\overline{PF} = e\overline{PM}$ ومنها نجد أن:

$$\overline{PF'} - \overline{PF} = e(\overline{PM'} - \overline{PM}) = e\overline{MM'} = e\overline{HH'} = e\left(\frac{2a}{e}\right) = 2a$$

ومن هنا يمكن صياغة تعريف آخر للقطع الزائد كما لاتي: القطع الزائد هو الحل الهندسي لنقطة


$P(x,y)$ تتحرك في المستوى بحيث يكون الفرق بين بعدها عن نقطتين ثابتتين (البؤرتين) يساوي

مقدار ثابت (يساوي طول المحور القاطع للقطع الزائد). حيث أن المحور القاطع هو الخط المستقيم المار

بالبؤرتين F ، F' وطوله يساوي $AA' = 2a$. ومن هذا التعريف يمكن استنتاج معادلة القطع الزائد

كما يأتي: بفرض أن النقطتين الثابتتين هما $F(c,0)$ ، $F'(-c,0)$ حيث أن c هو بعد أي منهما عن

نقطة الأصل. ولتكن $P(x,y)$ نقطة في المستوى تقع على القطع الزائد، كما بالشكل المقابل:



ومن التعريف السابق للقطع الزائد يكون: $c > a$ ، $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a$ ، أي أن:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

وبالاختصار كما فعلنا في استنتاج المعادلة القياسية للقطع الناقص نحصل على:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$$


ونظراً لأن $c > a$ فإن $c^2 - a^2 > 0$ وبوضع: $b^2 = c^2 - a^2$ (أي أن: $c^2 = a^2 + b^2$) نجد أن الصورة

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$
 القياسية لمعادلة القطع الزائد تكون بالصورة:

ملاحظات:

- ❖ النقطتين الثابتتين F' ، F تسمى بؤرتي القطع الزائد.
- ❖ الخط المستقيم المار ببؤرتي القطع الزائد F' ، F يسمى المحور للقاطع القطع الزائد.
- ❖ الخط المستقيم العمودي على المحور القاطع من منتصفه (النقطة O) يسمى المحور المرافق أو المحور التخيلي للقطع الزائد.
- ❖ نقطة تقاطع المحور القاطع مع المحور المرافق (النقطة O) تسمى مركز القطع الزائد.
- ❖ نقطتي تقاطع المحور القاطع مع منحنى القطع (النقطتين A' ، A) تسمى برأسي القطع الزائد.

وبذلك تكون المعادلة التي علي الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ هي المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل، ومحوره القاطع هو محور ox وطوله يساوي $2a$ ومحوره المرافق هو محور oy وطوله يساوي $2b$. وبؤرتيه هما النقطتين $(\pm c, 0) = (\pm ae, 0)$ حيث أن $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ، ورؤسيه هما النقطتين $(\pm a, 0)$ ، كما بالشكل المقابل:



الاختلاف المركزي للقطع الزائد: مما سبق نلاحظ أن بؤرتي القطع الزائد الذي معادلته القياسية علي

الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ هما النقطتين $(\pm c, 0) = (\pm ae, 0)$ حيث أن $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ، وبالتالي فإن

الاختلاف المركزي للقطع الزائد يتعين من العلاقة: $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} > 1$ وبالتالي نجد

أن معادلتها اندليلين لهذا القطع هما: $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$.

الخطان التقاربيان للقطع الزائد: الخطان التقاربين للقطع الزائد هما خطان مستقيمان يمسان القطع


في نقطة عند اللانهاية، ويمكن الحصول معادليهما من المعادلة القياسية للقطع وذلك بأن نجعل

قيمة x تزيد إلي ما لانهاية. من المعادلة القياسية للقطع الزائد نستنتج أن:

$$y = \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} = \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} \left(1 - \frac{a^2}{x^2}\right)} = \pm \frac{b}{a} x \sqrt{\left(1 - \frac{a^2}{x^2}\right)}$$

وعندما $x \rightarrow \infty$ فإن المقدار $\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} \rightarrow 1$ وتصبح معادلة الخطان التقاربين بالصورة: $y = \pm \frac{b}{a} x$ وهما

خطين مستقيمين يمران بمركز القطع، كما بالشكل المقابل:



والمعادلة المشتركة للخطان التقاربين هي:

$$\left(y - \frac{b}{a}x\right)\left(y + \frac{b}{a}x\right) = 0 \Rightarrow y^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

أي أن المعادلة التي علي الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ هي المعادلة المشتركة للخطان التقاربين للقطع الزائد


الذي معادلته علي الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ، وهي تختلف عن معادلة القطع في الحد المطلق فقط. وهذا

يعني أن معادلتَي الخطين التقاربين للقطع الزائد تنتجان مباشرة من المعادلة القياسية يجعل الحد

المطلق مساوياً للصفر أي أن: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \Rightarrow \frac{x}{a} = \pm \frac{y}{b} \Rightarrow y = \pm \frac{b}{a}x$ ويعتبر الخطان التقاربين


عناصر مساعدة لرسمة القطع الزائد بدقة.

القطع الزائد الذي محوره القاطع هو محور oy : إذا كانت بؤرتي القطع الزائد هما النقطتين $(0, c)$ ، $(0, -c)$ فإن المعادلة القياسية للقطع تأخذ الصورة : $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ وفي هذه الحالة يكون المحور القاطع هو محور oy ومحوره المرافق هو محور ox وتكون رأسي القطع هما النقطتين $(0, a)$ ، $(0, -a)$ ، والمعادلة المشتركة لخطاه التقاربيين تكون على الصورة : $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 0$ ، أي أن خطاه التقاربيين هما : $y = \pm \frac{a}{b}x$ ، كما بالشكل المقابل :




وهذا القطع يمكن إعادة كتابة معادلته على الصورة : $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1$ وبذلك تكون الصورة العامة المعادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وتقع بؤرتاه على احدي محوري الإحداثيات هي : $Ax^2 - By^2 = \pm 1$ ونأخذ الإشارة الموجبة إذا وقعت البؤرتان على محور ox ونأخذ الإشارة السالبة إذا وقعت البؤرتان على محور oy .

القطع الزائد المرافق: القطع الزائد المرافق للقطع $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ هو القطع الزائد الذي له نفس المركز ومحوره القاطع هو المحور المرافق للقطع الأول وله نفس الخطان التقاربيين ومعادلته هي $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ ، كما بالشكل المقابل:




القطع الزائد القائم: عند تساوي طول المحور القاطع بطول المحور المرافق في حالة القطع الزائد الذي معادلته القياسية على الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ نحصل على: $x^2 - y^2 = a^2$ ويسمى القطع الزائد في هذه الحالة بالقطع الزائد القائم، والاختلاف المركزي للقطع الزائد القائم هو $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{a^2}{a^2}} = \sqrt{2} > 1$ والخطان التقاربيين لهذا القطع هما $y = \pm x$ وهما خطان مستقيمان يتقاطعان على التعمد عند مركز القطع أي عند نقطة الأصل ونلاحظ أن ميل المستقيم الأول هو 1 أي يصنع زاوية $\frac{\pi}{4}$ مع محور ox وبالتالي يصنع المستقيم الثاني زاوية $\frac{3\pi}{4}$ أو $-\frac{\pi}{4}$ مع محور ox ، كما بالشكل المقابل:




ويتدوير محاور الإحداثيات زاوية $\theta = \frac{\pi}{4}$ نحصل علي العلاقات الآتية: $x = \frac{X-Y}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{X+Y}{\sqrt{2}}$


وبالتعويض من هاتين المعادلتين في المعادلة: $x^2 - y^2 = a^2$ نحصل علي: $XY = -a^2$ وهي صورة
قياسية أخرى لمعادلة القطع الزائد القائم ونلاحظ أن الخطوط التقاربية لهذا القطع هي محاور
الإحداثيات الجديدة X ، Y . والقطع الزائد الذي معادلته $y^2 - x^2 = a^2$ هو القطع الزائد المرافق للقطع
الزائد القائم الذي معادلته $x^2 - y^2 = a^2$ ، وهو قطع زائد قائم أيضاً محوره المقاطع هو محور oy ، كما
بالشكل المقابل:



وبتدوير محاور الإحداثيات زاوية $\theta = \frac{\pi}{4}$ مع بقاء نقطة الأصل ثابتة نجد أن معادلة القطع الزائد القائم $y^2 - x^2 = a^2$ تتحول إلى الصورة $XY = a^2$ وهي صورة أخرى للقطع الزائد القائم الذي محوره القاطع هو محور OY . ونلاحظ أن الخطوط التقاربية لهذا القطع هي محاور الإحداثيات الجديدة X, Y . وبالتالي نجد أن القطع الزائد الذي معادلته (بالنسبة للمحاور الإحداثيات الجديدة X, Y) علي الصورة: $XY = a^2$ هو القطع الزائد المرافق للقطع الزائد الذي معادلته (بالنسبة للمحاور الإحداثيات الجديدة X, Y) علي الصورة: $XY = -a^2$ وكلاً منهما قطع زائد قائم، كما بالشكل المقابل:



ملحوظة (١): قياساً علي ما سبق نستنتج أن المعادلة التي علي الصورة: $xy = \pm k^2$ حيث أن k ثابت تمثل عائلة من القطاعات الزائدة القائم التي خطوطها التقاربية هي محاور الإحداثيات الأصلية. ويقع أحد فرعي أي من هذه القطاعات في الربع الأول ويقع الفرع الثاني في الربع الثالث عندما نأخذ الإشارة الموجبة، ويقع أحد فرعي أي من هذه القطاعات في الربع الثاني والفرع الآخر يقع في الربع الرابع عندما نأخذ الإشارة السالبة، كما بالشكل المقابل:




ويتدوير محاور الإحداثيات زاوية $\frac{\pi}{4}$ مع بقاء نقطة الأصل ثابتة نجد أن معادلة عائلة القطاعات الزائدة القائم والتي علي الصورة $xy = \pm k^2$ تتحول إلي الصورة: $X^2 - Y^2 = \pm 2k^2$ وهي صورة أخرى لمعادله عائلة القطاعات الزائدة القائم التي خطوطها التقاربيه هي محاور الإحداثيات الأصلية.

الوتر البؤري العمودي للقطع الزائد: بالتشابه مع حالة القطع الناقص يمكن إثبات بسهولة أن طول

الوتر البؤري العمودي للقطع الزائد الذي معادلته $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ هو $ss' = |2y| = \frac{2b^2}{a}$ ، كما

بالشكل المقابل:



معادلة القطع الزائد الذي محوره القاطع يوازي أحد محوري الإحداثيات


ملحوظة (٣): إذا كان مركز القطع هو النقطة (h, k) وكان محوره القاطع يوازي محور ox فإن الصورة

القياسية لمعادلة القطع الزائد تكون علي الصورة: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ وتكون بؤرتي القطع في

هذه الحالة هما النقطتين $(h-c, k)$ ، $(h+c, k)$ ورأسيه هما النقطتين $(h+a, k)$ ،

$(h-a, k)$ وخطاه التقاربيان هما $y-k = \pm \frac{b}{a}(x-h)$ ، ومعادلة محوره القاطع هي $y=k$ ومعادلة

محوره المرافق هي $x=h$ ، كما بالشكل المقابل:




ملحوظة (٤): إذا كان مركز القطع هو النقطة (h, k) وكان محوره القاطع يوازي محور oy فإن الصورة

القياسية لمعادلة القطع الزائد تكون علي الصورة: $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$ وتكون بؤرتي القطع في

هذه الحالة هما النقطتين $(h, k-c)$ ، $(h, k+c)$ ورأسيه هما النقطتين $(h, k-a)$ ،

$(h, k+a)$ وخطاه التقاربيان هما $y-k = \pm \frac{a}{b}(x-h)$ ، ومعادلة محوره القاطع هي $x=h$ ومعادلة محوره المرافق


هي $y=k$ ، كما بالشكل المقابل:



أمثلة محلولة

مثال (١): ارسم القطع الزائد الذي معادلته $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$ ثم وأوجد إحداثيات كلاً من بؤرتيه ورأسية ومعادلتَي خطاه التقاربيان.

الحل




بمقارنة المعادلة المعطاة بمعادلة القطع الزائد التي علي الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ نحصل علي: $a = 12$ ،
 $b = 5$ ، وبالتالي نجد أن: $c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow c = 13$ وبالتالي يكون مركز القطع هو نقطة الأصل

ونقل نقطة الأصل إلى النقطة $(-2, -5)$ نجد أن $X = x + 2, Y = y + 5$ وبالتالي فإن معادلة القطع تصبح بالصورة:

$$\frac{X^2}{9} - \frac{Y^2}{16} = 1$$

وبالتالي نجد أن $a=3, b=4, c=5$ وبالتالي يكون مركز القطع هو النقطة $(-2, -5)$ ورؤسي القطع هما النقطتين $(1, -5)$ ، $(-5, -5)$ ، ويؤرتي القطع هما النقطتين $(-7, -5)$ ، $(3, -5)$ ، ومعادلتَي الخطان التقاربيان هما $y + 5 = \pm \frac{4}{3}(x + 2)$ ، كما بالشكل المقابل:



مثال (١٠): أرسِم القطع الزائد $9x^2 - 4y^2 - 72x + 8y + 176 = 0$ ثم أوجد إحداثيات كلاً من الرأسين واليؤرتين ومعادلتَي الخطان التقاربيان.

الحل


يُكَمَل المربع لحدود كل من x ، y لينتج أن: $4(y-1)^2 - 9(x-4)^2 = 36$ ومنها نجد أن معادلة القطع تصبح بالصورة:

$$\frac{(y-1)^2}{9} - \frac{(x-4)^2}{4} = 1$$

ونقل نقطة الأصل إلى النقطة $(4, 1)$ نجد أن: $X = x - 4, Y = y - 1$ وبالتالي فإن معادلة القطع يمكن كتابتها على الصورة:

$$\frac{Y^2}{9} - \frac{X^2}{4} = 1$$

وبالتالي فإن $a^2 = 9$ ، $b^2 = 4$ ، $c^2 = 13$ وبالتالي تكون بؤرتي القطع هما $(4, 1 \pm \sqrt{13})$ ، ورأسيه هما النقطتين $(4, 4)$ ، $(4, -2)$ ومعادلتا الخطان التقاربيان هما: $y - 1 = \pm \frac{3}{2}(x - 4)$ ، كما بالشكل المقابل:



معادلة المماس والعمودي للقطع الزائد

كما في حالة القطع الناقص يمكن استنتاج أن معادلة المماس للقطع الزائد الذي معادلته على الصورة:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

عند النقطة (x_1, y_1) الواقعة عليه تكون بالصورة:

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

ومعادلة العمودي لهذا القطع عند النقطة (x_1, y_1) الواقعة عليه تكون بالصورة:

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{a^2 x_1}{b^2 y_1}$$

المعادلات البارامتريّة للقطع الزائد

المعادلتان البارامتريتان للقطع الزائد الذي معادلته بالصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ هما: $x = a \sec \varphi$ ،

$y = b \tan \varphi$ ، لانه بحذف البارامتر φ بين المعادلتين ينتج أن: $\tan \varphi = \frac{y}{b}$ ، $\sec \varphi = \frac{x}{a}$ أي أن:

وكذلك يمكن تمثيل القطع الزائد باراً مترياً بالمعادلتين:
 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \sec^2 \varphi - \tan^2 \varphi = 1$
 ، أما المعادلات البارامتريّة للقطع الزائد القائم هي: $x = a \cosh \varphi$ ، $y = b \sinh \varphi$
 $x = ct$ ، $xy = c^2$ هي: $y = \frac{c}{t}$ ومعادلة المماس للقطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ عند النقطة $(a \sec \varphi, b \tan \varphi)$ الواقعة عليه تكون بالصورة:

$$\frac{x \sec \varphi}{a} - \frac{y \tan \varphi}{b} = 1$$

شرط تماس خط مستقيم لقطع زائد

بالتشابه مع حالة القطع الناقص نجد أن الشرط اللازم لكي يكون الخط المستقيم $y = mx + c$ مماساً للقطع الزائد الذي معادلته على الصورة: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ هو أن يكون $c = \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$ ومعادلة المماس هي: $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$ وإحداثيات نقط التماس هي:

$$\left(\frac{-a^2 m}{\pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}}, \frac{-b^2}{\pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}} \right)$$

تمارين (٩-٣)

١) أوجد معادلة القطع الذي بؤرته النقطة (3,-5) ودليلة الخط المستقيم الذي معادلته $x = -\frac{1}{5}$

واختلافه المركزي $e = \frac{5}{3}$. ثم استنتج صفاته الهندسية

٢) ارسم كلاً من القطاعات الزائده الاتية موضحا الصفات الهندسية:

$$\frac{(x+1)^2}{4} - \frac{(y-1)^2}{1} = 1 \quad \spadesuit$$

$$\frac{(y-3)^2}{4} - \frac{(x+2)^2}{9} = 1 \quad \spadesuit$$

٣) ينقل محاور الإحداثيات إلى نقطة مناسبة استنتج أبسط صورة ممكنة للمعادلة المشتركة التي تمثل

$$x^2 - 4y^2 - 4x - 8y - 4 = 0$$


٤) أوجد معادلة القطع الزائد الذي اختلافه المركزي $e = 3$ ومركزه نقطة الأصل وبؤرتيه تقع علي

محور ox ويمر بالنقطة (2,4).

٥) أوجد معادلة المعاس والعمودي عند نهايتي الوتر اليؤري العمودي للقطع الزائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

رابعاً: المعادلة القطبية للقطاعات المخروطية

الهدف الآن هو اشتقاق المعادلة القطبية للقطاعات المخروطية وذلك بدلالة البؤرة والدليل. وبفرض أن البؤرة عند قطب الإحداثيات القطبية والدليل عمودي علي الخط القطبي (أو موازيا للخط القطبي). إذا كان الدليل موازيا للخط القطبي فإن موقع الدليل قد يكون أسفل أو علي من القطب أما إذا كان الدليل عمودي علي الخط القطبي فإن موقع الدليل قد يكون علي يمين أو علي يسار القطب وبالتالي توجد أربعة حالات مختلفة يمكن أخذها في الاعتبار. وهنا سوف نشق معادلة القطع المخروطي للحالة التي يكون فيها الدليل عموديا علي الخط القطبي ويقع علي يسار القطب، كما بالشكل المقابل:



إذا كانت $P(r, \theta)$ هي نقطة علي القطع المخروطي الذي اختلافه المركزي يساوي e فإنه يكون:

$$PF = ePM \quad (1)$$

ومن الشكل المقابل نجد أن:

$$PF = r, \quad PM = d + r \cos \theta$$

وبالتالي فإن المعادلة (1) يمكن كتابتها بالصورة:

$$r = e(d + r \cos \theta)$$

ومنها نجد أن:

$$r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}$$

وهذه المعادلة هي المعادلة العامة للقطاعات المخروطية في الإحداثيات القطبية ويختلف نوع القطع المخروطي الذي تمثله هذه المعادلة تبعاً لقيمة الاختلاف المركزي e أي أن هذه المعادلة تمثل:

(١) قطع مكافئ عندما يكون $e = 1$.

(٢) قطع ناقص عندما يكون $e < 1$.

(٣) قطع زائد عندما يكون $e > 1$.

وذلك علي النقيض من حالة الإحداثيات الكارتيزية والتي يكون فيها لكل قطع مخروطي معادلة تختلف عن بقية القطاعات المخروطية الأخرى. والحالات الثلاثة الأخرى للمعادلة القطبية للقطاعات المخروطية والتي تعتمد علي وضع الدليل بالنسبة القطب (البؤرة) والخط القطبي يمكن اشتقاقها بطريقة مشابهة. والمعادلات التي تمثل القطاعات المخروطية في هذه الحالات الأربعة تكون كما في النظرية التالية:

نظريته: في الإحداثيات القطبية القطع المخروطي الذي اختلافه المركزي e وبؤرته تنطبق علي القطب ودليله يبعد مسافة قدرها d عن البؤرة بحيث يكون عمودياً علي الخط القطبي (أو موازياً للخط القطبي) فإن معادلته تكون علي الصورة:

$$\diamond r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta} \text{ عندما يكون الدليل عمودي علي الخط القطبي و علي يمين القطب.}$$

$$\diamond r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta} \text{ عندما يكون الدليل عمودي علي الخط القطبي و علي يسار القطب.}$$

$$\diamond r = \frac{ed}{1 + e \sin \theta} \text{ عندما يكون الدليل موازياً للخط القطبي و اعلي القطب.}$$

$$\diamond r = \frac{ed}{1 - e \sin \theta} \text{ عندما يكون الدليل موازياً للخط القطبي و أسفل القطب.}$$

وهذا يعني أن المعادلتين $r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta}$ هي معادلات قطبية للقطاعات المخروطية عندما يكون الدليل عمودياً علي الخط القطبي أي عندما يكون الدليل موازياً لمحور oy (والخط القطبي ينطبق علي محور ox). وبالمثل تكون المعادلتين $r = \frac{ed}{1 \pm e \sin \theta}$ هي معادلات قطبية للقطاعات المخروطية عندما يكون

الدليل موازيا للخط القطبي أي عندما يكون الدليل موازيا لمحور ox (الخط القطبي ينطبق على محور ox).

ملحوظة: في أي من القطاعات المخروطية (الكافئ والناقص والزائد) يمكن إثبات بسهولة أن البعد بين البؤرة والدليل والاختلاف المركزي يرتبطان بالعلاقة $d = \frac{\lambda}{e}$ حيث أن λ هي نصف طول الوتر البؤري العمودي للقطع المخروطي، d هي البعد بين البؤرة والدليل، e هو الاختلاف المركزي، أي أن $\lambda = ed$ وبالتالي نلاحظ أن:

$$\diamond \text{ للقطع الكافئ يكون } ed = 2a$$

$$\diamond \text{ للقطع الناقص والزائد يكون } ed = \frac{b^2}{a}$$

المعادلة القطبية للقطع الكافئ: في حالة القطع الكافئ نلاحظ أن الاختلاف المركزي $e = 1$ وبعد البؤرة عن الدليل يساوي $d = 2a$ وبالتالي فإن المعادلة القطبية للقطع الكافئ تكون:

$$\diamond r = \frac{2a}{1 \pm \cos \theta} \text{ عندما يكون الدليل عمودي على الخط القطبي.}$$

$$\diamond r = \frac{2a}{1 \pm \sin \theta} \text{ عندما يكون الدليل موازيا للخط القطبي.}$$

المعادلة القطبية للقطع الناقص: في حالة القطع الناقص نلاحظ أن الاختلاف المركزي $e = \frac{c}{a} < 1$ ونصف طول الوتر البؤري العمودي يساوي $ed = \frac{b^2}{a}$ وبالتالي فإن المعادلة القطبية للقطع الناقص تكون بالصورة:

$$\diamond r = \frac{b^2}{a(1 \pm e \cos \theta)} \text{ عندما يكون الدليل عمودي على الخط القطبي.}$$

$$\diamond r = \frac{b^2}{a(1 \pm e \sin \theta)} \text{ عندما يكون الدليل موازيا للخط القطبي.}$$

المعادلة القطبية للقطع الزائد: في حالة القطع الزائد نلاحظ أن الاختلاف المركزي $e = \frac{c}{a} > 1$ ونصف طول الوتر البؤري العمودي يساوي $ed = \frac{b^2}{a}$ وبالتالي فإن المعادلة القطبية للقطع الزائد تكون:

$$\diamond r = \frac{b^2}{a(1 \pm e \cos \theta)} \text{ عندما يكون الدليل عمودي على الخط القطبي.}$$

تمرين (٩-٤)

١) بين نوع القطع المخروطي الذي تمثله كلا من المعادلات القطبية الآتية واوجد اختلافه المركزي وطول الوتر البيوري العمودي ومعادلة دليته وصورته القياسية

$$.r = \frac{2}{1 - \cos \theta} \quad \blacklozenge$$

$$.r = \frac{3}{2 - \cos \theta} \quad \blacklozenge$$

$$.r = \frac{4}{1 + 3 \cos \theta} \quad \blacklozenge$$

$$.r = \frac{3}{2 + \sin \theta} \quad \blacklozenge$$

$$.r = \frac{2}{1 + \sin \theta} \quad \blacklozenge$$

$$.r = \frac{2}{1 - 2 \sin \theta} \quad \blacklozenge$$

٢) أوجد طول الوتر البيوري العمودي وإحداثيات الرأس للقطع المكافئ الذي معادلته

$$.r = \frac{12}{5 - 5 \sin \theta}$$

٣) أوجد المعادلة القطبية للقطع الناقص الذي معادلته $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

$$L_1 : y = m_1x , L_2 : y = m_2x.$$

وهما خطين مستقيمين يمران بنقطة الأصل أي أن:

$$\left(\frac{a}{b}\right)x^2 + \left(\frac{2h}{b}\right)xy + y^2 = (y - m_1x)(y - m_2x) = 0$$


أي أن:

$$\left(\frac{a}{b}\right)x^2 + \left(\frac{2h}{b}\right)xy + y^2 = y^2 - (m_1 + m_2)xy + (m_1m_2)x^2$$

وبمساواة معاملات xy , x^2 في الطرفين نحصل علي:

$$m_1m_2 = \frac{a}{b}, \quad -(m_1 + m_2) = \frac{2h}{b}.$$

وإذا كانت θ هي الزاوية بين الخطين المستقيمين (كما بالشكل المقابل) فإن:



$$\tan \theta = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2} = \frac{\sqrt{(m_1 - m_2)^2}}{1 + m_1m_2} = \frac{\sqrt{(m_1 + m_2)^2 - 4m_1m_2}}{1 + m_1m_2}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sqrt{\left(-\frac{2h}{b}\right)^2 - 4\left(\frac{a}{b}\right)}}{1 + \frac{a}{b}} = \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}.$$

وبالتالي فإن الزاوية بين الخطين المستقيمين المثلين بالمعادلة المتجانسة من الدرجة الثانية تتعين من

العلاقة:

ولكي تصبح المعادلة المعطاة خالية من حدود الدرجة الأولى يجب أن يكون معامل $X=0$ ، معامل $0=Y$ بوضع معامل $X=0$ ، معامل $0=Y$ نحصل علي المعادلتين:

$$y_1 - 4x_1 - 5 = 0, \quad 2y_1 + x_1 - 1 = 0,$$

وهما معادلتين في مجهولين x_1, y_1 وبحلها معاً نجد أن إحداثيات النقطة المطلوبة هي $(-1, 1)$. وبالتعويض في المعادلة السابقة نجد أن:

$$(Y+1)^2 + (X-1)(Y+1) - 2(X-1)^2 - 5(X-1) - (Y+1) - 2 = 0$$

وبالفك والاختصار نجد أن هذه المعادلة تصبح بالصورة: $Y^2 + XY - 2X^2 = 0$ وهي تمثل المعادلة المتجانسة للمعادلة الأصلية ولكنها بدلالة الإحداثيات الجديدة، وهي المعادلة المشتركة لخطين مستقيمين مارين بالنقطة $(-1, 1)$ والتي تمثل نقطة أصل محاور الإحداثيات الجديدة وبالتالي تكون المعادلة المعطاة تمثل المعادلة المشتركة لخطين مستقيمين مارين بالنقطة $(-1, 1)$ (نقطة تقاطعها) ويمكن الحصول علي معادلتَي الخطين المستقيمين بدلالة الإحداثيات الأصلية كالآتي: بتحليل المعادلة المتجانسة بدلالة الإحداثيات الجديدة نحصل علي: $(Y+2X)(Y-X) = 0$ ومنها نجد أن معادلتَي الخطين المستقيمين بالنسبة للمحاور الجديدة هما:

$$Y+2X=0, \quad Y-X=0$$

وبتطبيق معادلات التحويل بين الإحداثيات الأصلية والإحداثيات الجديدة والتي علي الصورة:

$$X=x+1, \quad Y=y-1.$$

نحصل علي معادلتَي الخطين المستقيمين المثلين بالمعادلة المعطاة بالنسبة للإحداثيات الأصلية بالصورة:

$$y-1+2(x+1)=0 \Rightarrow y+2x+1=0, \quad y-1-(x+1)=0 \Rightarrow y-x-2=0$$

ويحل معادلتَي الخطين المستقيمين معاً جبرياً نجد أن نقطة تقاطعها هي النقطة $(-1, 1)$ وهي نفس النقطة التي تم نقل محاور الإحداثيات إليها. والزاوية بين الخطين المستقيمين تتعين من العلاقة:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2\sqrt{k^2-ab}}{a+b}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2\left(\sqrt{\frac{1}{4}+2}\right)}{(-2+1)}\right) = \tan^{-1}(-3).$$

مثال (٤): ينقل محاور الإحداثيات إلى النقطة $(-1,-1)$ أعطي وصفًا هندسيًا للمعادلة $x^2 - y^2 + 2x - 2y = 0$.

الحـــــــــــــــــــــــــل

المعادلة المعطاة خالية من الحد xy وبالتالي يمكن كتابتها مباشرة علي الصورة:

$$(x^2 + 2x) - (y^2 + 2y) = 0 \Rightarrow (x+1)^2 - (y+1)^2 = 0$$

وينقل محاور الإحداثيات إلى النقطة $(-1,-1)$ نجد أن: $X = x+1$, $Y = y+1$ حيث أن xy هي الإحداثيات الأصلية، XY هي الإحداثيات الجديدة. وبالتالي فإن المعادلة المعطاة تصبح بالصورة:

$$X^2 - Y^2 = 0$$

وهذه المعادلة هي معادلة متجانسة من الدرجة الثانية تمثل المعادلة المشتركة لخطين مستقيمين مارين بنقطة الأصل بالنسبة للمحاور الجديدة ومارين بالنقطة $(-1,-1)$ بالنسبة للمحاور الأصلية وتكون معادلتها الخطين بالنسبة للمحاور الجديدة علي الصورة:

$$X - Y = 0, \quad X + Y = 0$$

ومعادلتها الخطين المستقيمين بالنسبة للمحاور الأصلية يمكن الحصول عليهما كالآتي:

$$X - Y = 0 \Rightarrow x+1 - (y+1) = 0 \Rightarrow x - y = 0,$$

$$X + Y = 0 \Rightarrow x+1 + y+1 = 0 \Rightarrow x + y + 2 = 0$$

أي أن المعادلتين: $x - y = 0$, $x + y + 2 = 0$ هما معادلتها الخطين المستقيمين المثلين بالمعادلة المعطاة ومارين بالنقطة $(-1,-1)$. وهذا يعني أن المعادلة المعطاة تمثل المعادلة المشتركة لخطين مستقيمين ونقطة تقاطعها هي النقطة $(-1,-1)$.

تمارين (١٠)

(١) ينقل نقطة الأصل إلى نقطة مناسبة برهن أن كلاً من المعادلات الآتية تمثل المعادلة المشتركة لخطين مستقيمين وأوجدتهما:

$$.y^2 + xy - 2x^2 - 5x - y - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$.2x^2 - xy - 3y^2 - 7x + 8y + 3 = 0 \quad \checkmark$$

$$.3x^2 + 2xy - y^2 + x - 3y - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$.2x^2 - 13xy - 7y^2 + x + 23y - 6 = 0 \quad \checkmark$$

$$.x^3 - y^3 + x - y = 0 \quad \checkmark$$

(٢) بنقل محاور الإحداثيات إلى نقطة مناسبة استنتج معادلتَي الخطين المستقيمين المثلين بالمعادلة المشتركة $y^2 + xy - 2x^2 - 5x - y - 2 = 0$ وأوجد الزاوية بينهما.